

DESCRIPTIO COMPARATA
MVSCVLORVM

CORPORIS HVMANI ET
QVADRVPEDIS;

*eorum inuentores; ortus; progressus;
insertiones; actiones; ac dif-
ferentias exhibens.*

Cui adcefferunt:

HISTORIA MVSCVLORVM,
FEMINAE SINGVLARIVM;
TABVLA, EXPLICANS MVS-
CVLORVM NOMINA;
plurimique necesarii INDICES.

Auctore,

JACOBO DOUGLASS,

Doctore Medico.

Prodiit *Londini*, Anglice. A: P: C: N: c10 10ccvii.
in 8uo.

Versio Latina.

Editio altera & emendatio.

LVGDVNI BATAVORVM,
Apud **GERARDVM POTVLIET.**
A: P: C: N: MDCCXXXVIII.

VIRIS CELEBERRIMIS,
HERMANNO BOERHAAVE,
&
BERNARDO SIEGFRIED
ALBINO,

*Quorum sola nomina quoscumque honorum
titulos longe superant,*

SVIS IN ANATOME AC MEDICINA
PRAECEPTORIBVS,

felicitatem

Joannes Fredericus Schreiber,
Regiomontanus Borussus.



Equifitis scientiis instructi qui ani-
mos ad Medicinam adplicant; du-
plici de causa, in errores prolabi
possunt; cum, quod corporis hu-
mani fabricam, quam adcuratissime noscen-
dam,

D E D I C A T I O.

dam, negligent, uel falsam, pro vera datam, fumant: tum, quod in ratiociniis suis, ubi status nostri corporis, sanum aegrumque, explicant, sola generalia corporum principia, singularibus nostri corporis posthabitis, admittant. Verumtamen: firmum fundamentum solidae Medicinae sternit adcurata fidaque partium historia. Siue uero contempler grauitatem rei: ubi pars corporis quaeuis in infinitas machinas usque resolubilis: siue circumspectionis spectem magnitudinem, qua Anatomico opus, neu diuersa pro iisdem habeat, uel eadem pro diuersis: siue denique uentosum quorundam inclarescendi studium arguam, quo acti, oppido falsa, pro nouis, auditoribus suis uendere, nulli erubescunt: semper certe beatum illum praedico, cui adcuratissimo, ac fidissimo in Anatomie Doctore frui contigit. Ceteri nempe uel alius mundi ideam, uel somnia plane discipulorum suorum mentibus important. Neque tamen Anatome tanta, quae, sola perspecta, uerum possit effingere Medicum, licet in summum cadat Philosophum. Sunt quippe sui principii omnibus limites; sunt singulares eorum in singularibus casibus determinationes: quae omnia perspicere, uel, quod maius est, sine erratione, adplicare, duce orbis, uix tentaueris felix. Certe plerique,

qui

DEDICATIO.

qui uel Mathematica cognitione imbuerere uoluerunt Medicos, criminis huius rei adcusantur. Tales uero tandem formant Medicos, alii, non huic, uniuerso adcommo-
 datus. En iam rationem studiorum meorum Medicorum! Volui scilicet binos hosce eui-
 tare scopulos. Ad VOS igitur adcesi disci-
 pulus, PRAECEPTORES FIDELISSIME. Atque ita me quidem conuicistis ueritatum,
 uel per obseruationes; uel per experimenta,
 uel per demonstrationes a VOBIS reperta-
 rum, ut toties totiesque optarim; natura mi-
 hi ita faulrix in tribuendis animi dotibus
 contigisset, ut omnibus illis capiundis, adpli-
 candisque in uitae usu, par fuerim! Salim
 enitar, ut, si non alius quispiam, mens tamen
 mea doctrinarum VESTRARVM fructum a-
 liquando percipiat. Iure igitur optumo, maxu-
 mo, quae a VOBIS in me redundarunt; be-
 neficia, quibus maius in me collatum nescio
 ullum, summa interpretor. Hinc & patriam
 sanctitatem in VOBIS colendam: & grates pu-
 blice VOBIS decreui agendas. Quas iam his-
 ce refero, quantas animo possum concipere,
 maxumas: habiturus certe maiores, eas-
 demque aeuernas. Horum omnium ut du-
 ret monumentum, hanc adcipite MVSCV-
 LORVM DESCRIPTIONEM; eademque,
 a me in Romanum sermonem translata, NO-

DEDICATIO.

MINIBVS VESTRIS ut inscribatur, patiamini. Equidem haud diffiteor, offerri VOBIS ita, uel Auctori propria, uel a VOBIS hausta pleraque; dabitis tamen, scio; in diiudicanda gratitudinis magnitudine, non tam oblatum, quam offerentis animum, mensuram exhibere. Valete. Leidæ. A: P: C: N: CIO 10 CCXXIIX. die tertio *Nouembris*.

JOANNES FREDERICVS SCHREIBER,

Doctor Medicus,

Interpres,

S.

LECTORIBVS.



Uulgius a rerum intelligentibus in eo differt, quod illud naturae, uel artis effecta, si raro contingunt, admiretur; frequentia uero cotidianaque, necessitate quadam, supposita, non uero perspecta, fieri norit: hi uero in omnium rationes, pari studio, inquirant, nexusque, tam *finales*, quam *efficientes*, inspicere adlaborent. Hos qui in *humani corporis* partibus peruidere nituntur, *physiologi* dicuntur; quasi ipsam *φύσιν* eloquerentur: *φύσις* autem corporis humani est uis ac essentia eius: illi ergo demonstrant, effecta illius corporis esse causarum suarum uiribus proportionalia. Hoc, opinor, uerum fatentur omnes; sed constabit mox, physiologos, circum *locomotiuam*, in plerisque, eadem adhuc cum uulgo frui cognitione, id est, *historica*.

Suppono; omnes motus in omni corpore animato perfici per musculos, ita & in humano; suppono musculorum fabricam uniuersalem, ut & modum, quo agere concipiuntur, qualem lubenter fingere:

P R A E F A T I O.

fumo denique *originis ac insertionis* musculorum definitiones, ab *Auctore* nostro, in *introductione*, traditas.

Iam uersabor circa solutionem unius illius problematis, amplissimi aequae, ac difficillimi. Quod sic enuntio: *Distincte explicare omnes motus, in humano corpore possibiles. Distincte uero explicare motum est assignare musculos, illum producentes.*

Adparet facile, neminem illi soluendo adcommo-
torem esse Anatomico: reliqui enim fictionis suspi-
cionem uix a se auertent. Sed & putari posset, A-
natomicos illud iam soluisse: non enim esse opus,
quam ut; si in singulari locomotivae statu desidera-
tur musculus, motus illius auctor, in libellis, qui
descripserunt corporis humani musculos, quaerantur
musculi, motae parti *inserti*. Sic quippe satisfactum
esset quaesito, uti patet ex adlegata *insertionis* defini-
tione. Id uerum si esset semper, fateor; parui mo-
menti foret problema. Quae uero omnia mox discu-
tiemus. Ut problema ergo propositum recte solua-
tur; notetur:

1. *In separatione musculorum ab inuicem, naturae, prout eos coniunxit, uel diuisit, uestigiis insistendum esse.* Quo quis enim elegantius norit scalpello mul-
tiplicare musculos; eo plures describit; & quot de-
scribit, tot quoque addit actiones: sicque actionem
compositam resoluit in simplices. Fac enim, te mus-
culum, quem natura unum fecit, diuidere in duos;
iam tibi uel demonstrandum est, utrumque muscu-
lum semper simul contrahi debere: quod numquam
demonstrabis; uel dandum est; si alteruter agat:
in casu altero diversae illorum actionis; diuersum
fieri debere motum: in altero uero. eius-
dem actionis; debiliorem apparere debere effectum.

E: G:

P R A E F A T I O.

E. G. EVSTACHIVS *flexorem secundi internodii pollicis manus & artibæ* **RIOLA:**, pro uno habuisse videtur musculo: contractus ergo hic musculus pollicem & adducit ad indicem, & aliquantum flectit simul. Ponamus iam, alios illum, contra naturae institutum, in duos diuidere: hi duas actiones singulares adstruunt: ita, ut *artibæ*, solus agens, pollicem adducat: alter uero, solus agens, illum flectat. Hi ergo ut cum natura in gratiam redeant, alterutrum demonstrent, necessum habent: uel, binos hosce musculos semper una debere agere: uel, diuersas unius musculi fibras posse contrahi, toto musculo non contracto. Posterius autem hoc sic euinci posse putarim: Sumamus: quasdam fibras eiusdem musculi non posse agere, nisi toto agente. Quia nihil sine ratione sufficienti, cur potius sit, quam non sit; debet esse ratio, cur quaedam eiusdem musculi fibrae nerueae non possint agere, nisi toto musculo contracto; quae unica propositionem negantibus ratio obstat, quia nulla uel concipi, uel dari potest ratio, cur quibusdam filamentis nerueis contractis, non quoque contrahantur aliae, uel ceterae, in eundem musculus dispersae, eiusdem rami neruosi propages? Si uero nulla daretur: nec possent maximi quique musculi, quibus ab uno magno trunco sui nerui, separatim moueri: si enim nihil uetat filamentorum quorundam, in eodem musculo, simultaneam contractionem: nihil quoque impedit simultaneam neruosi trunci ramorum, per alios musculos disseminatorum, actionem: sicque, agente e: g: neruo ischiatico, deberent simul contrahi omnes illi musculi, ad quos ille neruus pertingit. Id uero quum sit fere absurdum; iudiciis intuitiuis, cum obseruationibus de neruorum progressibus collatis, repugnans-

P R A E F A T I O.

patet adfert nostri ueritas. Exempla uero diuiforma ita musculorum praebent quoque *crico-thyreo-pharyngeus* EVST; aliisqui duplex: *cucullaris*; ut & *serratus anticus maior*. &c: Si autem quis duos musculos, a natura distinctos, pro uno habeat, idem dicendum est, mutatis saltem mutandis.

II. *Musculus quisque trabatur, cadauere, in omnem situm possibilem, successiue disposito.* Id hactenus a plerisque neglectum esse, nemo negabit, qui uel demonstrationibus musculorum interfuit, uel libros de musculis perlegit. Eodem uero labore, duplex percipitur fructus: alter, ut cognoscantur muscoli, ad singulares quosdam motus in primis concurrentes, uel eos soli perficientes: alter, ut discamus erroribus; ne idem musculus in omni situ idem perficere credatur. Quae momentosa res! Sed enormis quoque, ac uniuersalis Anatomicorum error, paucissimos si exceperis! Prior per se innotescit. De posteriore uero disseramus paulo liberius. Error ille dupliciter committi potest. Primo enim, qui musculus, in supino cadauere, mouet partem, cui, ut aiunt, *inseritur*, ille, in alio situ, partem, a qua *oriri* putabatur, mouebit: quia ille situs non possibilis, nisi insertionem illa per alios musculos firmata. Dabo rei exemplum. *Musculus patientiae* oriri dicitur a uertebis quibusdam colli, & *scapulae inferi*. Secundum definitiones *originis* & *insertionis* ergo debet ad tollere scapulam. Obiter noto, illos, ex definitionibus suis, dicere debere quod oriatur a *scapula*, & inseratur dictis uertebis; namque *omoplata*, cum adpenfis, est specificè grauior collo ac capite. Sit iam insertio eius firmata, hoc est, collum; (suppono discrepantiam, quae inter *extendere* & *firmare partem*, notam esse) & aliquantum eleuare poterit *scapulam*.

P R A E F A T I O.

Quin & idem obtinere potest in eodem corporis situ, si eidem parti duo adfixi musculi: ubi debilior non mouebit in uno casu locum insertionis suae, si alter fortior in actione.

Annon uel inde manifestum est, terminos illos. *originem* uel *caput* musculi, & *caudam* siue *finem* eius, nullius esse usus? Quin potius tironibus ingenerare *notiones deceptrices*? Illos ergo esse *inanes*? Idcirco iure proscribendos? Aut dicendum est, musculum, eundem, in hoc corporis situ, oriri ab illa parte; in alio uero, ab alia: sic &, pro diuerso situ, diuerse inferi. Ita e: g: *musculus patientiae*, collo firmato, oritur a uertebis ceruicis, & inseritur scapulae: illo uero non firmato, sed flexili, oritur a scapula, & inseritur nominatis uertebis. Sic & de aliis sitibus. Equidem non desunt in aliis scientiis exempla, ubi eadem notio tribuitur diuersis partibus, pro diuerso earum situ. Sic in Geometria elementari *Basiv* figurarum dicitur illarum pars ima: quot ergo figura habet latera, tot in ea successiue possunt concipi bases. Ast talis consideratio scientiae ualde proficua, quia, quae de basi figurae demonstrantur, ualent de omnibus figurae lateribus; sicque demonstrationibus plurium propositionum plurimum inferuiunt. E: g: In quo triangulo anguli ad *Basiv* aequales sunt; illud est aequicrurum. Id iam adplicari potest ad omnia latera. Sic in casu speciali possum proponere *Trianguli, circulo inscripti, angulus ad uerticem si fuerit angulus in semicirculo, semicirculum bifariam diuidens: dico; triangulum illud fore reſtangulum, aequicrurum.* Tum iam ipsa hypothenusa fit *Basiv*: & catheti, ob aequales angulos, sunt aequales: si uero, in eodem triangulo, cathetum alterutrum consideres, ut *Basiv*: propositio illa ita demonstrari nequit.

P R A E F A T I O.

quit. Ob eamdem baseos inconstantiam, uariant quoque *uerticum* ac *altitudinum* in *figuris* considerationes. Idem ualet, in *staticis*, de *corporibus*. *Secundo*; qui musculus in hoc corporis situ hunc edebat motum, in alio efficiet alium, ob singularia impedimenta, in dato casu, determinanda. Sic e: g: qui *pyriformis*, in erecto homine femur rotat extrorsum: is, in sedente, illud non rotabit, sed abducet simpliciter. Quod patet comparanti musculus cum illo corporis situ. Sic explicari possunt *pantomimorum* actiones: si compositis sitibus, dicto modo, attenditur.

Ope huius regulae, detexit VVINSLOVV, *bicipitem internum cubiti*, manu prona, *supinare* primo manum. Qui uero eum, manu supina, solum traxerunt musculus, ii id cognoscere non poterunt. Talia uero patescere quoque possunt a priori.

III. Ex regulae secundae *adcurata adplicatione cogniti antagonistae notentur*. Eidem enim musculo, in alio situ, alius est antagonista. Hos sane perpaucos nouimus, neque alios, quam qui omnium maxime in oculos incurrunt. Sunt uero, uel musculi, uel ossa, uel ligamenta, uel cartilagines. Ita flecti potest membrum, extensoribus ac flexoribus suis paralyticis, proprio pondere. Sic fit in dormientibus: ut & in uigilantibus, si, ceteris iisdem, extensor ualde relaxetur. Sic; in erecto, flexoribus paralyticis, caput si proprio pondere antrorsum nutet, extensores agunt. Ita *coscygaeorum* antagonistae sunt ligamenta: intercostalium; aliorumque, costas, in inspiratione, adtollentium; cartilagines costarum.

IIII. *Attendendum est singulari musculorum cobae-fioni*. Ita, *perforantibus artuum* agentibus, flectun-

P R A E F A T I O.

tuntur ultima bina digitorum internodia simul: ut & pedis pollex.

V. Reputandum; quatenam sit ratio actionis musculorum: ubi hi non agunt liberi, prout ab Anatomicis separantur; sed ab aliis, arte sibi incumbentibus; ut & a uaginis quibusdam comprimuntur. Sic fit in dorso; cubito; ac toto pede.

VI. Musculorum situ cognito; in uiuo, nudo homine, notentur, quinam, in quouis determinato corporis motu, musculi protuberent. Sed cautione opus est, memorata in memb. VI. Situs enim eorum nescius; tumorem, hinc & actionem, exteriori tribuet musculo, interno adscribendum.

Ex paucis hisce adductis elucet, problema propositum solutum nondum esse; sed & inde patet, cadauera sola illi soluendo non satisfacere. Quaedam eo conferrent bruta, si alia ratione, alium in finem, secarentur, quam secari solent. Immo crediderim, ni plane coecutio, omnes in omni corporis situ posibles motus describi posse, si sceletio, musculorum loco, adplicentur *fila ansata*, omni, quae in corpore obtinet, proportionem seruata. Quotiescumque rem cogitationibus fingo: toties nil deprehendo, quod repugnet. Est ergo possibilis. Et diligens eam in actum deducet. Inde ingens certe usus redundabit in Physicam, ut & artem Medicam. Certius sanabuntur musculorum contusiones: paralyfes: certius commendabitur aegro hic uel ille situs, ubi in uulnerato, uel, cui os fractum, antagonista musculus agere non posse colligitur. Et quae sunt cetera.

Denique, scitu foret digna *τελεολογια* musculorum, ex fabrica illorum collecta; in qua tradenda tam solliciti fuere ueteres; in primis Auctor *librorum; de usu partium;*

P R A E F A T I O.

tium; **VESALIVS**; **EVSTACHIVS**; **FABRITIVS**. Sic doceri deberet: Cur quisque musculus potius hic situs; quam alibi? Quatenam sit biuentrium ratio? Cur pectoralis musculi fibrae exteriores longissimae; interiores autem sensim sensimque breviores? Ut & massiteris, aliorumque? Cur rectus abdominis habet inscriptiones tendineas? Cur recto femoris; gastrocnemiorumque principiis singularis fibrarum decursus? Quare *obturator internus* in quatuor intrinsecus diuiditur musculos? Quae deduces e musculorum *figuris*? Infinita huc retuleris!

Haecce uolui, non aliorum, sed propria, ductus ratione, praefari; quorum causa nemo, arbitror, me cauillabitur. Circa praesentem uero librum pauca addo. Verti hunc librum, quia omnium accuratissime ac fidelissime musculorum exhibet historiam. Rarus ergo liber dandus fuit in manus hominum. Versionem adcommodaui Anatomiae, ita, ut huius folius ratio habita fuerit. Nolim ergo; libello huic contingat censor Grammaticus. Adiunxi tabularum **EVSTA.** citationes, pessime & perfunctorie alias explanatarum. Meis uero ubique fidas; etenim eas **Cl: ALBINVS** explicuit ipse, cum cadaueribus collatas: ego uero easdem postea cum descriptionibus auctorum, **VESALIANIS**que figuris comparaui. Subinde uero citandi fuerunt alii.

Notationes quaedam, quas adstruxi, debentur **Cl: ALBINO**: collectae quippe, quum, illo duce, Anatomica mea studia colerem: cuius & tractatum de *ossibus* corporis humani saepissime citaui, omnium quippe accuratissimum: ut ita, citata loca cum **EVST.** tabulis conferens, distinctam musculorum notionem impetrare possit.

P R A E F A T I O.

Ceteras autem non experientia, sed fidissimorum
Anatomicorum suggestit lectio.

In calce tandem libri addidi ordinem, quo natura,
circa ponendos musculos, usa fuit.

Dabam

Lugduni Batav. A: P: C: N: cix id ccxxix.
Mense Nouembri.

P R A E F A T I O.

Quamquam musculorum descriptio a uiris egregiis, industriisque, tradita saepe sit; nihilo tamen minus, amplam, poliendi illam ac emendandi, materiam relictam esse, uel libellus hicce, spinor, demonstrabit clarissime. Non quidem is sum, qui mihi persuadeam, me sustulisse errores quoscumque omnes, uel supplese, quae deficere uidebantur in argumenti huius scriptoribus: ne; tali quidem operi adhuc ultima imponenda manus!

Quid? quod nec dubitem ipse, me in quibusdam corrigi: aut ad minimum, descriptionibus meis, a dexteriore manu, limam adhiberi posse.

Nil descripsi, nisi, quod aiunt, de uiuo; hoc est, quae, inter dissecandum, oculis observaram, nulla aliorum descriptionibus adhibita fide: idque mihi, haec edendi, fuit incitamentum. Ante enim, quam quid ponerem de origine, progressu & insertione musculorum; eos examinaui, ab utroque latere, in plus, quam duodecim cadaueribus, tam foetuum, quam adultorum: tumque denique, obseruata mihi, securus, papyro commisi. Legi saepius, adtentusque euolui ab immortali GALENO usque ad haec tempora scriptores de musculis omnino omnes: tum, omnibus illorum descriptionibus inter se collatis, elegi uiuo maxime conformem; (hanc enim semper secutus sum normam) eamque tandem adcommodari

obseruatis: sicque correxi, quales uidebantur, errores (*Auctorum uero nominibus omisfis*); man-
caque suppleui, pro ratione obseruationum mea-
rum.

Quodsi tamen cuidam sederit sententia, de-
scriptiones meas falsitatis adcusandi; certus sit,
me semper prouocaturum ad cadauera: hæcque
si meis contraria obseruanda exhibuerint, agni-
tos damnabo errores illico. Omne uero illud, quod
iis opponetur, cadauerum testimonio non firman-
dum, susque deque habiturus sum.

Utque descriptionum mearum cum obseruatio-
nibus convenientiam ipsa re ostendere queam, sem-
per seruo dimidium cadaver, arte praeparatum,
(ex quo, inter cetera, descriptiones meas adorna-
ui,) in quo demonstrare possim, ubi recens non
fuerit ad manus.

Nec tamen descripsi, nisi reperta in pluribus
cadaueribus; enimuero non animaduerti tantam
naturae lusuam copiam, communiter memorato-
rum; ac in primis ab illis, qui accurate in-
quisitionis, dum musculos separant, laborem sub-
terfugunt. Constat tamen, naturaum quandoque
ludere ac uariare in musculi compositione; sic ob-
seruauimus duos palmares in una manu: detexi tria
bicipitis cubiti capita, singulari capite a medio
humeri oriundo: uidi interosseorum unum a
superiore carpi parte extrinsecus procedentem; ut
cetera fileam, alias adducenda.

Pars uero tractatus huius comparatiua, hoc
est, historia musculorum in cane, intertexta illi
humanorum, nullam, credo, defensionem poscit.
Tot enim necessaria inuenta per dissectionem qua-
dru-

drupedum: cognitio fabricae diversarum corporis partium; motus cruoris; chylique: ac intellectus actionis illarum partium; quæ omnia talibus sectionibus in primis debentur; abunde factum defendunt, si forte uulgus id exagitare uoluerit.

Quod vero speciatim concernit canis musculos, quem dissectioni meae selegi; ad conferendos illius musculos cum humanis, hosque cum caninis, duae me mouerunt rationes. Quarum altera est opportunitas demonstrandi, qua ratione musculi, auctores motuum, cani propriorum, eiusque uitae, ubi ab humana differt, necessariorum, reperiri, eorundemque usus intelligi possint.

Nam omisi ea omnia, ubi natura, tam in homine, quam in cane, produxit eadem: in plurimis enim musculis, in homine, respondentibus illis in cane, est adaequata fabricae similitudo. Vbi uero quaedam adparuit differentia, uel in origine, uel in insertione eorum, ibi, (Et ibi solum) notis meis comparatiuis locum dedi.

Altera fuit utilitas, inde redundatura in Anatomiae studiosos, quum facillime obtineant canem. Quod si enim in eo dextre separare musculos noverint; habiles futuri sunt eidem operi in humano corpore, si tantum semel, uel, ad summum, bis in eo sectiones suas perfecerint.

GALENUS, magnus ille Anatomicae scholae doctor; utrumque exsecutus est, commendauitque discipulis suis reiteratas simiarum dissectiones, ualde quippe proficuas, ubi admiranda fabrica, qua constant humani corporis instrumenta, intimius perspiciunda. Minime vero adfirmo, ut quidem alii id adserunt; illum, prae-

ter eas, dissecuisse nihil aliud; plures enim musculos accurate describit, prout reperiuntur in humano corpore; qua ratione in nullo quadrupede reperiundi: ut praeteream alias rationes contrarium omnino demonstrantes. Quum vero Celebratissimus Auctor nobis reliquerit historiam musculorum, tam simiae, quam hominis, notandum tibi est, lector, descriptiones eorum, quae habentur in eius administrationibus Anatomicis & Tractatu, de dissectione musculorum, maximam partem esse factas e simiis; illas autem, quae leguntur in admirabili eius opere, de usu partium, omnes desumptas esse de homine. Dolendum est, Magnum VESALIVM id non confideruisse.

Ordinem tenui eundem, qui servatur in Chirurgorum Collegio hujus urbis, quod omnium celeberrimum illustrissimumque hodie in Europa, quantum ad Anatomiam. Et, licet tanta auctoritas illi ordini tenendo suffecerit omnino: fatendum tamen est, illum esse omnium facillimum, tironumque capacitati adcommodatissimum.

Administrationem anatomicam, hoc est, modum, separandi musculos, prudens omisi: talia enim auxissent tractatus tam magnitudinem, (qui non, nisi manuale, debebat esse, ut commode adferri posset, ubi publica institueretur dissectio;) quam pretium; nullo tamen singulari in studiosos usu. Impossibile quippe, formare operatorem per praecepta, ore tenus prolata; quum id

id non , nisi manus exercitio , dissectionumque conspectu , obtineri possit. Persequar comparativam talem descriptionem per omnes sex partes , in quas corpus humanum diuisere *Anatomici*: praesensque de musculis specimen , quod se primum mihi commendauit , secutorum iam agmen ducat.

Monendus adhuc lector , musculos , detectos uel descriptos ab immortali *GALENO* , exhiberi absque ullo titulo vel signo : post illum uero repertos addita sibi habere inuentorum suorum nomina : illos tandem , quos , incognitos hactenus , assidua in hanc *Anatomes* partem industria , nec hominum , nec librorum auxilio , detexi , tribus asteriscis , post eorum adpellationes positis , distinguam. Quamuis uero musculorum denominationibus inuentorum adiecerim nomina ; eos tamen descripsi , ex meis obseruatis , praetermittendo , in quam parte ab illis Auctoribus secesserim. Vbi autem deprehendi descriptiones , uiuo conformes , uel obseruationes , quibus capiundis par fui ; eas Auctoribus suis re uera uendicaui , & praecipue maximam partem datas a Celeberrimo *COVPER* , cuius uel propriis uerbis saepe usus sum , quum impossibile fuerit , substituere alia , uiuum magis exprimentia. Estque is idem ille accuratissimus indefessusque *Anatomicus* , cui , pro actione plurimorum musculorum , tam humanorum , quam caninorum , me obstrictum sentio. Est ille idem , a cuius laboribus ac studio , cui ab admirabili dissecandi dexteritate & ingenti delineandi peritia par fama , perfectam musculorum humanorum historiam , nouis inuentis emen-

dationibusque abunde refertam, ornatamque figuris, de uiuo, propria manu, depictis, exspectamus cotidie.

Subiunxi tractatui huic tabulam explicantem musculorum nomina, cuius frequens lectio, adtentaque consideratio, facilia reddet, cognitaque plurimorum barbara, nec, sine difficultate, in memoriam reuocanda nomina.

Denique, studiose uitauimus communem errorem, absque necessitate, multiplicandi musculos. Sic; exempli causa: cubitum extendentes descripsi, ut unum musculum: ut & gastrocnemium cum solaeo, cui origo quadruplex; obliqui & transuersi abdominis musculi, ex mea sententia, tres tantum constituunt musculos, minime uero tot eorum paria. E contrario; de tripite femoris quatuor formaui musculos, quia ipsi tot distinctae origines & fines, ut patebit ex ipsa musculorum historia, ad quam iam pedem promoueo.

INTRODUCTIO.

Ante, quam musculos singulatim describere adgrediar, breuem fabricae, ac compositionis illorum in genere historiam, quidque *fibrae* ac *membranae* nomine intelligatur: in gratiam tironum praemittere, necesum duco: quae omnia erunt epitome reperiundorum in Auctoribus, qui ample ea de re differuere. *Fibra*, Graecis ἵς dicta, proprie significat uillos, a stirpium radicibus dependentes: in sensu autem Anatomico potest describi, quod sit *substantia*, *figuram* *similis* *tenui* *filo*, *sensilis* ac *irritabilis*, per cuius *uariam* *texturam* ac *combinationem* omnes *humani* *corporis* *firmae* *partes* *componuntur*.

Fibrarum harum diversae sunt species: aliae enim membranaceae; aliae carneae; aliae cartilagineae; aliae osseae; aliae nerueae: quarum tres ultimas intactas relinquimus; alio quippe pertinentes. *Fibrae* carneae sunt uasculosae & cauae, quae uel magnae uel paruae cellulae: hae dicuntur *fibrae motrices*; hoc est, princeps motuum muscularium *οργάνον*. Sed de his, ut &, de aliis fibris membranaceis & tendineis, plura dein.

Simili modo, fibrarum harum differentia desumi potest ab illarum situ, vel decursu: inde *rectae* uocantur, ubi decurrunt longitudinaliter, hoc est, secundum rectas: *circulares*; ubi in orbem currunt, quales sunt in *sphincteribus* musculis: *transuersae*, quae interfecant

rectas ad uarios angulos : *obliquae*, quae, & rectas, & transversas, ad inaequales angulos, decussant.

Membrana est *substantia lata, tenuis, alba, dilatabilis, cui uariae fibrarum species, telae instar intertextae.*

Graecis adpellatur *μην*, *χiton* & *μενιγξ* : omnia enim haec nomina in operibus HIPPOCRATIS & GALENI unum idemque notant, &, absque discrimine, usurpantur : sequentes autem scriptores ea singularibus membranis applicuere. Sic *μην* dicitur tantum plexus circularis, qui in interiore membrana uaginae uteri, ad ejus exterius orificium adparet : *μενιγξ* tribuitur solum membranis, cerebrum innolentibus : *χiton* autem notat adhuc membranam. Angli hodie, membranae uoce, late sumta, intelligunt *tegumenta* omnia, uestientia firma, uel continentia humores. Sed & haec quoque iam singularia nomina obtinuerunt, pro ratione partium, quas integunt. Ita membrana, *cranium* uestiens, uocatur *peri-cranium* : *thoracem* interne cingens, *pleura* : circumdata *abdomini*, *peritonaeum* : firmiter adhaerens ossum omnium superficiei, *περιosteον*. Praeterca, & partium quarundam singularium membranae naetae sunt singularia sibi nomina, ut patet ex earum historia. Membranae denique, ipsam partium membranacearum substantiam, ut, uentriculi, intestinorum &c. formantes, uel membranae uasorum, coercentes humores, proprie dicuntur *membranae*, & *uasa*.

Membranaceis fibris omnibus est elateris
spe-

species, unde, occasione data, facillime extendi, ac, propria ui, contrahi possunt; uti observatur in *peritoneo*, *uentriculo* & *utero*. Filamenta neruea, illis intertexta, reiectaque animalibus spiritibus, eas reddunt admodum sensiles; hinc ueterum error, membranas adferentium uera tactus instrumenta. Membrana omnis, tenuissima licet sensum, manifeste tamen duplex est: in cuius duplicatura uasa decurrunt. Ac interiori quidem eius membranae magna paruorum glandularum intertexta est copia, separantium humorem, qui eam lubricet, morbosamque ejus adhaesionem ad partes, quas tangit, impediat; ubi enim tegit *scirrhum uiscus*, ibi adhaeret firmiter uicinis omnibus.

Vfus membranarum est, inuoluere, ac tegere partes; eas firmare; nonnullas earum a subiectis seruare integras; sustinere uasa, supra illas in ramos distributa, & continere nexa. Quin & digna relatu observatio, admirabilem partium consensum inter se dependere; maximam partem, a ratione, secundum quam earum fibrae connectuntur.

Omnis pars corporis mollis, uulgo *caro* dicta, ab Anatomicis in uarias distribuitur partes, quas totidem dicunt musculos.

Musculus est fasciculus fibrarum carnearum tendinearumque, inclusus propriae membranae; ope cuius, omnes motus, in corpore animato, peraguntur.

Græcis *μῦς* audit (quod uocabulum *murem* proprie notat); idque forte ob similitudi-

nem, quam quidam eorum habent ad illud animal, quando cute orbatum. Alii autem, majori iure, deriuant a *μῦεν*, *contrabere*: haec enim propria musculo actio.

Totum musculi corpus communiter distinguitur in tres partes; nempe caput, uel originem; corpus, siue ventrem; & caudam, seu finem: uel in medium, & duas extremitates.

Caput est pars musculi, a maxime firma parte, quam uersus fit contractio, oriunda: Constans enim est regula, omnem muscolum moueri originem suam uersus: illa igitur motus sui centrum adpellari potest.

Origo musculi plerumque est tendineo-carnea: quandoque omnino tendinea; & nonnumquam carnea tantum.

Cauda, uel finis, musculi est pars eius, implantata, siue inserta membro mouendo: dicitur communiter *tendo* eius: quamquam FALLOPIVS illum, saepe *chordam* uocet; Graeci uero adpellant *απορρυγμωσιν*: quo uero uocabulo hodie tantum intelligunt expansionem tendinosam, siue dilatationem, membranae similem, a muscoli tendine procedentem, qualis a *bicipite cubiti*, *semitendinoso tibiae*, aliisque exit.

Substantia tendinis est reuera eadem cum reliquo musculi: fibrae eius solum sunt tam firmiter compactae ad inuicem, ut earum numerus maior in arctius spatium concludi possit: est durior, magisque albicans. Sicque fibrae musculi carnea sunt tantum *tendo* eius

diuisus & mollis, & tendo non est, nisi fibrae eadem, arctius unitae, prout SPIGELIVS id elegantissime omnium expresfit.

Vero est simile, singulum quemque musculum oriri, uel finire, tendinem (hac cum differentia, quod pauci eorum finiant in *περιosteον*, inseranturque immediate ipsi osi, licet maxuma pars per illam membranam se penetret), ubi fortior, magisque conspicuus tendo extenditur a parte carnea: tenuior uero, nec tam bene distinguendus, inter carnem se abscondit, uel fibris eius implicatur.

Juuat quoque, nosse, caput, musculique caudam, esse nomina, quae uni eidemque musculi parti successiue, ac iure, adplicari possint; pro diuerso enim corporis situ, extremitates hae quoque uariare debent, quia pars, immota ante, fixaque, iam fit mobilis.

Corpus musculi est pars eius media, fibris constans carneis, rubra, laxa ac spongiosa, aequae, ac obseruari potest in carne semicocta. Porro; quaeuis fibra componitur ex magno paruarum *fibrillarum* numero, quae sunt tot tenerrimi caui tubuli, colligati per parua, transversa, parallela fila, diuidentia eas in plurimas, magnas, uesiculas, nullibi communicantes inter se, sed tantum cruori, spiritibusque locum concedentes, ubi musculus contractus. Ruber fibrarum carnearum color debetur tantum recepto iis cruori: iniiciundo enim copiosissime tepidam in arterias, rubedo desinit, fibraeque eundem colorem cum tubis his distractilibus recipiunt.

Et hae iam sunt partes, musculo propriae.

Communes autem sunt arteriae, uenae, nerui, uasa lymphatica, & pinguedo. Arteriae adferunt cruorem; quem uenae ad cor referunt: nerui adducunt animales spiritus, quoties ipsis a mente communicatur impressio: lymphaeductus forte refundunt uenis a nutritione superstitites humores; pinguedo denique, inter fibras, & supra illas, posita, lubricat illas, actionique suae habiliores reddit. Musculus quisque uel simplex est, uel compositus; in priore fibrae carnea sunt parallelae, omnibus eadem directio: in posteriore autem in diuersis procedunt planis, uno interfecante alterum.

Omnes muscoli, eidem destinati actioni, dicuntur *congeneres*, quia sibi inuicem, in actione sua, succurrunt: oppositorum uero motuum auctores *antagonistae* adpellitantur. Sic; exempli gratia: *flexori* cuius est *sustensor* musculus. Estque aeternae observationis, uno eorum contracto, extendi eorum alterum: nam contractio musculi, agentis, necessario facit extendi antagonistam suum, uel eum, qui non agit.

Vfus, siue; actio musculorum est perficere omnes, diuersos partium motus; idque agunt, contractione propria. *Fibrillis* enim *motricibus* contractis, pars mobilis necessario agetur uersus fixam; uel partes, quae originem ac insertionem musculo concedunt, necessario propiores fieri debent. Quo autem modo id fiat, nunc quidem non inquiram; sed lectorem meum;

meum, talium speculationum amantem, remitto ad scriptores huius argumenti, ubi uariae eorum conjecturae perspicui possunt. Ego enim re uera paullulum delicatus sum in transcribendo alios. ~ Explicatio motuum muscularium, a Magno BERNOVILLI, Physico olim *Basileensi* tradita, in naturam, legesque *mechanismi* omnium maxime uidetur conueniens; necdum excogitata melior. Quumque incomparabilis eius tractatus difficulter adquiri possit, mox refarciet hanc iacturam orbi, noua eius editione; correctâ, multumque aucta, Doctor MEAD, qui singularem suam in huiusmodi studiis, Physicisque, capacitatem candori & pietati coniunxit. Haec enim est unanimes omnium, quibus innotuit, de illo vox!

Musculorum differentiae saepissime deductae a rebus, unde eorum nomina deriuantur; taediosas ergo repetitiones uitaturus quasque, remitto unumquemque ad *tabulam*, *explicantem musculorum nomina*, iamque progredior.

C O N T E N T A.

<p>Musculi <i>abdominis</i>. — <i>testium</i>. — <i>penis</i>. — <i>cutis fontis & occipitis</i>. — <i>palpebrarum</i>. — <i>oculi</i>. — <i>nasi</i>. — <i>labiorum</i>. — <i>genae</i>. — <i>auriculae</i>. — <i>auris internae</i>; & <i>meatus auditorii</i>. — <i>osfis yoidis</i>. — <i>linguae</i>. — <i>laryngis</i>. — <i>pharyngis</i>. — <i>uvulae</i>. — <i>tubae Eustachianae</i>. — <i>capitis</i>, in partibus, anteriore & laterali, <i>colli</i>, conspicui. — <i>colli</i>, anteriori eius parti incumbentes. — <i>maxillae inferioris</i>.</p>	<p>Musculi, conspicui in parte anteriore <i>thoracis</i>. — <i>vesicae urinae</i>. — <i>ani</i>. — <i>scapulae</i>. — <i>thoracis</i>, conspicui, cadauere prono. — <i>capitis</i>, conspicui, cadauere prono. — <i>colli</i>, posterius siti. — <i>dorsi</i>. — <i>lumborum</i>. — <i>humeri</i>. — <i>cubiti</i>. — <i>uolae manus</i>. — <i>carpi</i>. — <i>quatuor digitorum manus</i>. — <i>indicis manus</i>. — <i>digiti minimi manus</i>. — <i>pollicis manus</i>.</p>
---	--

Musculi radii. Caput	XXXIIX.	& minimo digito pedis.	XLVI.
— femoris.	XXXIX.	Adpēdix, continens mus-	
— coccygis.	XL.	culos, singulares femi-	
— cruris.	XLI.	nae. p: 175.	
— tarfi.	XLII.	Catalogus musculorum,	
— quatuor minorum di-		praesentium in corpore	
gitorum pedis.	XLIII.	humano, & deficien-	
— pollicis digitorum pe-		tium in cane. p: 179.	
dis.	XLIII.	Catalogus musculorum,	
— minimi digiti pedis.		singularium cani. p: 180.	
	XLV.	Tabula, explicans nomina	
— communes pollicis		musculorum. p. 181.	

Index partium Alphabeticus, una cum nominibus & numero muscutorum, ad illas pertinentium.

MVSCVLI ABDO- MINIS, V.

Obliquus adscendens.

— descendens.

Pyramidalis.

Rectus.

Transuersalis.

MVSCVLIANI, III.

Leuator maior, siue, internus.

Leuator minor, seu, externus.

Sphinctor externus.

— internus.

MVSCVLI AVRICV- LAE,

Communes.

Proprii.

MVSCVLI AVRIS

INTERNAE, III.

Externus auris.

Internus.

Musculus stapedis.

Obliquus.

MVSCVLI CAPITIS, XII.

Caput concutiens.

Complexus.

Obliquus inferior.

Obliquus superior.

Rectus, internus, maior.

— — — minor.

— — — lateralis.

— — — maior.

— — — minor.

Splenius.

Sterno-mastoidaeus.

Trachelo-mastoidaeus.

MVSCVLI CARPI, III.

Extensor carpi radialis.

— — — ulnaris,

Flexor carpi radialis.

— — — ulnaris.

MVSCVLVS COCCY- GIS, I.

Coccygaeus.

MVSCVLI COLLI, VI.

Interspinales.

Intertransuersales.

Interuvertebrales.

Longus.

Spinales.

Transuersales.

MVSCVLI CVBITI, V.

Angonaeus.

Biceps

Biceps externus.
 ——— *internus.*

Brachialis externus.
 ——— *internus.*

**MUSCULI QVAT-
 TOR DIGITO-
 RVM MANVS, V.**

Extensor digitorum manus.
Flexor profundus.
 ——— *sublimis.*

Interossei.
Lumbricales.

**MUSCULI QUA-
 TOR DIGITO-
 RVM PEDIS, VI.**

Extensor brevis.
 ——— *longus.*

Flexor profundus.
 ——— *sublimis.*

Interossei.
Lumbricales.

NB. Musculos pollicis, in-
 dicis, & digiti minimi,
 quaere, secundum ordinem
 alphabeticum.

MUSCULI DORSI,
 III.

Longissimus.
Semispinalis.

Transuersales.

**MUSCULI FEMO-
 RIS, XVI.**

Adductores.

Gemini.

Glutaeus maior.

——— *medius.*

——— *minor.*

Iliacus externus.

——— *internus.*

Obturator externus.

——— *internus.*

Pectinalis.

Psoas magnus.

Quadratus.

**MUSCULI CVTIS
 FRONTIS, ET OC-
 CIPITIS, II.**

Musculus frontalis uerus;
seu, corrugator COITE-
RI.

Occipito-frontalis.

MUSCULI GENAE,

II.

Buccinator.

Quadratus.

MUSCULI HVMERI,

IX.

Corobrachialis.

Deltoides.

Infraspinatus.

Latissimus dorsi.

Pectoralis.

Subscapularis.

Supraspinatus.

Teres maior.

——— *minor.*

MUSCULI OSSIS

YOIDIS, VI.

Coraco-yoidaeus.

Genio-yoidaeus.

Mylo-yoidaeus.

Sterno-yoidaeus.

Stilo-chondro-yoidaeus.

Stilo-yoidaeus.

MVSCVLI INDICIS,

III.

Abductor indicis.

Extensor secundi internodii indicis proprius.

Extensor tertii internodii indicis.

MVSCVLI LABIO-

RVM, IIX.

Depressor labii inferioris proprius.

superioris proprius.

labiorum communis.

Elevator labii inferioris proprius.

superioris proprius.

labiorum communis.

Sphincter labiorum.

Zygomaticus.

MVSCVLI LARYN-

GIS, IIX.

Arytaenoidaeus maior.

minor.

Crico-arytaenoidaeus la-

teralis.

Crico-arytaenoidaeus, pos-
ticus.

thyreoidaeus.

Sterno-thyreoidaeus.

Thyreoidaeus.

To-thyreoidaeus.

MVSCVLI LIN-

GVAE, III.

Cerato-glossus.

Genio-glossus.

Lingualis.

Stilo-glossus.

MVSCVLI LUMBO-

RVM, V.

Intertransversales.

Poas parvus.

Quadratus.

Spinalis.

Transversalis; seu, sacer.

MVSCVLI MALLEI

Vide musculos auris inter-

nae.

MVSCVLI MAXIL-

LAE INFERIORIS,

V.

Digastricus.

Masfiter.

Pterigoidaeus externus.

internus.

Temporalis.

MVSCVLVS MEA-

TVS AUDITORI, I.

Musculus, meatus audi-

torii.

torii notus.

MUSCVLI MINIMI

DIGITI MANVS, III.

Abductor minimi digiti.

Extensor tertii internodii

minimi digiti.

Flexor primi internodii mi-

nimi digiti.

MUSCVLI MINIMI

DIGITI PEDIS, II.

Abductor.

Flexor primi internodii

minimi digiti.

MUSCVLVS NASI, I.

Rinaeus, uel, nasalis.

MUSCVLI CUTIS

OCCIPITIS.

Vide musculos cutis fron-

tis.

MUSCVLI OCULI, VI.

Abductor.

Adductor.

Depressor.

Elevator.

Obliquus inferior.

— *superior.*

MUSCVLI PALMAE

MANVS, II.

Palmaris brevis.

— *longus.*

MUSCVLI PALPE-

BRARVM, II.

Aperiens palpebr.

re-

ctus.

Orbicularis palpebrarum.

MUSCVLI PENIS, II.

Adcelerator urinae.

Erector penis.

MUSCVLI PHA-

RYNGIS, XII.

Pharyngaeus:

cuius ua-

riae fibrarum series

sequentia adcepere no-

mina:

Cephalo-pharyngaeus.

Chondro-pharyngaeus.

Crico-pharyngaeus.

Glosso-pharyngaeus.

Mylo-pharyngaeus.

Pterigo-pharyngaeus.

Salpingo-pharyngaeus.

Stilo-pharyngaeus.

Syndesmo-pharyngaeus.

Thyreo-pharyngaeus.

To-pharyngaeus.

MUSCVLI POLLICIS

MANVS, IX.

Abductor.

Adductor ad indicem.

— *minimum di-*

gitum.

Extensor primi internodii.

— *secundi interno-*

dii.

— *tertiij internodi-*

Flexor internodii primi.

— *secundi.*

— *tertiij.*

**MVSCVLI POLLICIS
PEDIS, VI.**

Abductor.

Adductor.

Extensor brevis.

longus.

Flexor brevis.

longus.

**MVSCVLI RADII,
III.**

Pronator quadratus.

teres.

Supinator brevis.

longus.

**MVSCVLVS STA-
PEDIS.**

*Vide musculos auris inter-
nae.*

**MVSCVLI SCAPV-
LAE, III.**

Leuator scapulae.

Rhomboides.

Trapezius.

MVSCVLI TARSII, VI.

Extensor tarsi suralis ;

vulgo, gastrocnemius &

soliaeus.

Extensor tarsi minor ; vul-

go, plantaris.

Peronaeus primus.

secundus.

Tibialis anticus.

posticus.

MVSCVLITESTIVM,

II.

Cremaster.

Dartos.

**MVSCVLI THORA-
CIS, XII.**

Cervicalis descendens.

Costarum depressores.

levator.

Diaphragma.

Intercostales.

Sacrolumbalis.

Scalenus.

Serratus, inferior, posticus.

Serratus, maior, anticus.

minor,

Serratus, superior, post-

icus.

Subclavius.

Triangularis.

MVSCVLI TIBIAE,

II, XI.

Biceps.

Cruraeus.

Gracilis.

Membranofus.

Popliteus.

Rectus.

Sartorius.

Semi-membranofus.

Seminervofus.

Vastus externus.

internus.

MVSCVLVS TVBAE

EVSTACHIANAE.

Musculus tubae nouae,

vel,

uel *Palato-salpingaeus*.

MUSCVLI VESICAE,

II.

Detrusor urinae.

Sphincter.

MUSCVLI VVVLAE,

III.

Glosso-staphilinus.

Palato-staphilinus.

Salpingo-Staphilinus.

Thyreo-staphilinus.

Explicatio nominum Auctorum, compendiose in hoc
 Tractatu citatorum, additis simul librorum eo-
 rum titulis, ut & musculorum, ab ipsis
 detectorum.

CANAN: Joannes Bap-
 tista Cananus in muscu-
 lorum humani corporis
 picturata dissectione. (a)
 Ferrariae. 1572. descri-
 bit

Palmarem breuem.

CASSER: Julii Casserii,
 Placentini, de uocis, au-
 ditusque organis historia
 Anatomica. Ferrariae,
 1600.

Ibi habetur

Externus auris.

Inque ejus Tabulis Anato-
 micis, a Daniele BV-
 CRETIO editis (b),
Transuersalis pedis.

COITER: Volcheri Coi-
 ter externarum & inter-
 narum principalium cor-
 poris humani partium ta-
 bulae, atque Anatomicae
 Exercitationes, obserua-

(a) Hunc nondum uidi: ergo
 nec locum, ubi musculus ille
 describitur, citare potui.

(b) Habentur illae quoque in
 editione operum SPIGELI,
 mox adleganda.

tionesque uariae. Norim-
 bergae 1573. (c) ubi de-
 scriptus

Corrugator.

COVVP. Gulielmi Couu-
 per myotomia reformata
 Londini 1694. Anglice,
 ubi habentur:

*Eleuator labii inferioris
 proprius.*

*Depressor labii superioris
 proprius.*

Pterygo-pharyngaeus.

Rectus, internus, minor.

Interspinales.

Spinalis lumborum.

*Extensor pollicis pedis bre-
 uis.*

*Flexor primi internodii mi-
 nimi digiti.*

Costarum uero depressores,
 ipsi detectos, mihi com-
 municauit coram, pro
 gratia sua.

In Transactionibus Angli-
 ca-

(c) Neque hunc teneo Aue-
 torum.

canis. A. 1699. n. 21. p. 132. descripsit.

Inter-transuersales coll.

DIEMERBR. *Librandi de Diemerbroeck Anatomie corporis humani. Vl-trajecti. 1672; ubi reperitur:*

Cervicalis descendens.

DVVERN: *Josephi du Vernay Tractatus, de organo auditus, continens structuram, & morbos omnium auris partium.*

Norimbergae 1684. (d), ubi describuntur

Musculus auris externus.

— *stapedis.*

EVSTACH: *Bartholomaeus Enstachius de auditu organis; qui Tractatus editus cum ejus Opusculis Anatomicis. Venetiis 1563. Ibi detexit*

Musculum auris internum.

FABRIT: *Hieronymus Fabritius ab Aquapendente de auditu. Patavii 1600. Describitur*

Musculus auris externus.

(d) Vfus sum editione Gallica; quae Paris. A. 1683. in 8, praestantiore quippe.

(e) Habui editionem A. 1564. ubi figurae additae.

FALLOP. *Gabrielis Fallopi Observationes Anatomicae, Venetiis 1562. impressae (f) exhibent Pyramidalem abdominis; Acerientem palpebram, rectum:*

Mylo-goidaeum;

Rectum lateralem:

Pterygoidaeum externum:

Capitis par tertium: &

Erectorem clitoridis.

GALEN. *Claudius Galenus descripsit omnes musculos, in specimine hoc memoratos, quibus nec nomen, nec nota addita, in incomparabilibus suis scriptis de dissectione musculorum, ad tirones; de Anatomicis administrationibus: & de usu partium corporis humani.*

RIOLAN. *Joannes Riolanus in Anthropographia Parisiis 1649. euulgauit.*

Leuatorem ani externum.

Ycas paruum.

Angonaeum.

Υποβλαρ.

Θεραρ.

SPI-

(f) Ego uero adhibui Venetam, A. 1606. editam.

SPIGEL: *Adrianus Spigelius* descripsit in *fabrica corporis humani*, ex recensione *Joannis Antonidae uan der Linden Amstael. edami* 1645.

Lingualem.

STENON: *Nicolai Stenonis de musculis & glandulis observationum specimen. Hafniae* (a) 1607. ubi

Costarum leuatores & Musculi, ad sacrolumbum adcesorii.

SYLV: *Jacobi Sylui opera Medica Coloniae Allobrogum.* 1630. (b), ubi *Massa carnea, seu musculi* *ae carnis portio.*

VALSAL: *Antonius Maria Valsalua de aure humana. Bononiae* 1704. ubi describuntur:

Crico-pharyngaeus.

Glossopharyngaeus.

To-pharyngaeus.

Thyreo-pharyngaeus.

Glossostaphilinus.

Salpingo-staphilinus.

Musculus tubae nouus.

VESAL: *Andreae Vesalii humani corporis fabrica. Basileae* 1543. (c) ubi habetur

Par nonum pedis.

Sequentes musculos, quorum nominibus additi tales asterisci ***, detexit

Auctor, quum *muoto-*
mau exerceret; suntque:

Musculus meatus auditorii.

Stilo-chondro-yoidaeus.

Chondro-pharyngaeus.

Mylo-pharyngaeus.

Salpingo-pharyngaeus.

Syndesmo-pharyngaeus.

Palato-staphilinus.

Thyreo-staphilinus.

Intertransuersales colli.

— — — *lumborum.*

Coccygaeus.

Duo musculi uaginae uteri.

(a) Et illo carui.

(b) Neque hic ad manus jam fuit.

(c) Ego uero editione ultima, quae *Leidenfis*, usus sum.

MVSCVLORVM DESCRIPTIO.

C A P V T I.

MVSCVLI ABDOMINIS.

§. I.

OBLIQVVS DESCENDENS.

Oritur, (1) pluribus tendinibus, (quo- *Origo.*
rum qui *dorsi uertebis* proprio-
res, ceteris longiores sunt) a
septem costarum, a quinta nem- *EVST.*
pe usque ad penultimam, infe- *T. 35.*
riori margine, aliquantum ante illarum cartila-
gines: (2) tendineo-carneus ab omni earumdem *EVST.*
costarum exteriori latere, propè illarum adpen- *l. c.*
dices cartilagineas. Quatuor supremæ, acu- *EVST.*
taeque illius origines intermiscentur, supra *T. 28. 31.*
costarum corpora, *ferrati antici maioris di-* *EVST.*
gitulis; reliquæ uero omnes adhaerescunt *T. 31.*
latisimo dorsi, ubi e costis prodit.

II. Inferitur (1.) carneus exteriori spinæ *Inferio.*
(α) *osfis ilium*, ultra huius dimidium. (2.) *1. EVST.*
tendineus parti anteriori *osfis* eiusdem: (3) *pe-* *T. 28. 32.*
ritonæo talis: (4) *osfi pubis* (ε), tendine du-
plici: tum & largo, membranaceo, (5) toti

B 5

al.

(α) ALBIN. de ossibus C. H. §. 191. 3.

(ε) ALB. §. 186. 7.

albae lineae, ut & (6) parti inferiori *osfis pectoris*. (a)

Actio.

III. (1) Comprimit *uiscera abdominalia*: (2) deorsum ducit *costas*, in *expiratione*: & (3) *truncum corporis* in unum *latus* convertit. (b).

EVST.

T. 36. 37.

NB. Ante, quam hic *musculus* auferatur, (c) separanda est pars *latisissimi dorsi*, ubi adhaeret *osfi ilium*: tumque adparebunt *obliquus internus*, *triangularis lumborum*, tendo *transversalis abdominis*, ut & *sacro-lumbalis*.

In cane oritur (1) a *decem costis inferioribus*: & (2) *membranaceus* ab *summitatibus spinarum* quatuor *supremarum* *vertebrarum lumborum*.

§. 2. OBLIQUVS ADSCENDENS. (d)

Origo.

1. EVST.

T. 36.

2. EVST.

T. 32. T.

35.

4. EVST.

T. 35.

Insertio.

1. EVST.

T. 36.

2. EVST.

T. 35.

I. Oritur (1) *tendineus*, a parte posteriore *spinæ osfis ilium*: (2) *carneus*, a tota reliqua eiusdem *osfis* *pectoris*; tum *tendineus* (3) a *peritoneo*, & (4) a parte media & antica *osfis pubis*.

II Inferitur (1) *carneus* *margini inferiori costæ ultimæ*, & *extremitatibus duarum*, *superne proximarum*: (2) *tendineus* *cartilaginibus*

(a) *Cartilaginem* ergo *ensiformem*, ubi hic *musculus* agit, *intrôprimit*: ut patet in *respiratione*.

(b) Sic ingeniose omnium primus motum hunc, RIO-
LANO iam observatum, explicat COVVER in M. R.

(c) Difficiliter separari potest hic *musculus* a subiectis ipsi *intercostalibus*, ne vel hos, vel illum laedas.

(d) Dicitur quoque *obliquus internus*. Male vero *obliquus* dicitur; nam & *fibrae* eiusdem quaedam *rectæ* *adscendunt*; aliae feruntur per *transversum*. Male quoque *adscendens* dicitur; nam & *fibrae* eius plurimæ *descendunt*, & per *transversum* currunt. Id omne eleganter expressit EVSTA. T. XXXV.

nibus costarum omnium, infra os *pectoris* positarum, ut & omni *lineae* albae longitudini.

Quum trium ultimarum costarum cartilagine sibi inuicem non adhaereant; inter illas musculus hic procedit carneus.

III. Eadem fere agit, quae praecedens (§. 1. III.). Vtriusque uero his unita fortior, ob fibras eorum carnes, uarie decurrentes, seque decussantes.

In cane, praeter dictas origines, adhuc alia ipsi à lumborum spinis, ope tenuis, tendineae membranae; uti dictum supra (§. 1.)

§. 3. Quicumque taediosum descriptorum (§. 1. 2. II.) tendines separandi, laborem adgredietur; obseruet illum interni (§. 2. II.), ante, quam ad dictam *albam lineam* pertingat, fere totum euanescere in illum externi (§. 1. II.) Hoc uero ut conspici possit, dissecanda prius est membrana tendinea, quae, a *transuersalis* tendine ad semilunarem lineam procedens, hic cum *adscendentis* tendine (§. 2. II.) coalluit (e).

§. 4. PYRAMIDALIS FALLOP: (f)

I. Ori-

(e) Tendinem huius musculi, ubi ad *albam lineam* pertingit, in duas partes fandi dicunt Anatomici, *rectam* musculum, uaginae instar, includentes; parte eius tendinea, sub recto, coeunte cum *transuersalis* tendine: supra uero illum posita, cum *externi* (§. 1.) tendine confluente. Id uero demonstratum non est. Auctor uero noster sequitur sententiam COVPER l. c. V. CO-LUMB. L. V. C. XXII.

(f) In *observationibus Anatomic.* p. 68. Nempe primus illum separauit ab *recto*; licet iam ante cognitum *VESALIO*, qui & eum depinxit, uocauitque *principium recti carnis*. Abest uero quandoque in uno latere, nonnunquam & in utroque, tamen uero inferiores *recti* partes longe magis sunt carnae, latioresque. A-RANT. C. XL. *Obseruat.*

Origo. I. Oritur, carneus, a medio partis anterioris *osfis pubis*.
EVST. II. Inferitur, longo tendine, ubi *musculi transuersales* coeunt, inter *rectos* medius, paululum infra umbilicum.
T. 33. VE. SAL. T. V. L. II. n. Infertio.

Actio. III. Abdomen deorsum trahendo, uesicamque comprimendo, lotii expulsionem promouet: ut dixit FALLOPIVS. (g)

Hic non adest in cane.

§. 5. RECTVS.

Origo. I. Oritur, (1) crasso, breuique tendine, a parte superiore & antica *osfis pubis*: (2) tendine longo, alioque paruo, ab eodem osse, prope originem *corporis penis cauernosi*. (i)
EVST. Tumque illico fit carneus.
T. 33.

Infertio. II. Inferitur, *tendineo-carneus*, cartilaginibus costarum, septimae, sextae & quintae, prope *os pectoris*. (h)

EVST. Quum fibras quasdam carneas ab infima pectoralis musculi origine recipiat; hinc ad insertionem suam multo largior est, quam ulibi alibi.
l. c. adcurate habet.

EVST. Obliquorum tendines (§. 1. 2. II.) difficulter a recti musculi inscriptionibus separantur. Harum infima est umbilico parallela: reliquae autem omnes supra illum adparent. (i)

Fi-

(g) Id autem praecipue agit in iunioribus: in his enim magis prouerberat impleta uesica, quam in adultis: uti docet P. FRANCI modus, secandi uesicam, succedens in iunioribus.

(h) Inferitur, digitis serratis.

(i) Plerumque tales inscriptiones sunt tres; uti habet *EVST.* l. c. quandoque tamen quatuor, sed saepius in femina, quam in uiro. Adparent in uiuo homine,

ma-

Fibrae transuersalis carnea, ubi supra *os pubis* decurrunt disperfae, ibidem firmiter adhaerent *recto*.

III. (1) Comprimit partem abdominis anteriorem: (2) Pro diuerso corporis positu pectus adducit *pubi*, sicque truncum flectit antrosum uel contra hanc illi; ut, dum surgimus decumbentes. (1)

In cane inseritur (1) *carneus*, parti inferiori *osis pectoris*: (2) *tendineus*, toti illi *osis reliquo*.

§. 6. TRANSVERSALIS. (m)

I. Oritur (1) largo, sed tenui, tendine, a processibus transuersis *uertebrae lumborum*: (2) *carneus* (2) a margine interiore *spinæ ilium*, & (3) a cartilaginibus costarum omnium, quae infra *os pectoris*.

II. Inferitur (1) *tendineus* & *carneus cartilaginis ensiformis*: (2) *tendineus* toti *albae lineae* & *peritoneo*: firmiter adhaerens *paruae osis pubis protuberantiae*, (3) ad *recti* (5) *latus externum*.

III. (1) Comprimit latera abdominis. (2) iuuat, in expiratione,

§. 7.

macilento & nudo; idque eleganter obseruant pictores, & statuarii.

(1) Quin & castas deprimit, quibus inferitur in expiratione.

(m) *Vasa mammaria*, e thorace, inter ultimae uerae costae marginem & cartilaginis ensiformis, prodeuntia, iunguntur, sub *recto* (5) supra *transuersum musculum*, obtuiis sibi uasis *epigastricis*. Id optime expressit VESAL. T. II. F. VI. f. & BIDLOO. T. XXXII. F. I. PP.

(2) ALBIN. l. c. §. 136. (3) ALBIN. l. c. §. 164. (3) ALBIN. §. 186. 6

§. 7. *Peritoneum* dum dixi (§. 1. 2. 6.), per id intelligo id, quod Auctores *ligamentum pubis* uocant. Hoc autem non est, nisi firma cohaesio tendinum musculorum descriptorum (§. cit.) cum *peritoneo*, inter partem anticam *spinæ ilium* & *os pubis*; (n) unde herniae illic loci, siue, delapsus intestinorum, certae alias, re uera impediuntur.

§. 8. Musculi descripti (§. 1. 2. 6.) non sunt habendi pro totidem paribus, sed pro totidem singularibus, digastricis, musculis, quippe quibus duo uentres, & unus largus medius tendo; ut iam sensere omnes, COLVMBI temporibus. Vid. R. COLVMBVS de re Anatomica L. V. C. XXII. de musculis.

§. 9. *Linea alba* est pars tendinum musculorum (§. 1. 2. 6.), adparens in intercapedine *rectorum* (§. 5.), inter *cartilaginem ensiformem* & *os pubis*, ubi dicti tendines sibi firmissime adhaerent. Arctaque illa unio producit albedinem, ibi omnium maxime conspicuam. Tendines ergo illos quum dixi *albae lineae* inferi; soli me loquendi consuetudini adcommodauit.

§. 10. Memorati (§. 1. 2. 6.) musculi omnes perforati sunt, paullulam supra *os pectinis*, in uno latere, & obliqui (§. 1. 2.) quidem in parte tendinea; transuersus (§. 6.) uero in carnea; ut *processui peritoneae*, continenti *uasa*, *deferens* & *feminalia*, *ampulae*

(n) obseruat nempe ALBINVS, uaginam, inuestientem femur, eousque ascendere, illumque marginem tendineum ambire undique: dum ergo membranam illam abscindis, formas tibi *ligamenti* speciem. Ligamentum illud ab inuentore dicitur *ligamentum ROYPARTI*.

plae inclusa membranae, quae a dicto processu distincta, uia concedatur. (o) Enimvero, praeter recensita, semper obseruauinum ac arteriam, ibi ab abdomine ad *scrotum*, *inguen*, *femorisque* supremam partem transeuntes; ut & uenulas quasdam, (ab his partibus ad uentrem remeantes. Musculus *cremaster* tantum obliquos (§. 1. 2.) perforat. Admirabilem uero, necessariamque *annulorum* dictorum musculorum indolem exponam alibi.

EVST.
T. 28. 32.
33.

(o) Dum *funiculus spermaticus* per tendines obliquorum (§. 2.) transit, liber est a compressione. Per *transuersalem* (§. 6.) uero non transit, sed sub imo eius margine: musculus enim ille non pertingit ad *ligamentum pubis* (§. 7.) usque.

CAPVT II.

MYSCVLI TESTIVM.

Testiculo cuius unus est proprius musculus: utrique autem unus communis, qui *dartos*.

§. 11. DARTOS.

Est tenuis, musculosa membrana, ambos testes includens.

Agens, *serotum* contrahit, corrugatque. (a)

§. 12. Musculus, cuius testi singularis, est

CREMASTER.

I. Oritur, distincte, (1) a parte ima &

ante-

Orig.
EVST.
T. 33. ubi
utraque
origo.

(a) Vidit de GRAAF, qui, quando uoluit, *scrotum* adtrahere ualuit, idque membranae huius actio-
ne,

antere spinae *ilium*: (2) a coniunctione
osium pubis & *ilium*. (a)

Insertio.

EVST.

T. 28. 32.

Actio.

II. Inferitur *uaginali tunicae*, supra quam
 in plurimas, diuersas partes dispersus.

III. *Testem* sursum ducit, atque fuspendit. (b)

(a) ALBIN. §. 186. 4. do

(b) Narrat BARTHOL, se uidisse, quibus testes,
 pro lubitu, fuere mobiles: id ergo egit hicce muscu-
 lus. Addunt quidam alium adhuc *cremasteris* usum,
 quod nempe testem comprimat, exprimat: id quod
 de caballis docuit MALPIGHI, observator. Dubia
 autem haec eius actio in homine. Inuaret ergo, tem-
 pore coitus.

C A P V T III.

MVSCVLI PENIS.

§. 13. **P**enis duo adcepit musculorum pa-
 ria; quorum alterum est distinc-
 tissimum; alterum autem, tam in origine,
 quam in progressu suo ita cohaeret, ut sepa-
 rari nequeat. *Transuersalis penis*, cuius men-
 tionem facit FABRITIUS, (a) nonnullis
 pro *leuatore ani externo* RIOLAN. descrip-
 tus ac depictus, est tantum pars musculi
adceleratoris urinae, ab *ischii* tubere oriunda.
 Quum enim *cauo ouali* (b), uel, bulbo *ure-
 thrae*

COVVP.

adpend.

ad M. R.

F. X. EE.

F. XII.

EE.

(a) Hunc iam cognitum G. STEPHANO, depictum-
 que, contendit MORGAG: in *epistola* l. *Anatom.* n. 88.
 LITRE uero in *Actis Parisinis* A. P. C. N. MDCC.
 eos perperam *dilatatores urethrae* dixit.

(b) Bulbum *urethrae* ita, ante COVUPER, uocauit
 BARTHOL.

thrae, non inferatur, sed cum dicto musculo ibi conjungatur; hujus alteram originem constituit.

§. 14. ERECTOR PENIS.

I. Oritur, tendineus & carneus, inter *tuber ossis ischium*, & *corporis cauernosi* originem, medius; (c) (a) huiusque totum *mus* ambit.

Origo de GRAAF
de *erg.*
uiror. T.
IIX. K.K.
T. IX. F.
I. M.M.
Insertio.

II. Inferitur externae firmae membranae duorum corporum cauernosorum *penis*, pone horum unionem.

III. *Penem* trahit *os pubis* uersus; eoque ipso compressa magna ipsius uena, refluente cruori sub illis ossibus negatur exitus: sicque surgit *colis*. Vid. appendix ad egregiam *myotomiam reformatam* COVPER.

Actio.

§. 15. ACCELERATOR VRINAE.

I. Oritur (1) carneus, a *sphinctere ani* externo & superiore *urethrae* parte: (2) tendineus, ab *ischium osse*.

Origo 1. de GRAAF
I. c.
T. 7. K.L.
Insertio.
BID-
LOO: T.
47. HH.
Actio.

II. Inferitur *corpori cauernoso*, ab ortu ejus usque ad locum, qui mox infra illorum corporum unionem. (d)

III. Aequabilissime comprimit *urethrae* bulbum, sicque cruorem pellit *glandem* uersus, ut tendi possit. (e)

C

§. 16.

(a.) ALBIN. §. 189. I.

(c) Prope ligamentum, quod ab illo tubere ad os sacrum pertingit.

(d) *Accelerator* ille unus tantum proprie est musculus, e quo tamen duos formant, ubi per mediam longitudinem disciuntur.

(e) Semen quoque, & urinam, ingenti ui, exprimit: & huius in primis ultimas guttulas. Quoties in senecta minus agit, eidem succenturiantur compressu *urethrae* externo, ad perinaeum facto.

§. 16. *Alius adhuc , praeter descriptos (§. 14. 15.), cani datus est musculus , qui TRANSVERSALIS mihi dicitur. Huius , uere digestrici , duo uentres oriuntur , ab utroque latere , a paruo , ac terete , tuberculo , quod in inferiore ossis pubis parte , uniti , per medium tendinem , inter illud os atque penem. Facilis foret explicatu erectio penis in hoc animali , posterius coeunte , a singulari huius musculi fabrica , a corpore cartilagineo , sub ossibus pubis transuersim posito , ut ♂ , ab ingente penis uena , inter hanc ♂ dictum musculum decurrente ; ast , alii id reservabo occasioni , alienum quippe a praesenti argumento.*

C A P V T III.

MVSCVLI CVTIS OSSIVM , OCCIPITIS , FRONTISQVE.

Cutem capitis mouet unum musculorum par , unusque biuenter musculus.

§. 17. MVSCVLVS FRONTALIS VERVS , siue , CORRUGATOR COITER:

Origo.
SAN-
TORI:
obf. Anat.
T. 1. f.

I. Oritur , carneus , a proesfu ossis frontis , prope internum orbitae angulum , supra coalitum ossis nasi , ut & processus superioris ossis maxillaris cum illo frontis : (α) Inde decurrit , oblique , extrorsum , sursumque.

Insertio.

II. Inseritur parti carneaë sequentis musculi , fibrillis quibusdam , per hunc , se penetrantibus in cutem , loco , paullo altiore , quam est pars media superciliorum.

III.

III. Cutem frontis complanat, eam deorsum trahendo, post actionem *occipito frontalis*; uel, fortius contractus, illam corrugat, inter *superciliorum* intervallum, uti adparet, dum forte supercilia corrugamus.

Hic cani datus non est.

§. 18. OCCIPITO-FRONTALIS.

I. Oritur (1) carneus, a linea *occipitis* transversa, opposita parti superioris insertionis *massoidaei*, & parti originis *trapezii*, ipsi contiguæ: (2) tendineus, a reliquo illius lineae, posteriora versus. Eadem ipsi, ab altero latere, origo. Hinc adscendit rectus, moxque totus factus tendineus, integit ossa uerticis & *squamosa*, temporalibus musculis incumbens: exteriori eius margine *ossi iugali*, ab utroque latere, adhaerente. Largus hicce tendo, prope *suturam coronalem*, carneus factus, usque ad *orbiculares musculos* recta descendit.

Origo.

EVST.

T. 29. 31.
43. ubi *occipitales quadratos* tormauit, a *frontalibus* diuersos.

II. Inferitur cuti, ad supercilia; unde descendente, inter illa, obseruauit angustum, carneum, fasciculum, continuatum supra *os nasi*, usque ad eius partem cartilagineam, ubi fibrae eius declinant, ad utrumque latus; insertum cuti, supra *musculum*, *naso proprium*.

Insertio.

EVST.
fere ubique: sed ita tamen ac si ars succurrere uoluerit naturae. In primis T. 41. F. 1.
Actio.

III. Musculus hicce biuenter, omnem superiorem caluariæ partem, mitræ instar, integens, actus, cutem capitis retrahit, eodemque tempore, cutem frontis sursum ducit ac contrahit. Huic antagonista est *corrugator*.

(§. 17.)

Putauit COLVMBVS; *musculum occipitalem*,
C 2

talem, quem primus descripsit, titulo musculi, supercilium trabentis, iungi frontali, largo suo tendine; sicque illum retrahere cutem frontalem atque occipitis. Vid. L. V: C. VII. de hisce musculis.

Musculus hic in cane est tantum pars membranae carnosae, obductae toti calvariae, cutem inter ac musculos.

CAPVT V.

MVSCVLI PALPEBRARVM.

Duo palpebris data sunt musculorum paria: & alterum quidem superiori tantum: alterum uero ambabus commune.

§. 19. APERIENS PALPEBRAM, RECTVS. FALLOP: (a)

Origo. I. Oritur, inter *ad tollentem* ac *obliquum*
EVST. *maio rem* medius, a superiori parte foraminis,
T. 39.F.2. quod in *osse multiformi* (α), pro transeunte
neruo optico. (b)

Inseritio. II. Inferitur, largo tendine, tarso supe-
l: c. rioris palpebrae.
Actio.

III. Eleuando palpebram, aperit oculum.

§. 20.

(a) Obs. Anat. p. 61. 62. Olim nempe haec actio sequenti musculo habebatur propria; quum uero ex ORIBASIO intellexisset FALLOPIUS, in *fistula lacrumali* saepe exfoliari *os unguis*, & oculum tamen pro lubitu aperiri posse: quaesivit ergo uerum leuatorem, huncque inuenit ac descripsit.

(α) ALBIN. §. 57. 2.

(b) Quo magis recedit ab angusto suo principio: eo latescit magis V: EVST. l. c. Inter eum quoque, & *superbum* musculum multa pinguedo interponitur,

§. 20. ORBICVLARIS PALPEBRARVM.

I. Oritur, tendineus ac carneus, a margine *osfis maxillaris*, inferiorem *orbitae* partem, ad internum oculi angulum, constituentem. (a) Fibrae ejus supra inferiorem palpebram, magnamque *osfis mali* partem, sparsae; tum, externo circumdatae angulo, supra superiorem palpebram, superioremque *orbitae* partem continuantur. Origo. COVVP. F. 1. B. B.

II. Ad internum angulum firmiter adhaeret parti *osfis frontis* (β), superiorique *osfis maxillaris* processui. (c) Insertio.

III. Deducendo superiorem palpebram, inferioremque eleuando, claudit oculum. (d) Actio.

Ciliaris RIOLAN. est tantum musculi huius pars, *ciliis* siue, *tarsis* proxima. (e).

In cane oritur tendineus, a parte superiore *osfis iugalis* ad externum oculi angulum. Fibrae eius carnea, diuisae, ac utramque cingentes palpebram, quoties contrahuntur, palpebras necessario adtollent, adducent, oculumque claudent.

§. 21. Saepius notaui paruum fasciculum EVST, C 3 car. T. 41. F. I.

(a) ALBIN. §. 82.

(b) ALBIN. §. 83.

(c) Vt & ligamento. VVINSL.

(d) Inferiorem palpebram non eleuat, nisi ualidisime agens: est enim superiore longe minus mobilis. Quia uero ad internum angulum exoritur, illum uersus mouebit externum: hinc in illo semper uidentur *læmae*; ut & *lærumae*.

(e) Est scilicet *orbicularis* pars crassior, supra inferioris palpebrae *tarsum* admodum conspicua, dispersaque, commissuram oculorum arte claudens: nam inferitur *tarsis*, non corrugandis. Descripsit eum uero RIOLAN. p. 308

carneum, qui, ab *orbiculare* (§. 20.) procedens, descendebat. una cum *zygomatico*.

CAPVT VI.

MVSCVLI OCVLI.

Quemvis oculum sex mouent muscoli.
§. 22. OBLIQVVS SVPERIOR.

Origo.
EVST.
T. 39. F.
2. 3. 4.

I. Oritur, inter *elevatorum* ac *adductorem*, tendineus, a margine foraminis, transmittentis *neruum uisorium*; inde procedit recta, iuxta *osis plani* longitudinem, ad superiorem *orbitae* partem, transitque per *trochleam*, quae *ossi frontis*, ad internum *angulum*, adfixa; tandem, retrolatus.

Insertio.
EVST.
l. c.
Actio.

II. Inferitur, tendineus, *tunicæ scleroticae*, sub *insertione adtollentis*.

III. (1) Globum oculi antrorsum protrudit: (2) pupillam eius deorsum ducit.

§. 23. OBLIQVVS INFERIOR.

Origo.
EVST.
T. 39. F. 5.

I. Oritur, tendineus, ab *osse maxillari*, ubi *orbitae* marginem constituit, prope coalitum suum cum *osse mali*. Inde decurrit oblique, extrorsum; &

Insertio.
EVST.
l. c.
Actio.

II. Inferitur *scleroticae*, inter *insertionem abductoris* ac *neruum opticum* medius.

III. (1) Bulbum oculi antrorsum protrudit: & (2) pupillam eius sursum ducit.

§. 24. Vfus horum (§. 22. III. 23. III.) primus detexit ingeniosus accuratissimusque Anatomicus COVPER *myotom. reform.* p. 50. (a)

§. 25.

(a) Addatur praecipue VVINLOVV, in *Actis Peris. A. P. C. N.* CIO IO CCXXI.

§. 25. ELEVATOR.

I. Oritur, tendineus ac carneus, a margine *foraminis laceri*, prope *abductorem*.

II. Inferitur, tendine tenui, superiori ac anteriori parti *tunicae scleroticae*.

III. Eleuat globum oculi.

§. 26. DEPRESSOR.

I. Oritur, tendineus carneusque, ab inferiori margine *foraminis*, quod pro *neruo uisorio*.

II. Inferitur, tendine tenui, parti *scleroticae*, insertioni prioris (§. 25. II.) oppositae.

III. Bulbum oculi deprimit.

§. 27. ADDUCTOR.

I. Oritur, inter *obliquum* (§. 22.) atque *humilem* (§. 26.), tendineus & carneus, a margine *foraminis*, per quod in *osse multifor- mi* transit *neruus uisorius*.

II. Inferitur, tendine tenui, *tunicae scleroticae*, qua *internum angulum* respicit.

III. Adducit oculum, nasum uersus.

§. 28. ABDUCTOR. (b)

I. Oritur, tendineus ac carneus: a *foramine lacero*, extra *orbitam*.

II. Inferitur, tendine tenui, *scleroticae*, qua *externum angulum* respicit.

III. Oculum extrorsum mouet, ab interno angulo ad externum.

§. 29. *Praeter expósitos* (22-28.), adhuc duo canes adfunt, quorum unus ad bulbum oculi,

C 4

li,

(b) Hi recti omnes (§. 25-28.) proprie oriuntur a membrana, quae, neruum opticum inuestiens, durae matris est propago: uti ubique delineauit EVSTA.

Origo.

EVST.

T. 39. F.

2. 3.

Insertio.

Actio.

Origo.

Insertio.

EVST.

T. 39. F.

5.

Actio.

Origo.

EVST.

T. 39.

F. 2. 5.

Insertio.

EVST.

l: c:

Actio.

Origo.

Insertio.

EVST.

l: c:

Actio.

li, alter autem ad trochleam eius pertinet. Qui prior est

MVSCVLVS SEPTIMVS OCVLI SVSPENSORIVS, (c) oriundus a margine foraminis, per quod neruus uisorius oculum intrat, inseriturque, diuisus in quatuor, uel quinque, portiones carneas, in scleroticae partem inferiorem, infra insertiones ceterorum musculorum. Bulbum oculi, ne nimis decideret, sustinet; insuperque nervum firmat tam in canē, quam in reliquis brutis, quibus dependens caput, uel, queis de terra alimentum quaeritur. Posterior autem iam dicatur **MVSCVLVS, TROCHLEAE PROPRIVS**. Paruus hicce musculus prodit prope obliqui (§. 22. l.) ortum, moxque degenerans in tenuem tendinem, trochleae inseritur, quam & mouet. Annulum uero huncce cartilagineum describam in fine comparatae meae descriptionis de osibus. (c) Hunc falso ad hominem transtulit VESAL.: ut docuit FALLOP.

CAPVT VII.

MVSCVLI NASI.

Nasus cartilagineus habet unum singulare sibi musculorum par (a): tria autem cum aliis partibus communia.

§. 30.

(a) Adhuc alius paruus, tenuisque est musculus, qui myrtiformis, uel semilunaris EVSTAC., qui, paullo supra superius labium, ab osse maxillari ortus, incuruus fertur ad alam nasi. EVST. T. XLI. F. III. Fere totus subiacet eleuatori labii superioris proprio, EVST. l.c. F. I.

§. 30. RINAEVS, *sive*, NASALIS. (b)
XXX.

I. Oritur, carneus, ab extremitate *osfis nasi*; *Origo*, ac uicina parte *osfis maxillaris*.

II. Inferitur *alae* cartilaginibus omnibus. *Insertio*,

III. *Alam* extrorsum ducendo, nasum a- *Actio*. perit, atque dilatat.

§. 31. Communium primum est elongatio *occipito-frontalis* (§. 18. II.), cutem nasi fursum retroque ducens.

Secundum ad *elevatorem labii superioris* EVST. proprium pertinet, quod a superiore *osfis maxillaris* parte oritur, ubi *osfi frontis* iungitur, ad internum *angulum*. T. 41. F. 1.

Tertium, quod pars *depresoris labii superioris proprii*, & ad superius labrum pertinet. COVVP. F. 3. D.

(c)

Planum canis nasum, usque ad *maxillae superioris finem productum*, nullus *singularis mouet musculus*,

b) Hunc COVPP. descripsit, titulo *dilatatoris alae nasi*

(c) Hic uero est *constrictor alarum nasi* COVVP. p. 57.

CAPVT IIX.

MVSCVLI LABIORVM.

Musculi labiorum uel sunt communes, uel proprii. *Illi*, angulis oris inserti, ubi utrumque labium sibi iungitur, utrique prospiciunt; suntque eorum tria paria, unus-

que solitarius musculus.

§. 32 ZYGOMATICVS.

Origo. I. Oritur, carneus, ab *osse iugali*, fere, ubi
EVST. cum *ossis squamosi* longo processu coniungi-
T. 28. tur. (a)

35. 41. F. 1. II. Inferitur ad labiorum angulum. (a)

Inferio. III. Labia, cum suo pare, sursum ducit.
EVST.

I. c. §. 33. ELEVATOR LABIORVM
Actio. COMMVNIS. (b)

Origo. I. Oritur, tenuis ac carneus, a foramine
EVST. *ossis maxillaris*, sub sinu, qui orbiter exter-
T. 41. F. nus. (b)

1. 3. II. Inferitur angulo oris: ut & inferiori
Inferio. labio.
EVST.

I. c. III. Eleuat utrumque labium.

Actio. §. 34. DEPRESSOR LABIORVM
COMMVNIS. (c)

Origo. I. Oritur, largo carneoque principio, inter
EVST. partem *latisissimi colli*, quae, supra *maxillam*,
T. 35. & ad labiorum angulum, transit, & *depresso-*
41. F. 1. *rem labii inferioris proprium*; ab infimo *maxil-*
lae inferioris latere.

Inferio. II. Inferitur in angulum labiorum,
EVST.

I. c. III. Deprimit angulos oris. (d)

Actio.

§. 35.

(a) ALBIN. §. 29: 2.

(a) Vbi cum triangulari musculo coit ut eleganter habet
EVST. T. XLI. F. 1. Agit uero tam in *idente*, quam
in *flente*. In descensu suo obliquo saepe in duas partes
fissus adparet. V: EVST. T. XXXIX. XXXV.

(b) Alii *caninus* dicitur.

(b) ALBIN. §. 81.

(c) Alii, a figura, illum *triangularem* uocant: tum ue-
ro potius *hunatus* dicendus foret.

(d) Sicque feueritatem senilis faciei exprimit. COV-
PER.

§. 35. a. SPHINCTER LABIORVM: (e)

I. Fibrae eius carnae labia, annuli instar, *Origo.*
cingunt. *COVVP.*
F. 1. F. F.

II. Labia constringit, adducitque. *Actio.*

§. 35. b. Musculorum, uel superiori, uel inferiori labio propriorum, quatuor habentur paria, quoduis nempe labium, in quouis latere, duos habet musculos.

§. 36. ELEVATOR LABII INFERIORIS PROPRIVS COVVP. p. 63.

I. Oritur a maxilla inferiore, ad gingivas *Origo.*
dentium incisiuorum. *COVVP.*

II. Inferitur cuti menti, (f) *F. 4. F. F.*

III. Eleuat mentum & labium inferius si- *Insertio.*
mul. *Actio.*

§. 37. ELEVATOR LABII SVPERIORIS PROPRIVS.

I. Oritur, largus & carneus, a tota *Origo.*
maxillaris portione, inferiorem orbitae partem *EVST.*
formante, immediate supra foramen, nervos *T. 41.*
arteriasque, ad buccam euntes, indeque red- *F. 1.*
euntes uenas educens. (α) Coit, ab utroque latere, cum uno fasciculo, compacto, carneo: quorum breuior procedit ab *osse mali*, ad ortum *zygomatici* (§. 32. I.), longior uero a toto *EVST.*
processu superiore *ossis maxillaris*, ubi, ad in- *l. c.*
ternum oculi *angulum*, cum *osse frontis* coit, (β) descendens ad *latus ductus lacrumalis*.

II.

(e) Dicitur quoque *orbicularis oris*, uel *labiorum*. Constat fibris, admodum perplexis, non parallelis sibi, neque quoque orbicularibus. Omnium uero angustissimus est ad angulos.

(f) Notat SANTOR. c. 1. §. XXIX., illos paullo ante insertionem, se decussare: unde & labii illius corrugatores arbitratur.

(α) ALBIN. §. 79. I. (β) ALBIN. §. 83. 4.

Inferio.

II. Inferitur labio superiori; fibrillasque quasdam supra *alam narium* dispergit.

Actio.

III. Labium illud extrorsum ducit: id uero eleuat, quoties cum pari suo simul agit. (f).

§. 38. DEPRESSOR LABII INFERIORIS PROPRIVS.

Origo.

COVVP. I. Oritur, carneus, a maxillae inferioris inferiore, eademque anteriore parte, quam F. 4. G. G. *mentum* dicunt.

Inferio.

II. Inferitur labio inferiori, prope *sphincterem* (§. 35. a.)

Actio.

III. Deprimit dictum labium, ac paululum extrorsum ducit.

§. 39. DEPRESSOR LABII SUPERIORIS PROPRIVS COVVP: p. 57.

Origo.

COVVP. I. Oritur, tenuis carneusque, ab *osse maxillari*, immediate supra *dentium incisiuorum* gingiuas, usque ad primum *dentem molarem*. Hinc adscendit, *eleuatoris* parte quadam (§. 37.) tectus; donec

Inferio.

II. Inferatur (1) parti superiori labii superioris: (2) radici *alae nasi*.

Actio.

III. Quas partes deprimit.

§. 40. *Labia canis* quinque mouent musculorum paria, unusque *sphincter*:

ZYGOMATICVS *fibras supra buccinatorem* spargit; hincque, maiori ui, *labia sursum*, inque *latus* ducit.

ELE-

(f) Retrahit quoque *nasi alam*; hinc & *retractor alae nasi* dicitur COVVPER: p. 56. Adhuc unus eidem labio datus est eleuator. isque ipsi proprius, & pari carens, qui, a medio imi nasi exortus, medio superiori labio inferitur. Saepe uero abest; quem tamen depinxit EVSTA. T. XII. F. I.

ELEVATOR LABII SUPERIORIS

oritur, *carneus, ab inferiore, siue, paruo orbitae angulo; inde descendens latescit; donec, ampla insertione, inseratur labio superiori: quod eleuat; quoties illud animal dentes denudat.*

DEPRESSOR LABII INFERIORIS

oritur circa rostri, *hoc est, inferioris maxillae medium.*

Quod si, sub utroque labio, dentium incisivorum gingivas abstuleris; uidebis eleuatorem (§. 36.), depresforemque (§. 39.), ut in homine, decurrentes.

CAPUT IX.

MVSCVLI GENAE.

§. 41. **G**enae, siue, *buccae* nullus proprius est musculus: prospiciunt tamen illi mouendo duo, ipsi cum aliis partibus communes; quorum unus & labiis; alter autem & maxillae inferiori, labiis, maxumaeque cutis faciei parti, competit.

§. 42. BVCCINATOR.

I. Oritur, distincte, (1) tendineus & carneus, a maxilla inferiore, inter eius *dentem molarem ultimum, & radicem partis anticae processus coronoidis* (a) (α): (2) carneus, a maxilla superiore, inter eius ultimum *dentem maxillarem & processum pterygoidem* me-

Orig.

(a) Ibidemque adhaeret ligamento obliquo,

(α) ALBIN. §. 110: 5.

EVST.
T. 41. F.
3. ut &
T. 33.
Insertio.
Actio.

medius; (β) a cuius processus extremitate adhuc tendinea musculo origo (b.) Hasce inter origines, continuatur, ab altero latere, *pterygo-pharyngaeo*: ab altero autem, *mylo-pharyngaeo*. Hinc procedit, rectis fibris; membranaeque internae oris, intactis tamen ubique maxillarum gingivis, adhaeret.

II. Inferitur angulo labiorum.

III. (1) Genam mouet, cum labiis: (2) Labia introducendo, cavitatem oris arctat; sicque alimenta, ut eo melius comminui possint, interponit dentibus. (c).

§. 43. **QVADRATVS GENAE, uel; LATISSIMVS COLLI.** (d)

Origo.
EVST.
T. 36.
VESAL.
L. 2. T.
3. L.

I. Oritur, largus, tenuis, membranaceusque, (1) ab *osse pectoris*, inter primam & secundam costam; (2) a *summo humero*, (α) & inter hunc & os pectoris medius: (3) a membranis, *pectoraalem ac deltoideam* integrentibus. Fibras carneas intertextas sibi habet copiosissimas, quae, adscendentes, coeunt, unumque continuum, carneum corpus constituant,

Insertio.

II. Inferitur (1) illi externi *labri* spatio, quod

(β) ALBIN. §. 36. 2.

(b) Originem hanc ab illo corniculo ut nouam descripsit SANCTORI: C. l. n: XXXV.; ille enim Auctorem nostrum numquam uidit.

(c) *Parotidem glandulam* emulget: permittit enim ductum STENONIS.

(d) Est tenuissimus musculus, pinguedini tam arcte concretus, ut absque laesione, ab illa separari nequeant: hinc illum, separatum ab origine, reclinatum, pinguedinique adhaerentem, demonstrant Anatomi:

(α) ALBIN. §. 259.

quod inter labiorum commissuram, & posticam originem *depressoris* (§. 34. I.) interiacet; indeque adscendit rursus, inter dictum musciculum l: c.), & *massiterem*: (2) *buccinatori* (§. 42.), prope angulum oris: & (3) membranaceus, cuti faciei.

Vbi ambo ad mentum peruenere, se decusant inuicem: hoc est, pars musculi, in dextro latere positi, incedit supra alterum, inserta maxillae inferiori, in sinistro latere: & positi in sinistro, decurrit sub altero, in inferioris maxillae dextro latere terminatura.

III. (1) Genam, cutemque faciei deducit: *Adia*. (2) os aperiundo, iuuat *biuentrem*. (b)

In cane est pars membranae carnosae, collo & buccinatori (§. 42.) obducta.

(b) Id uero quin agat, uetat ingens musculi tenuitas. Cutem, adnatam sibi, mouere tantum uidetur, uariasque oris formare figuras. Hinc WINSLOVV illum uocat *le grimacier*.

C A P V T X.

MVSCVLI AVRICVLAE.

§. 44. **M**usculi auriculae uel proprii sunt, uel communes. Hi uel proueniunt a medio tendine *occipito-frontalis* (§. 18.), uel a *quadrato* (§. 43.), mouentque auriculam uarie, pro diuersa illorum insertione, unde in totidem diuiduntur musculos; ab actione uero sua, adpellationes suas apud Auctores sortiti sunt: ita sunt; *adtel-*
lens,

lens, siue, musculus auriculæ anterior; depressens, (a) & reliqui.

Illi oriuntur ab *osibus, petroso ac uerticis; conchæ, sub communibus, inserti.* Est uero eorum numerus incertus. (b)

Eodem officio in cane funguntur tot parui muscoli, ut superuacaneum duxerim, illos describere singulos; suffecerit adduxisse duos sequentes, omnium maxime notabiles:

RETRAHENS AD COLLVM oritur ab *unionē musculorum cucullarium, supra secundum, uel tertiam, spinam colli; finitque in partem conchæ lateralem, superioremque.*

ERIGENS oritur a *spina ossea, quæ in osse occipitis, auriculæ exteriori insertus, tribus carneis portionibus. Erigit aurem.*

(a) *Adtollens, siue, superior VALSAL:* inferitur scaphæ auriculæ carneus: incumbitque *temporali musculo.* EVST. T. XXIX. XXXIII. Hunc uidetur *Auctor* cum *anteriorē auris* confudisse, qui per transuersum ad anteriorem auriculam procedit.

(b) *Posteriores auris, in tres, pluresque diuisi partes a CASSER:, DV VERNAY & VALSAL., posticæ auriculæ induntur.* V. EVST. T. XXXI. XXXII. XXXIII. Descripsit VALSAL: adhuc alios in auricula, qui *tragi, antitragi, & transuersales:* qui autem tantum lacertosus cadaueribus adfunt.

C A P V T XI.

MVSCVLI AVRIS INTERNÆ, MEATVSQVE AUDITORII.

Sola ossicula, *malleus* atque *stapes*, mouentur in aure interna: ille a tribus musculis; hic ab uno.

45: EXTERNVS AVRIS FABRIT:,

(a) uel, CASSER (b)

I. Oritur, carneus, ab asperitate, quae in latere supremo *meatus auditorii*, circa eius medium. Origo.
FABR. F.
17. r.

II. Inferitur, longo, sed tenui, tendine, procesui superiori *mallei*, adhaerenti *membranae tympani*. Insertio.

III. Extrorsum ducit malleum, una cum *membrana tympani*. (c) Actio.

In cane procedit ab osse petroso, ubi longo mallei procesui opponitur.

§. 46. INTERNVS AVRIS EVSTACH: (d)

I. Oritur, tendineus & carneus, a principio *tubae EVSTACHIANAE* cartilagineae, & fine eiusdem *osseae*, tum fertur per longum canalem, qui in *osso petroso*; ingresusque cavitatem tympani, tendinescit, uaditque supra tuberculum, quod in fine illius canalis, prope *fene-tram oualem*. Origo.
DV-
VERN:
T. 6. F. 5.
VAL-
SAL. T.
3. F. 14.
B.

II. Inferitur in partem posteriorem manubrii *mallei*, paullulum remote ab huius capite. Insertio.

III. Malleum introrsum ducit, uersus *os petrosum*. Actio.

NB. Os, quod quidam tendini huius musculi

D

culi

(a) VALSAL: eum uocat *musculum procesus minoris mallei*.

(b) CASSER: describit p. 7. & 30. *de aures*: & depingit T. IX.: quae eadem Tabula quoque reperiunda in raro illius Tractatu de *quinque sensuum organis*.

(c) Membranam igitur tympani planam facit.

(d) p. 158. VALSAL. hunc dixit *musculum procesus maioris mallei*.

50 MVSCVLI AVRIS INTERNAE &c.

culi inesse obseruant, me iudice, est finis longi illius canalis, in quo decurrit, qui, ab *osse petroso* abruptus, tendini illi relinquitur adhaerescens.

§. 47. OBLIQVVS AVRIS, *sive*, EX-
TERNVS DVVERN: (e)

Origo.

I. Oritur, carneus, ut praecedens (§. 46. I); inde retrofertur per canalem, qui in parte superiore atque externa *tubae EYSTACHI*, nec tamen intrat cauitatem tympani.

Insertio.

II. Inferitur gracili procesui *mallei*, qui obliquo finui, omnium maxime conspicuo in osseo *foetus* annulo, innitur.

Actio.

III. Antrorsum ducit *malleum*, ad illam ossis temporis partem, unde pro parte ortus est.

Processum illum optime omnium descripsit CAECILIUS FOLIVS; (f) longitudine excedit *manubrium malleoli*; forma uero omnium optime exprimit paruam piscis spinam.

An
EVST.

T. 7. in
infima fi-
gura? Car-
neam
glandulam
dixit.

In cane musculus hic dicendus esset GLANDIFORMIS, uel OVALIS, nam & glandulosam massam oualis, uel teretis, figurae refert situs in singulari cauitate, quae in osse petroso, prope ouale foramen, a cuius fundo exoritur; gracili tendine finiens.

§. 48.

(e) p. 27.; ubi & figurae citantur. Hic VALSALVAE *musculus processus minimi mallei* audit.

(f) Recte processus illius inuentor citatur FOLIVS; non uero RAV; ille enim diu iam, ante hunc, accurate illum descripsit. V: BARTHOL. *Epist. Medicin. Cent. I. p. m. 257. seqq.* F II. V. g. F. III. b. RAV tamen re uera illum restituit, abque obliuione perpetua uendicauit.

MVSCVLI AVRIS INTER. &c. 51

§. 48. STAPIDAEVS, uel, MVSCV-
LVS STAPEDIS DVVERN: (g)

I. Oritur, carneus, a fundo canalis, *osfi Orig.*
lapideo insculpti, circa medium ueri aquaeductus
FALLOPiani, (a) lateraliter.

II. Inferitur, tendineus, lateri capitis *sta- Insertio.*
pedis.

III. Eleuat *stapedem.*

Actio.

§. 49. MVSCVLVS MEATVS AV-
DITORII. * * *

I. Oritur ab una interruptarum cartilagi- *Origo.*
num illius meatus.

II. Inferitur cartilagini alii.

Insertio.

III. Cartilagines adducit ad inuicem.

Actio.

Reperitur uero tantum in crassis, musculo-
fisq; cadaueribus.

*In cane ibi plures sunt parui muscoli, qui,
uenientes ab una exstante conchae cartilagine,
inseruntur alii: sicque, uel adpropinquando,
uel remouendo eas ab inuicem, porum acusti-
cum uel ampliant, uel contrahunt; prout con-
uenit recte recipiundo sono.*

(g) p. 30. ubi & figura citatur.

(a) ALBIN. §. 63.

C A P V T XII.

MVSCVLI OSSIS YOIDIS.

§. 50. Os yoidis, ad linguam pertinens,
quinque nactum est musculorum paria, u-
numque imparem musculum: qui tamen
omnes cum lingua atque *larynge* ipsi commu-
nes.

§. 51. MYLOYOIDAEVS FALLOP:(a)

Origo.
EVST.
T. 41. F.
5.

I. Oritur, carneus, paullulumque tendineus, ab omni interno inferioris maxillae latere, inter ultimum *dentem molarem*, atque *mentum*. (a.)

Insertio.
EVST.
l: c:
Actio.

II. Inferitur margini inferiori *baseos ossis yoidis*. (β) (b)

III. Os illud sursum, antrosum, atque in latus ducit; pro uario fibrarum decursu.

§. GENIOYOIDAEVS.

Origo.
EVST.
T. 41. F.
5. 8.

I. Oritur, tendineus, a tuberculo aspero, quod mento intrinsecus; siue, a maxillae inferioris antica parte, intrinsecus (c) (γ).

Insertio.
EVST.
l: c:
Actio.

II. Inferitur utrique *ossis yoidis* lateri, datque fasciculum carneum origini utriusque *processus yoidis*. (δ)

III. Sursum, antrosumque mouet illud os.

§. 53. STILOYOIDAEVS. (d)

EVST.
T. 41. F.
5. in dex-
tro.
Insertio.

I. Oritur, terete tendine, prope medium *processus stiliformis*. (ε)

II. Inferitur, carneus, basi *ossis yoidis*, prope eius *cornu*, cui, praeter ea, saepe adhaeret, carne quadam.

NB. Venter huius quandoque perforatus est,

(a) p. 64.

(α) ALBIN. §. 111.

(β) ALBIN. §. 337. 4.

(b) *Mentum* inter, & basim *ossis yoidis*, artissime unitur pari suo, hinc quibusdam ambo unum tantum constituunt muscolum. Glandulam submaxillarem, in usus masticationis, exprimit.

(c) Vterque sibi adcumbit; linea tamen distinctus;

(γ) ALBIN. §. 111. I.

(δ) ALBIN. §. 336. I. 4.

(d) Alii *stilo-cerato-yoidaeum* adpellant.

(ε) ALBIN. §. 19. 5.

est, in utroque latere, pro transmittendo EVST. medio tendine biuentris; quandoque in alte- T. 28. rutro; nonnumquam utrimque est integer.

III. Os yoidis paullulum in latus mouet: *Actio.* sique paris sui actio conspirauerit, id aliquantum eleuat.

§. 54. STILO-CHONDRO-YOIDAEVS * * *; siue, STILO-YOIDAEVS ALTER. (e)

I. Oritur, carneus ac tendineus, a *processu* *Origo.* *stiformi*, prope originem *stilo-pharyngaei*; EVST. inde decurrit, sub *cerato-glosso*, ac T. 41. F.

II. Inferitur adpendici cartilagineae *ossis* *Infertio.* *yoidis.* *Actio.*

III. Os hocce sursum, inque latus mouet: adfistit ergo descripto (§. 53. III.)

§. 55. CORACO-YOIDAEVS. (f) *Origo* I. Oritur latus, tendineus ac tenuis, (1) MOR- a superiore *costa scapulae*, prope eius *sinum*, GAG. siue, *cauitatem femilunarem* (a): & (2) ab *Adu: 1.* aliqua parte ligamenti, a margine illius sinus EVST. ad *processus coracoidis* radicem producti (β); T. 41. F. Veras hasce origines primus docuit COLVM- 5.

BVS L. V. C. XII. (g) Inde adscendit, D 3 obli-

(e) Saepe uero, musculi huius loco, adparet tantum *ligamentum*: idque eleganter habet EVST. T. XLI. F. V. & IIX.

(f) Adpellatur quoque *coraco-cerato-yoidaeus*: ut & *digastricus*, quia talis re uera est.

(a) ALBIN. §. 257. 4.

(β) ALBIN. §. 260.

(g) De origine eius omnino uid. MORGAG: *Aduers.* I. p. 36. edit. Belg. in 40. Semper uero ortus quaedam *uarietas*; nam & uidi, magis uersus inferiorem *omoplateae* *angulum* oriundum. Sed & ante COLVMB: ueram originem tradidit GALEN:; COLVMBVM uero recte tradidisse, nesciuit MORGAG.

oblique, tendinescitque, inter *mastoidaeum* atque *uenam iugularem internam*: post uero illico rursus fit carneus, &

Insertio.
EVST.
l: c:

II. Inferitur, tenui tendine, basi *ossis yoidis*, inter *insectionem sterno-yoidaei*, & *cornu* illius ossis.

Actio.

III. Os illud oblique deorsum ducit.

§. 56. STERNO-YOIDAEVS.

Origo.
EVST.
T. 33.
in sinistro.

I. Oritur, carneus & tenuis, (1) a cartilagine costae primae (α): (2) ab *ossis pectoris* superiore ac inferiore parte: (β) w (3) a parte inferiore *claviculae*, ubi cum illo osse cohaeret. (γ) (h)

Insertio.
EVST.
T. 41. F.
5. in dextro.

II. Inferitur, inter mediam basim *ossis yoidis* & *coraco-yoidaeum* (§. 55. II.) medius.

III. Os illud recta deprimit.

Actio.

§. 57. *Stilo-chondro-*, ac *coraco-yoidaeorum* (§. 54. 55.) loco, canis duo alii dati sunt musculi, in humano corpore haud reperiundi:

CHONDRO-CERATO-YOIDAEVS, parvus ac carneus; is, procedens ab omni appendice cartilaginea *ossis yoidis*, inferitur toti brevissimo processui, siue cornui, cohaerenti cum cartilagine *thyreoidaea laryngis*. Partes illas adducit ad inuicem.

INIO-CERATO-YOIDAEVS est uerus, brevis ac carneus musculus, oriundus ab antica processus occipitis, unde biuenter maxillae inferioris nascitur, insertusque, prope finem longissimi processus *ossis yoidis*; hocque retroagit.

STILO-

(α) ALBIN. §. 172. 1.

(β) ALBIN. §. 166. 2.

(γ) ALBIN. §. 263.

(h) In postica parte semper adesce inscriptiones tendineas notat MORGAG. in *Aduers.* I.

STILO-TOIDAEVS, *oblongus, tenuis ac carneus musculus oritur a cornu ossis yoidis, prope illius connexionem cum occipite; inde procedens, perforat biuentrem, donec in basin ossis yoidis inseratur.*

STERNO-TOIDAEO *eadem carnea est cum sterno-thyreoidaeo origo, nempe ab interiore latere cartilaginis primae costae, prope os pectoris; unde autem discedunt, ad duorum pollicum distantiam, uel maiorem, supra communem illorum originem.*

CAPVT XIII.

MVSCVLI LINGVAE.

Linguae quatuor sunt musculorum paria, qui *proprii* uocandi, quod omnes illius corpori inserti.

§. 51. GENIO-GLOSSVS.

I. Oritur, tendineus, a tubere aspero, quod in anteriore maxillae inferioris parte, circa medium mentum, intrinsecus.

II. Tum fibrae eius decurrunt tripliciter: mediae finiunt circa mediam linguam: anteriores feruntur antrorsum, illius apicem uersus: posteriores autem oblique retrorsum, radicem linguae uersus: quin & compactus fasciculus adfigitur, utrimque, cornubus ossis yoidis.

III. Linguam uarie mouet, pro uaria fibrarum suarum decursu: hoc est, antrorsum, extra os; introrsum, intra id: uel mucro-

nem linguae, deorsum, retrorsumque, agit. (a)

§. 59. CERATO-GLOSSVS.

Origo.

1. EVST. illique fasciculo uere nomen *cerato-glosso*:

T. 41. F. (2) a parte baseos illius: tumque *ba-*

5. 8. *fioglossus* audit. Huncque nonnumquam

2. EVST. magnum iudi: alias paruum: & quan-

1: c: f. 9. doque plane deficientem. (3) ab adpendice

yoidis cartilaginea; qui quorundam *chondro-*

glossus. Haec, tria, diuersa, capita uniu-

trunt in unum musculus, cui eadem fibrarum

directio.

Insertio.

II. Inferitur, uastus & tenuis, ad linguae radicem, lateraliter.

Actio.

III. Linguam oblique in unum latus mouet unus: uterque uero, illam directe retro agit in os.

§. 60. STILO-GLOSSVS.

Origo.

1. EVST. *cesfu stiliformi* osis temporum: & saepe ad-

T. 41. F. huc (2) a ligamento carneo, quod ab illo

5. & 7. processu ad inferioris maxillae angulum

2. EVST. transit.

T, cit. F. 31. II. Inferitur lateri linguae, a radice usque

Insertio. ad eius fere medium.

Actio. III. Linguam in latus mouet unus; uterque uero introrsum, sursumque.

In cane oritur a fine longi processus osis yoidis.

§. 61. LINGVALIS SPIGEL. p. 95.

Origo.

I. Oritur, fat largus ac carneus, a latere baseos linguae, indeque uadit oblongus an-

tror-

(2) Ob tot eius actiones, *polycbrestum* illum dici uult VVINSL.

trorsum, apicem uersus, inter descriptos (§. 58. 59.) medius. Vtrum uero ibi definat; an uero, eodem modo, & alterum linguae latus circumeat, inque radicem eius inferatur, difficile dici potest.

II. Linguam contrahit, atque compingit, eodemque illam tempore, retro, deorsumque mouet. *Actio.*

Primus musculus hunc descripsit. COLVMBVS L. V. C. XIII.; *lingualem* autem solus dixit SPIGELIVS.

CAPVT XIII.

MVSCVLI LARYNGIS.

Laryngem, hoc est, partem superiorem, uel principium *asperae arteriae*, quinque componunt cartilaginēs, quarum tres suos adcepere musculos.

§. 62. *Cartilago thyreoidaea*, siue, *scutiformis* tres, in quouis latere, habet musculos.

§. 63. YOTHYREOIDAEVS.

I. Oritur, carneus, (1) a parte baseos *osfis yoidis*: (2) a toto fere illius *cornu*.

Origo.
EVST.
T. 41. F.
§. in sinistro.
Insertio.
EVST.
l: c.
Actio.

II. Inferitur lateri exteriori lineae asperae, quae inter *cartilaginis scutiformis* angulos. (a)

III. *Laryngem* eleuat.

§. 64. STERNO-THYREOIDAEVS:

(b)

D 5

I. Ori-

(a) Ibique sequenti musculo saepe innexus est: ut notat MORGAG. *Adu. l. p. 3.*

(b) *Sterno-yoidaeo* (§. 56.), cui subiacet hic musculus, est letior;

Origo.
EVST.
T. 33. in
dextro.

I. Oritur, carneus, ab omni interiori latere primi ossis *sterni*, inter primae ac secundae costae cartilaginee, a quibus ipsi duae parvae origines.

Inferio.
EVST.
T. 41. F.
5. in finis-
tro.

II. Inferitur, tendineus carneusque, superficiei lineae asperae (§. 63. II.)

Saepe fasciculum remittit ad cornu, uel processum ossis yoidis.

Actio.

III. Deprimit laryngem: (c)

In cane ortus huius musculi cum origine sterno-yoidaei, (§. 57.) confunditur.

§. 65. CRICO-THYREOIDEAEVS. (d)

Origo.
EVST.
T. 41. F.
8. II.

I. Oritur, carneus, ab anteriori parte cartilaginis *cricoidis*.

II. Inferitur parti lunatae ac inferiori *thyreoideae*.

Inferio.
EVST.
l. c:
Actio.

III. Cartilaginem *scutiformem* extrorsum, inque unum latus ducendo, cauum laryngis auget.

§. 66. Quaevis cartilago *arytaenoides* tres habet proprios musculos; utraque uero duos sequentes communes.

§. 67. ARYTAENOIDEAEVS MAIOR.

Origo.
EVST.
T. 42. F.
F. 2.

I. Oritur, carneus, ab una cartilagine *ary-*

latior; ut expresse EVST. T. XLI. F. V. in dextro latere. Quin & oritur a *clavicula*; ut habet EVST. T. XXXIII.

(c) Eodemque tempore, subiectam glandulam *thyreoideam* exprimit.

(d) Subiacet *portioni*, a glandula *thyreoidea* ad os yoidis protensa, haec si adfuerit: nam & adest semper in sinistro latere: ut habet EVST. T. XLI. F. V. & IIX; quandoque uero in dextro latere: rarissime uero in utroque. Hanc ignorasse uidetur Auctor. V. MORGAG: *Adu.* l. p. m. 33.

rytaenoides, prope illius articulationem cum *cricoides*: inde decurrit per transuersum, recta, eadem semper seruata latitudine.

II. Inferitur eidem toti lateri alterius cartilaginis. *Infertio.*

III. *Rimulam*, siue *glottidem* claudit; illas *Actio.* adducendo cartilagines.

§. 68. ARYTAENOIDAEVS MINOR.

* * *

I. Verus hicce, sed paruus, musculus, *Origo.* supra praecedentem (§. 67.) incedens, ori- *EVST.* tur a parte unius *cartilaginis arytaenoidaeae*, *T. 42. F.* proxima *cricoidi*. in uno latere. *1. 2.*

II. Inferitur illi alterius *arytaenoidaeae* parti, quae a *cricoides*, in altero latere, remotissima. *Infertio.* *EVST.* *1. c:*

III. Iuuat praecedentem (§. 67. III.); indeque longe fortior actio, ob fibras, sese manifeste decussantes. *Actio.*

§. 69. CRICO-ARYTENOIDAEVS POSTICVS.

I. Oritur, carneus, a parte posteriore cartilaginis *cricoidis*. *Origo.* *EVST.* *T. 42. F.*

II. Inferitur cartilagini *guttali*, prope sequentem. *1. 2.* *Infertio.* *EVST.*

III. Aperit *rimulam*. *1. c:*

§. 70. CRICO-ARYTAENOIDAEVS LATERALIS.

I. Oritur, carneus, a latere *cartilaginis cricoidis*. *Origo.* *EVST.*

II. Inferitur cartilagini *arytaenoidi*, sub *T. 42. F.* insertione superioris fibrarum seriei sequentis *1.* musculi. *Infertio.*

III. Aperit *glottidem*. *Actio.*

§. 71. THYREO-ARYTAENOI-
DAEVS.

Origo.
EVST.
l. c.
Insertio.

I. Oritur a tota longitudine partis internae concavae ac mediae *cartilaginis scutiformis*.

Actio.

II. Inde nascuntur tres diuersae fibrarum series: quarum summa inserta guttali, prope insertionem *crico-arytaenoidi* (§. 70. II.); media, *thyreo-glottis* adpellanda, adscendit sub suprema, dispersa, obseruante COVPER, supra membranam, natam inter *glottidem* atque *cartilaginem arytaenoidem*: ima autem inseritur angulo *arytaenoidis* anteriori.

III. Series prima ac tertia *cartilaginem*, cui infixae, adducunt ad *scutiformem*: sicque aequabilissime claudunt *glottidem*; secunda uero, in utroque latere agens, concurrere potest ad deprimendam *epiglottidem*; in uno autem latere contracta, ad mouendam in latus. (d)

§. 72. *Epiglottis*, quae quinta laryngis *cartilago*, in cane unum musculorum par habet, quod YOGLOTTVM adpello. Oritur, carneus, ab *appendice cartilaginea* osis yoidis *intrinsecus*, partimque adhuc ab eius basi; prope originem *basio-glossi* (§. 59. I. 2.); inde uterque sibi adpropinquat, uia obliqua latus, donec in unum tendinem coeant, insertum medio superioris partis *epiglottidis*, prope huius mucronem. Hic depressam, inter deglutiendum, *epiglottidem* eleuat.

(e) VVINSLOVV putat, illum musculus uentri-
culos laryngis-complanare.

CAPVT XV.

MVSCVLI PHARYNGIS. (a)

§. 73. Quamuis statuum, superiorem *stomachi* partem, siue, *pharyngem*, confici tantum ab uno musculorum pari; uno musculo in quouis latere posito, quem PHARYNGAEVM adpello, cuius fibrae carnae uarie, a uariis originibus decurrant, donec supra partem posteriorem glandulosae membranae *faucium* uniantur: uerumtamen, iam sequar adcuratum VALSALVAM, singulatim describendo singulas quasque fibrarum series, easdemque nominando a locis, unde natae.

§. 74. I. CEPHALO-PHARYNGAEVS; oritur, parum remote a magno occipitis foramine, a *tuberculo*, quod in processu *osfis occipitis*, coeunte cum osse *multiformi*.

II. CHONDRO-PHARINGAEVS
* * *; oritur ab adpendice cartilaginea *osfis yoidis*. (b)

III. CRICO-PHARYNGAEVS VAL- EVST.
SAL;; p. 51.; oritur a *cartilagine cricoide*. T. 42. F.

III. GLOSSO-PHARYNGAEVS 4. in sinistro.
VALSAL.; p. 49. oritur a linguae radice, siue, EVST. 1:
superiore parte linguae, a latere. c: utrimque.
V. que.

(a) Hisce adiecit VVINSLS: *genio-pharingaeum*, a *genis-glossis* (§. 58.) oriundum.

(b) Hos VALSALVA, sub lato *yo-pharingaei* nomine, includit.

EVST.
l. c. in
dextro in-
tegre:
ut & in
T. 41. F.
11.

V. YO-PHARYNGAEVS VALSAL: p. 49. oritur a cornu ossis yoidis; quare illum *yocerato-pharyngaeum* adpello.

VI. MYLO-PHARYNGAEVS * * *;
oritur a maxilla inferiore; prope *dentem maxillarem* ultimum.

COVVP.
F. 6. BB.

VII. PTERIGO-PHARYNGAEVS
COVVP:; oritur, tendineus ac carneus, a *processu pterygoide ossis multiformis*.

IIIX. SALPINGO-PHARYNGAEVS
* * * oritur ab extremitate partis osseae *tubae EVSTACHIANAE*, quam uulgo *aquae ductum* adpellant.

In cane secedit aliquantum, in quadam ab membrana faucium distantia, aliter, quam homine.

IX. SYNDESMO-PHARYNGAEVS
* * *; oritur a ligamento, nectente *os yoidis* ad *processum cartilaginis scutiformis*.

EVST.
T. 41. F.
8. T. 42.
F. 4. 6.

X. STILO-PHARYNGAEVS: oritur, carneus, ad radicem *processus stiliformis*.

In cane prodit a longo cornu ossis yoidis, prope eius extremitatem.

EVST.
T. 41. F.
8 & T.
42. F. 4. in
sinistro
Origo.
Insertio.

XI THYREO-PHARYNGAEVS
VALSAL: p. 50. (c) ultima haec fibrarum series oritur a linea aspera, inter duos cartilaginis *thyreoidaeae* angulos producta, ut & aliquantum ab illius cartilaginis superiori latere.

Tot iam *musculo pharyngaeo* sunt origines: inferiturque *membranae faucium*, ubi occurrit ab altero latere uenienti pari suo. Fibrae a *larynge, osse yoidis* ac *lingua* uenientes, con-

tra-

(c) Hosce cum *crico-pharyngaeis* pro uno musculo depinxit ubique EVSTACH:; esset ergo *thyreo-crico-pharyngaeus* EVSTACHI dicendus.

Actio.

trahunt *pharyngis* cœvum, alimenta que in stomachum propellunt: ceterae autem illud ab omni parte ampliant, ut hisce recipiendis locus fiat.

C A P V T XVI.

MVSCVLI VVVLAÆ. (a)

Gargareonti, uel *uuulae*, quatuor musculorum paria adplicantur.

§. 75. GLOSSO-STAPHILINVS VALSAL: p. 45.

I. Oritur, carneus, a latere linguae. *Origo.*

II. Inferitur *uuulae*, a latere, prope, eius *Insertio.* medium.

III. *Vuulam* in latus mouet unus; uterque *Actio.* uero illam adducit ad linguam.

Hosce musculos, iam ante VALSALVAM, accurate descripsit DIONIS, Chirurgus Gallus in ANATOME CORPORIS HVMANI: memorat enim duos arcus, à lateribus *uuulae* ad linguam procedentes.

§. 76. PALATO-STAPHILINVS

* * * (b)

I. Oritur, carneus, a medio *osfis palati*, *Origo.* ubi coniungitur cum osse cognomine alterius lateris. Inde uadit recta, antrorsum.

II.

(a) Hos Galli les muscles de LITRE adpellant.

(b) Hic tantum est solitarius musculus, sine pari, contra, quam describit, hodie praecipue notus titulo *μζγογον* MORGAGNI. Vt adpareat; palatum mobile discindendum est.

Infertio.

II. Inferitur extremitati duplicatae glandulosaë membranæ, quæ *gargareon*.

Actio.

III. *Vuulam* antrorsum agit deorsumque. Haec actio semper adscripta *pterigo-staphilino interno*, donec VALSALVA illum errorem correxerit, demonstrans, illum musculum ad auris tubam pertinere, ut adparebit infra.

Musculum hunc iam cognouisse uidetur DIONIS l: c, (§. 75.), *uuulam* enim formari contendit per unionem duorum, rotundorum, musculorum, a *septo nasi* oriundorum. Id autem mihi tum nondum innotuerat, quum hunc musculum describerem: alias enim nec nomen illud, nec asteriscos addidissem: solaque uera eius descriptione, errores eius correxissem.

§. 77. SALPINGO-STAPHILINVS VALSAL: p. 45.; *uulgo* PTERI-STAPHILINVS EXTERNVS.

Musculus hic sat crassus, atque teres,

Origo.

I. Oritur, carneus, a parte ossea tubae auris. Originem hanc iam diu ante, quam VALSALVA musculum hunc illo nomine donaret, memorauit VESLING. in SYNTAGMAT. ANATOM. C. XI. p. m. 175.

Infertio.

II. Inferitur basi *uuulae*; ibique coit cum pari suo, ab altero latere ueniente.

EVST.

T. 42. F.

6. C.

Actio.

III. *Vuulam* fursum, retrorsumque, ducit.

§. 78. THYREO-STAPHILINVS.

* * *

EVST.

T. 42. F.

6: utrim-

que, ad

I. Oritur, carneus, a margine superioris partis *cartilaginis thyreoidis*, inter *thyreo-pharyngaeum* (§. 74. XI.) & *membranam faucium*

me-

medius. Inde adscendit recta; quoque magis ^{cum-} ^{bens} ^{stilo-} ^{pharyn-} ^{gago} ^{(S. 74:} ^{X.)} ^{Inferio.} ^{ad-} ^{scendit} ad uulnam, eo magis largescit, super cuius superius latus dispergitur largus.

II. Difficulus dicitur, uel membrana, te- gente uulnam, remota, an cum pari suo coeat, an autem gargareontem cingat, tumque de- scendat ad cartilaginis scutiformis superiorem partem, in altero latere.

III. Vterque agens, durante deglutitione, ^{ad-} ^{scendit} foramina narium, maxumam partem, claudit, ne quid adsumtorum per nasum transire possit.

S. 79. In cane, inter tonsillas, sita sunt duo corpora spongiosa, papillarum instar, paul- lulum remota ab invicem; suntque membrana glandulosa, os inuestiens; producta uel compli- cata, conformis eidem in homine. Quacis ta- lis papilla duobus gaudet musculis: quorum alter, cui eadem origo, eademque insertio, ut glos- so-staphilino (S. 75.), eam deprimit: alter autem, longus, tenuisque musculus, qui oritur, procedit ac inseritur, ut palato-staphilinus (S. 76.), illam adtollit inde intra nasum.

C A P V T XVII.

MVSCVLI TVBAE EVSTACHIANAE.

S. 80. **C**analis, per quem os cum tympa- no auris communicat, aquae ductus FALLOPI uulgo dictus, ab adcu- rato Anatomico, VALSALVA, a figura tuba dicitur, & a primo eius inuentore, EVSTA- CHIO;

CHIO, *Eustachiana*. (a). Etenim, pro illa dilatanda atque aperiunda, nouum describit musculum VALSALVA; nam & primus docuit, musculum *pterygo-staphilinum internum*; siue, *sphaeno-pterygo-palatinum*, non ad *uulam* pertinere, sed ad dictam tubam.

§. 81. MVSCVLVS TVBAE NOVAE VALSAL: p. 43. 44. *siue*, PALATO-SALPINGAEVS ***.

Origo.
EVST.
T. 41. F.
13. prope
*pterygoi-
daeum in-
ternum.*
Insertio.

Saluis aliorum sententiis, musculum huncce in duos, distinctos, recte diuidendum crediderim: (b) quorum Prior

I. procedit, tendine lato, a margine totius lunatae partis *ossis palati* (α): &

II. Inferitur toti membranofae, musculo-fae ac cartilagineae parti tubae auris.

Actio.

III. Quam dilatat, apertamque tenet: prout primo ingeniose id invenit VALSALVA. (c)

Origo.

Posterior uero, longe breuior,
I. Oriri uidetur ab *apice* tubae illius osseae.

Insertio.
EVST.
T. 42. F.
4. & 6.

II. Inde adscendit, priori firmissime adcre-tus, donec ad procesum, hamulo similem, qui in interiore *ala processus pterigoidis* (β), peruenerit: ibi enim tendo paruus eius prio-rem deserit, latescit, magisque fit gracilis, atque illico dispergitur supra *membranam fau-
cium*,

(a) Hunc errorem errauerunt maximi quique: DV-VERNAY; COVPER; DOUGL. & alii, non sine dedecore.

(α) ALBIN. §. 86.

(b) Vnum tantum musculum esse, tenent omnes fere Anatomici.

(c) Nasique interna foramina dilatare, dicit VALSAL. ib.

(β) ALBIN. §. 37. 4.

tum, ad uuulae latera, supra narium foramina.

III. Vbi cum pari suo simul agit, actioni *Atia*
thyreo-staphilini (§. 78. III.) contraria efficit.

§. 82. Diu ante, quam egregius VALSALVAE tractatus in manus meas incideret, demonstravi musculum, sequenti canino aliquantum conformem, quem, ab origine, progressu, ac insertione sua adpello.

TYMPANO-PETROSO-SALPINGO-PTERIGO-PALATINVM.

Hic oritur, loco, ouali musculo (§. 47.) opposito, ab osse petroso, in cavitatem tympani: inde exiens; ad latus ductus a palato ad aurem, (cuius membranosa carneaeque parti firmiter adhaeret), fit carneus; talisque pergit, donec ad asperum processum ossis cuneiformis, alae similem, tendinescat, supra quem reflexus tendo fibras dispergit supra membranam, uestientem foramina narium; ubi & coalescere videtur cum coniuge suo, ab altero latere procedente.

Eleuando illam membranam, glandulas palatinas, quarum tot ingentes acervi supra illam adparent, comprimit. Eoque ipso multum augetur salivae secretio, quae tanti certe usus, masticationis tempore, pro molliendis duris ossibus, uel aliis eiusmodi, quae communiter deuorat illud animat, ut eo facilius in uentriculo dissolui queant. Quin & (2) dilatare potest. *tubam EVSTACHIANAM.*

CAPVT XIIIX.

MVSCVLI CAPITIS, IN PARTE
ANTICA, VT ET LATERALI
COLLI, SITI.

Caput a quouis latere duodecim habet musculos: quorum quinque adparent in nominato situ corporis: ceteri uero, cadauere prono.

§. 84. MASTOIDAEVS.

Origo.

1. EVST.

T. 32. in

sinistro.

2. EVST.

l. c. u-

trimque.

Insertio.

2. EVST.

T. 31.

I. Oritur, (1) tendineus, ac quandoque paullulum carneus, a parte superiore *osfis pectoris*: (2) carneus, a dimidia *clauicula*, ubi illi osfi contigua. (a)

II. Inferitur, (1) forti crassoque tendine, apici, siue parti anteriori *processus mastoidei* (a): (2) expansione ampla, tendinea, oblique decurrente sursum retrorsumque, reliquo illi processui, ut & uicino *osfi petroso extrinsecus*, prope *futuram*, A Graecorum *referentem*.

Actio.

III. Vnus, caput in oppositum latus agit: uterque uero simul agens, caput flectit antrosum.

In cane ipsi est origo acuta, tendineo-carnea, ab osfis pectoris superiore parte, unde ascendens ab it in crassum uentrem, cum pari suo, in dimidia asperae arteriae altitudine, confluentem: post recedunt ab inuicem; quouis, oblique decursu, ad insertionem suam properante, quae

(a) In cadaueribus quibusdam origines; haec duae ab inuicem separari possunt, usque ad dimidium fere musculi: ut ubique expressit EVSTA. in Tabb. suis.

(*) ALBIN. §. 29. 4.

duplex; altera, tendine terete, in marginem cauitatis, quae post meatum auditorium osseum: altera autem, tenui ac membranaceo, in partem lateralem ossis occipitis.

§. 85. RECTVS INTERNVS MAIOR.

I. Oritur, tot geminatis tendinibus, ab apicibus anterioribus processus transversorum uertebrae colli; tertiae, quartae, quintae ac sextae (a). Inde autem mox fit car-
neus. (b).

Origo.
EVST.
T. 41. F.
13. in sinistro.

II. Inferitur processui anteriori ossis occipitis, prope eius coniunctionem cum osse multiformi. (c).

Inferio.

III. Caput flectit antrorsum.

Actio.

In cane oritur tendineo-carneus a parte anteriore, ac interiore processus transversorum omnium colli, primo excepto, ad cuius partem intrinsecam, inter ascendendum ad caput, reflectitur, donec inferatur fossulae, quae in osse occipitis.

§. 86. RECTVS INTERNVS MINOR COVPE.

Origo.
EVST.
T. 41. F.
8. 13.
COVVP.

I. Oritur, carneus, a parte anteriore corporis primae uertebrae colli. (a).

F. 3. 1.

II. Inferitur, prope radicem tuberis occipitis (c), sub praecedenti (§. 85.)

Inferio.
EVST.
l: c:

III. Caput inclinât antrorsum.

Actio.

§. 87. RECTVS LATERALIS FALLOP.

Origo.
EVST.
T. 41. F.
8. 13.

I. Oritur carneus, a processu transverso

E 3

pri-

(a) ALBIN. §. 138.

(c) ALBIN. §. 22: 4.

(b) Incumbit musculo longo colli.

(a) ALBIN. §. 125. 6. extrinsecus.

(c) Idem §. 23.

70 MVSCVLI CAPITIS, &c.

primae uertebrae ceruicis. (γ) (c).

Inferio.

EVST.

l. c.

Actio.

II. Inferitur, cum ossi occipitis, tum temporis, prope processum mammillarem. (δ) (d)

III Caput inclinatur, uel flectitur paululum in unum latus.

§. 38. MVSCVLVS, CAPVT CONCUTIENS.

Origo.

I. Oritur, carneus, a processibus obliquis colli uertebrae, secundae ac tertiae (ε); inde adscendit oblique retrorsum. (f)

Inferio.

II. Inferitur prope radicem processus transuersi primae uertebrae.

Actio.

III. Caput concutit. Prima enim uertebra, ope huius musculi, mota in unum latus, motum illum necessario sequetur caput, uertebrae illi per articulationem connexum.

In cane adhuc longe clarius adparet. In eo enim oritur (1) duobus carneis capitibus, ab antica processuum obliquorum uertebrae colli secundae: Et tertio, a uertebra tertia: post ex illis originibus conuergentibus unus oblique adscendit musculus, transuerso uertebrae primae processui, inter leuatorem scapulae maiorem, Et obliquum inferiorem infixus.

(γ) ALBIN. §. 138. 6.

(c) Nonnihil supra foramen uasorum uertebraliū; prout eleganter habet EVST. T. XLI. F. XIII.

(δ) ALBIN. §. 21. 7.

(d) Margini foraminis, uenas iugulares internas permittentis. Et in EVST. figuris citatis id adparet quam optime.

(ε) Aliis inter transuersariorum musculorum primus habetur.

(e) ALBIN. §. 128.

(f) Cohæret aliquando cum leuatore scapulae.

C A P V T XIX.

MVSCVLI COLLI, IN ANTICA EIVS
PARTE COLLOCATI.

§. 89. **C**ollum, a quouis latere, sex adce-
pit musculos in communes &
propriis distinguendos. Illi tantum inseruiunt
colli uertebriis mouendis: suntque interspina-
les, intertransuersales, & interuertebrales: hi
autem tam caput, quam collum mouent. Il-
lorum tamen omnium non, nisi unum par,
conspici potest in hoc cadaueris situ.

§. 90. LONGVS.

I. Oritur, tendineo-carneus, a corporibus *Origo.*
uertebRARUM quatuor, uel quinque, superio-
rum *dorsi*, a latere. (a)

II. Inseritur parti anteriori quatuor imarum *Insertio.*
uertebRARUM colli, tot paruis tendinibus, su- *EVST.*
pra eas carne tectis: tum uertebrae tertiae, *41. F. 13.*
tendine paruo: secundae longo, largoque; *in dextro.*
primae, magisterete angustiore, ac utrimque
carneo (a): ut & quibusdam processibus trans-
uersis colli prope eorum radices, totidem
paruis tendinibus.

III. Collum in unum latus flectit unus: *Actio.*
uterque autem id directe antrorsum agit.

*In cane uidetur quasi in tot distinctos, ope li-
nearum tendinearum diuisus musculos, quot ipsi
sunt uertebrae colli.*

E 4

§ 91.

(a) ALBIN. §. 122.

(a) Duplex fibRARUM est decursus: nam & duplex in-
sertio; id quod accuratissime habet EVST: l. c.; ubi
unus, idemque musculus, in duos quasi diuisus, adpa-
ret. A latere succumbit recto interno (§. 85.), quod ui-
deri potest in sinistro eiusdem figurae latere.

72 MUSCVLI MAXILLAE INFERIOR.

§. 91. *Scaleni ad thoracem sunt referendi.*

C A P V T XX.

MUSCVLI MAXILLAE INFERIORIS.

§. 92. **M**axilla inferior mouetur a quinque propriorum musculorum paribus, unoque, ipsi cum gena, aliisque, communi: nempe *quadrato genae*, qui πλατосμα μυωιδες GALENO; iam descripto (§. 43.)

§. 93. TEMPORALIS.

Origo.
EVST.
T. 33.

I. Oritur, principiis carneis, (1) ab anteriore ac inferiore parte ossis uerticis; a latere: (2) a tota parte *squamosa* ossis temporum: (3) a tuberculo, quod in parte laterali ossis frontis: & a processus eiusdem exteriori parte: (4) a parte ossis mali, quae intrinsecus, cum illo processu coit: & (5) a superiore parte processus lateralis ossis *multiformis*. (α) Musculum huncce inuoluit membrana tendinea singularis, quae, ab illis ossibus enata, superiori ac semicirculari muscoli huius parti natales suos dat, supraque illam procedens, angustatur, tandemque toti ossi iugali, ut & adnexae parti ossis frontis inseritur. Musculum hunc, ubi ea agit, deprimit: sicque ipsi robur addit. Illa uero remota, occurrunt perpaucae, tenues ac carnae fibrae, largo, medioque huius muscoli tendini, praecise, ubi

MVSCVLI MAXILLAE INFER: 73

ubi sub osse iugali decurrit, (9) insertae. EVST.
Tendinis huius latus internum, quod ex plu- T. 41. F.
ribus minoribus, arte unis, compositum 4.
adparet, uestitur quasi longe pluribus carneis
fibris, ne a duritie uel asperitate subiectorum
ossum offendi possit. Post descendit, tendi-
neus ac carneus, ad bina latera sulci, qui in
antica *processus coronoidis*.

II. Inferitur (1), tendineus, illius *processus* Infertio.
superiori parti, illum, uaginae instar, inclu-
dens, ab antica eius parte usque ad ultimum
fere *dentem molarem*: (2) *processus* dicti par-
ti posticae, usque ad eius collum. (3)

III. Maxillam inferiorem eleuat. Actio.

Plures obseruationes de huius musculi fa-
brica, una cum aliis, communicabo alias.

In cane est ualde crassus ac ualens: quae ta-
men eius magnitudo a crassitie originis praeci-
pue dependet. Oritur carneus a tubere occipitis,
ab eminentia, uel spina, quae inter bina ossa
uerticis, & aliquantum ab osse frontis, ad-
haerescens ligamento cartilagineo, quod superio-
rem orbitae partem, ubi os dehiscit, defendit.

§. 94.

MASSITER.

I. Oritur, tribus capitibus, carneis ac ten- Orig.
dineis, in diuersa abeuntibus. EVST.

Primum procedit ab osse maxillari, ubi T. 28. 32.
ossi mali iungitur (α), & ab omni margine 41. F. 1. 3.
ultimo memorati ossis, qui malam genae
constituit. (β)

Secundum uenit ab ossis mali processu, ut

E 5

(β) ALBIN. §. 93. 11. 12.

(γ) ALBIN. §. 110. 5.

(α) ALBIN. §. 79. 3.

(δ) ALBIN. §. 93. 6. 7.

74 MVSCVLI MAXILLAE INFER:

& anteriore parte *processus ossis squamosi*. (γ)

Fibrae horum capitum sese decussant. (α)

Tertium descendit ab omni interno *ossis iugalis* margine, facillime a prioribus separandum.

Inferio.
EVST.
l: c:

II. Priora duo capita inseruntur parti inferiori externaque maxillae inferioris, ab angulo eius usque ad eius fere medium: Tertium finit, tendineo-carneum, in omne exterius latus *processus coronoidis*, ut & maxillae inferioris ceruicem.

Alia.

III. Maxillam eleuat: eamdemque, ope descriptae decussationis, retrorsum antrorsumque mouet, ut eo melior fiat masticatio, alimentorumque contritio. (b)

In cane nascitur a maxuma parte ossis iugalis; & forte tendine, a tubere, quod in superiore maxilla, paullulum supra dentem molarem penultimum. Et inseritur processui aspero, qui in angulo inferioris maxillae, infra condylum eius.

§. 95. DIGASTRICVS.

Origo.

EVST.

T. 32.

35.

I. Oritur, tendineo-carneus, a lateribus ingentis *fulci*, exsculpti ad radicem *processus mammillaris*, intrinsecus. (c) (α). Tendo huius medius pertransit nonnumquam *stilo-yoidaeum* (§. 53. NB.); semper autem liga-

(γ) ALBIN. §. 29. 1.

(α) Fibrae exteriores oblique retrorsum feruntur: uti ubique habet EVST.: inferiores autem oblique antrorsum.

(b) Ab hoc pendet enormis illa uis, quam, inter mordendum, exercent uoracissima animalia quaeque: qui & gibbum illorum dependens os efficit.

(α) ALBIN. §. 29. 4.

(c) Errat VESAL: igitur, dum a *processu stiliiformi* scribit

MVSCVLI MAXILLAE INFER: 75

mentum, ab *osfe yoidis* procedens, (d) cui osfi, praeter ea, fibris tendineis adligatus est.

II. Inferitur, tendineus & carneus, margini inferioris maxillae, prope eius *commis-* Insertio.
EVST.
l: c:
suram, supra *mylo-yoidaeum* (§. 51. I.) (e).

III. Vterque, maxillam inferiorem deorsum Actio.
ducit, adiutus *latisimo colli* (§. 43. III.) (f); unus autem illam mouet extrorsum, in unum
latus.

In cane tantum unus ipsi uenter. Est nempe totus crassus largusque, oriundus carneus, fibris tendineis interspersis, ab processu acuto osseo, inter processum mammillarem & occipitis tuber medio; insertus amplius circa maxillae medium.

§. 96. PTERIGOIDAEVS INTERNVS. (g)

I. Oritur (1) tendineus ac carneus, ab inferiore ac superiore parte alae maxumae Origo.
EVST.
T. 41. F.
13. in
dextro.
processus *aliformis* (α), omne medium spatium inter binas alas tenens: (2) ab parte *osis palati*, illis *alis* interposita. (β)

II.

(d) Inde determinatur eius actio: alias enim tantum capita illius maxillae ualide in sinus illos egisset. Elegancia habet COVVP.

(e) Notat VVINSLS., prope insertionem suam, illos nonnumquam sibi mutuo dare fasciculos, qui sese decussent.

(f) Firmata uero per adductores suos maxilla, os yoidis, ipsique nexa, adtollit: sicque agit in deglutitione: hinc deglutientibus os clausum: ut eleganter ratiocinatur VVINSLOVV.

(g) Aliis, ab actione uocatur *masfiter internus*; VESALIO uero *in ore latitans*. Est autem situ exterior: sequens autem est interior. Ab origine uero *ita externi & interni* dicuntur.

(α) ALBIN. §. 37. 5.

(β) ALBIN. §. 96. 3.

76 MVSCVLI MAXILLAE INFER:

Inferio.

EVST.

h. c.

Albie.

II. Inferitur inferiori parti maxillae inferioris, prope huius angulum intrinsecus.

III. Vnus, maxillam in unum latus agit: uterque uero, simul contractus, iuuat temporalem (§. 93. III.)

§. 97. PTERIGOIDAEVS EXTER- NVS FALLOP:

Origo.

EVST.

T. 41. F.

83.

I. Oritur, duplici, distinctoque principio, (1) tendineo-carneus, a margine alae externae siue largissimae *processus pterigoidis*, ut & a parte *osis maxillaris*, illi connexa: (2) carneus, a duabus, uel tribus asperitatibus in processu laterali *osis multiformis* (α), prope foramen, transmittens uasa sanguinea, aliaque, ad oculum; ut & a portione *osis squamosi*, prope sinum (β), qui maxillae capitulum excipit.

Inferio.

EVST.

h. c.

II. Inferitur sinui, qui in collo *processus condyloidis* intrinsecus. Fibrae autem quaedam eius suprascandunt membranam, quae cartilagine[m] mobile[m] illi osi adnectit. (γ). Quin & adcipit illa cartilago fibras quasdam carneas a *temporale* (§. 94.), ac *masfiter* (§. 94.)

Albie.

III. Maxillam inferiorem; ut & superioris dentes, protrudit antrorsum.

§. 98. Quum uterque musculus (§. 96. 97.) in cane ab eodem *processus aliformis* latere oriatur, a diuersa eorum magnitudine, priorem (§. 96.) dicam maiorem; posteriorem (§. 97.) uero minorem.

(α) ALBIN. §. 51. 52.

(β) ALBIN. §. 30. 1.

(γ) ALB. §. 30.

C A P V T XXI.

MVSCVLI THORACIS, IN ANTICA
HVIUS PARTE CONSPICVI,
CORPORE SVPINO.

§. 99. **R**espiratio perficitur alterna caui tho-
racis dilatatione, alternaque eius
contractione. Duplicem hunc tam necessarium
motum edunt praecipue tredecim musculo-
rum paria. Nonnulli horum costas sursum,
extrorsumque ducendo, in inspiratione, pro
admittendo intra pulmones spiritu, augment
capacitatem thoracis: alii illam minuunt, de-
primendo costas, pro expellendo e pulmoni-
bus aëre alii tandem utrique fini succurrunt;
ut *diaphragma*. Musculi uero illi omnes uel
thoraci soli proprii, uel ipsi cum aliis partibus
communes sunt. Ita *ferrati antici* mouent
quoque *scapulas*; *sacrolumbi* extendant dor-
sum; & *scaleni* collum agunt scapulam, siue,
primam costam uersus.

§. 104. SCALENVS.

Hic in quatuor distinctos musculos diuidi
potest.

I. Primus, hoc est, gulae proximus, ori-
tur tendineus a processibus transuersis colli,
quarto, quinto & sexto. *Orig.*

II. Inferitur, tendineo-carneus, lateri su-
periori primae costae, prope eius cartilagi-
nem. *Inserlio.*
EVST.
T. 38.

I. Secundus exit e processibus transuersis
colli; secundo, tertio, quarto, quinto ac sex-
to; totidem tendinibus. *Orig.*
EVST.
T. 38. 39.
F. 1.

Inferio.
EVST.
l. c:

II. Inferitur costae primae; fibrae tamen quaedam eius supra *scalenum* quartum disperguntur.

Origo.

I. Tertius oritur a processibus transuersis ceruicis, quinto ac sexto.

Inferio.
EVST.

II. Inferitur margini superiori costae secundae.

T. 37. 39.
F. I.

I. Quartus procedit a duobus infimis colli transuersis processibus.

Origo.
Inferio.

II. Inferitur costae primae, prope huius articulationem cum uertebra.

Actio.

III. Omnes, costas eleuando, thoracem augent. (b)

Musculi hi in cane differunt ab humanis, tam numero, quam. insertione. Tres enim tantum horum habet: primusque eorum, siue, omnium maxime internus, inferitur costae primae: secundus, siue medius, qui largus, carneus ac tenuis; quintae, siue sextae, costae, si deorsum uersus numeraueris.

§. 101. Quod GALENVS, VESALIVS, & ceteri, habuere pro superiore parte uel insertione recti abdominis (§. 5.) in simiis; canibus, aliisque; id detexi uerum esse musculum, oriundum carneum, a costa prima, qui, postea tendinescens, inferatur osi pectoris, sub recti tendine, fibris horum sese decussantibus. Hunc uoco MVSCVLVM, IN SVMMO THORACE SITVM.

§. 102. SVBCLAVIVS.

I. O.

(b) Tumque ceruix per alios musculos firmata sit, necessum est: collum potius uarie flectunt: id enim primis duabus costis longe mobilius est.

I. Oritur (1) tendineus, a *clauicula* (α), *Origo*
 praecise ad eius connexionem cum *scapulae* EVST.
processu coracoide, inter duo ligamenta, ab T. 32. &
 illo processu ad clauiculam euntia, medius: 35.
 (2) a radice dicti *processus* (β), firmissime ad-
 haerens ligamento, inter hunc *clauiculamque*,
 medio. Tum illico fit carneus, adhaerescit-
 que toti inferiori parti clauiculae, ad cuius
 extremitatem declinat oblique, fitque tendineus

II. Inferitur in superiorem partem primae *Inferio.*
 costae, prope ligamentum, illi connectens EVST.
 clauiculam. l. c:

III. Eleuat costam primam. (b)

Alia.

Hunc canis non habet.

§. 103. INTERCOSTALES.

I. Oriuntur a margine inferiore cuiusvis *Origo.*
 costae superioris: (c) EVST.

II. Inferuntur margini superiori cuiusvis *T. 24. 33.*
 costae inferioris. *Inferio.*

Hoc est; EXTERNI procedunt oblique, *EVST.*
 a parte postica antrorsum: INTERNI a par- *l. c:*
 te anteriore posteriora uersus; ut ita horum
 fibrae se mutuo interfecent, litterae X in-
 star. (d) III.

(α) ALBIN. §. 264.

(β) ALBIN. §. 260. 2.

(b) Illa uero clauicula longe fixior; cur ergo non
 hanc potius paullulum deprimet? Falso ergo ille mus-
 culus quibusdam & habetur, & dicitur, *intercostalis*
primus. Si uero costae illi ab actione eius aliquis u-
 sus, illam sane figet in profunda inspiratione. Sed &
 efficit idem, ne connexa illi omoplata cum brachio
 nimis retrorsum agatur. Hoc enim contingit illico,
 musculo illo dissecto. Vid. in primis SPIGEL. L. III,
 C. IX.

(c) Et aliquando ab ipso costae latere.

(d) *Externi* non pertingunt ad *es pectoris* usque: ibi
 ergo soli *interni* conspiciuntur. V. EVST. l. c:

Actio. III. Hi omnes ampliunt thofacis cauum. (e)

§. 104. TRIANGVLARIS.

Origo. I. Oritur carneus, ac paululum tendi-
BLD. neus, a tota longitudine cartilaginis ensifor-
LOO T. mis, lateraliter: ut & a margine inferioris
26.F.1 BB. partis ossis pectoris: unde fibrae eius adscen-
 dunt oblique fursum atque extrorsum.

Inferio. II. Inferitur cartilaginibus costarum uera-
 rum, quintae, quartae ac tertiae, prope ea-
 rum coalitiones cum ossibus.

Actio. III. Deprimendo costarum illarum cartila-
 gines, thoracis cavitatem contrahit.

*In cane musculus hic longe amplior est, quam
 in homine; nam & simile uero, musculos hosce
 promouere plurimum excretionem feri superflui
 de sanguine huius animalis; quod in homine
 exportatur per ductus excretorios glandularum
 miliarium cutis, quibus distituitur canis: uide-
 mus enim, cani defesso, siue, cui ductus san-
 guinis motus, ubi iacet, uel, currit, exserta
 lingua, ac respiratione, quam profundissima, mul-
 tum excerni saluiae.*

§. 105. DIAPHRAGMA (f).

(g) Duo

(e) Dignum memoratu arbitror, intercostales, agen-
 tes; contra omnium musculorum genium, non fieri
 breuiiores, sed longiores potius: idque ualere praece-
 pte de iis, qui inter costas leuandas, hoc est, inferio-
 res collocati. Si enim costae, ubi leuantur paralle-
 lismum ubique seruant; necessum est absolute, mus-
 culi intercostalis originem remoueri aliquantum ab in-
 fertione. Id debemus HAMBERGERO, Ienensi:
 quod demonstrat singulari machina, eum in finem
 constructa. Demonstratumque in *Aetor: Erudit: T. I.*
*suppl:; internas in inspiratione agere id, quod in expi-
 ratione interni: & contra.*

(f) De hoc solus bene scripsit C. BARTHOLINVS,
 post.

Duo id componunt muscoli,

Superiori origo duplex carnea, ab extremitate *cartilaginis ensiformis* lateraliter, a parte *cartilaginis costae septimae*; a margine inferiore *cartilaginum costarum notharum omnium*, & ultimae parte ossea. Omnes inde enatae fibrae feruntur recta deorsum; a costis uero prodeuntes, uadunt oblique introrsum.

Origo.
VESAL.
L. 2. T. 7.

Inferioris uero origo est, in quouis latere, quadruplex: Oritur nempe (1) carneus, a latere *uertebrae primae lumborum*: (2) tendineus, a parte anteriore *uertebrae secundae, tertiae, & quartae* quandoque. Tendo huius, uix, ac ne uix quidem, separari potest a parte quadam sui parisi ab altero latere: (3) tendineo-carneus a latere *uertebrae secundae*, & per saepe adhuc a tertia, & singulatim quidem in uno latere: (4) tendine tenui, a radice processus transuersi secundae *lumborum uertebrae*. Hanc inter originem, & ultimam costam, adscendit *triangularis* (§. 194.). Origines descriptae confluunt in tendinem medium. Hoc iam *diaphragma* in parte tendinea perforatum est ab *uena cava inferiore*: inque carnea superioris musculi, a descendente *stomacho*, & *pari uago*. In interuallo, quod inter duas appendices tendineas, uti eas adpellant, descendit arteria magna, & adscendit *ductus thoracicus* ab *receptaculo chyli*. Adparet quoque fissura, illos inter tendines cuiusuis lateris, & primae *uertebrae lumborum*

Origo.

F

cor-

post STENONEM. Bona uero eius figura adhuc nulli: quae uero & difficillima; nam nec ulla habetur a parte, quae thoracem uersus.

corpus lateraliter, per quam descendunt *nerui intercostales*, adscenditque, in latere dextro, *uena sine pari*, & *uena caua*, infra *emulgentem*, enata. Tandem, inter adhaesionem ad latus memoratae *uertebrae*, eiusque processum transuersum, occurrit arcus species, munita margine tendineo, sub quo pars superior musculi *costae*, proueniens ab ultima *uertebra dorfi*; & tendo *quadrati lumborum*, ad insertionem suam properans.

Actio

In inspiratione, superior eius superficies, contracta, fit planior: inde ergo cauum *thoraci* maius, pro explicandis facilius ab aëre pulmonibus, comprimendisque *uisceribus abdominalis*, quo chylus propelleretur &c. In expiratione autem superficies eius, thoracem uersus, fit conuexa; inde imminutus thorax spiritum expellit foras.

In cane inferior diaphragmatis musculus oritur quatuor tendinibus, duobus paruis, & totidem longis.

§. 106. COSTARVM DEPRESSORES PROPRII COVPPER:

Origo.

I. Oriuntur, tendinei, a parte superiore costae, prope eius articulationem cum processu *uertebrae* transuerso. (α).

Inserio.

II. Inde abit quisque in largum tenuemque uenrem, qui, adscendens oblique supra costam unam, subiectus *membranae*, succingenti *costas*, inseritur costae, illi superne proximae.

Tales musculi sunt decem, expansi omnes supra internam costarum partem, ab postica usque

MVSCVLI VESICAE VRINAR: 83

usque ad mediam earum fere.

III. Deprimunt costas.

Adis.

Quum hosce ante aliquod tempus detegeret COVUPER, obseruationem hanc communicaui mihi: inde, ab usu, *depressores costarum proprios* illos nominaui.

C A P V T XXII.

MVSCVLI VESICAE VRINARIAE.

Vesica urinaria duos habet musculos.

§. 107. SPHINCTER. (a)

Hunc constituunt paucae, paruae, orbiculares, carneae, fibrae, quae, externae uesicae membranae succumbentes, collum illius cingunt.

De
GRAAF
T. II. 10.

§. 108. DETRVSOR VRINAE.

Hic secundam urinariae uesicae membranam format: cui fibrae musculares diuersarum directionum: quae, contractae, aperiunt uesicae collum, urinamque, ingenti ui, exprimunt.

EVST.
T. 12. F.
7.

(a) De hoc & sequente musculo, euoluatur MOR-
GAG. *epist. Anatom.* I. n. 60. 61.

CAPV T XXIII.

MVSCVLI ANI.

§. 109. **F**ini *intestini recti*, quem *anum*, siue, *podicem*, uocant, sex prospiciunt muscoli; duo nempe paria, *leuatores* dicta; & duo singulares, qui *sphincteres*.

§. 110. **LEVATOR MAGNVS**, uel, **INTERNVS**.

Origo.
EVST.
T. 37.

I. Oritur, (1) (a) ab *osse pubis*, inter eius commissuram; (a), & cauitatem, quae ipsi cum *osse ischio* communis, medius: (2) a tendine, *marfupiali* incumbente; & (3) ab *osfis ischii* acuto processu (β): quem inter & inferiorem partem *osfis coccygis*, adcreuit musculo *coccygaeo*, eadem cum illo membrana tectus. Ad posteriora *intestini recti* concrescit cum pare suo: sicque ambo illud undique ambiunt, illud si exceperis locum, ubi illi *prostatæ* ac *bulbus urethrae* adhaerent. (b)

Inferio.
EVST.
T. 10.
F. 2. 4.
T. 37.
Actio.

II. Inferitur *sphincteri uaginali*: pars autem suprema eius firmiter adfixa *osfi coccygis*.

III. Excrementis eiectis, leuat *anum*; eumque (2) ex parte, claudit: (3) facit, ne illud intestinum nimis delabatur, quod semper contingit, quoties fibrae eius relaxantur in *παρалуσι*. (e)

Ante,

(a) Haec, & tertia origo, diuersum habent fibrarum decursum, sese post decusantium.

(a) ALBIN. §. 186. 4.

(β) ALBIN. §. 190. 4.

(b) Fibras quoque impertit *prostatæ*.

(c) Docet contemplatio, illum uiam aperire egressuris foecibus.

Ante, quam in cane inferatur, in tres, uel quatuor, uidetur diuisus partes, quarum in quouis latere una rectum adtollit, caudae inserta; haec enim, excretionem foecum peracta, in illo animali deprimitur.

§. III. LEVATOR PARVVS, siue, EXTERNVS RIOLA: (d)

I. Oritur, tendineus & carneus, a tubere Origo osfis ischii (α).

II Inde decurrit per transuersum, donec inferatur sphincteri ani interno, prope urethrae bulbum.

III. Iuuat descriptum (§. 110. III.)

Hic deficit in cane.

§. 112. SPHINCTER EXTERNVS, uel, CVTANEVS.

Hic, inter cutem ac pinguedinem situs, cingit podicem, ad unius pollicis latitudinem.

§. 113. SPHINCTER INTERNVS, siue, VAGINALIS.

Fibrae huius carnaeae circumeunt inferiorem recti intestini finem, ad latitudinem unius circiter pollicis; cohaerentes antrorsum cum acceleratore urinae (§. 115.); posterius uero cum leuatore (§. 110.).

II. Claudendo recti finem, impediunt inuoluntariam foecum excretionem.

In cane non necessum fuit, ut fibrae circula-

F 3

(d) Hic quandoque, sed raro, ab uno abest latere.

(α) ALBIN. §. 188.

(e) Illa, antrorsum, trianguli specie, elongata pars, singularis RIOLANO habita est musculus, qui anterior anj. LITFRE autem illam dixit dilatatorem urethrae posticum.

res per tantam altitudinem cingerent recti extremitatem, ut in homine; nam & in illo, cuius corpus horizonti parallelum, non est tanta focum aluinarum pressio, neque tantum earum pondus; quantum quidem in erecto homine.

C A P V T XXIII.

MVSCVLI SCAPVLAE.

§. 114. *Scapulam agunt tria propriorum musculorum paria, & duo, ipsi cum thorace communia, quae faciunt serrati antici.*

§. 115. *TRAPEZIVS, uel, CVCVLARIS.*

Origo.

I. Oritur (1) crasso, breuique tendine, a parte inferiore eminentiae, quae in osse occipitis, posteriora uersus (a), & gracili membranofo, *complexum* ac *splenium* aliquantum integente, ab aspera linea, quae ibi loci ab occipite uersus *processum mamillarem* extenditur:

EVST.

T. 29. 31.

34.

EVST.

T. 31.

tum (2) tendineus, a spina ultimae colli uertebrae, *spinisque* omnibus dorsi, binis ultimis exceptis. Ab osse occipitis usque ad ultimam uertebrae colli spinam ita cohaeret pari suo alterius lateris, ut ab illo separari nequeat. (a)

GALENVS musculum huncce in duos distinxit; *superiorem* scilicet, & *inferiorem*.

Ilium

(a) ALBIN. §. 11. 4.

(a) Post separati ab inuicem procedunt: mox rursus, ad ultimam suam originem usque, coituri.

Illum dixit *trapeziam*: hunc sequentes Anatomici adpellarunt *cucullam*: unde ambo communiter *cucullares* uocantur.

II. Inferitur (1) carneus, largiori ac posticae *clauiculae* parti: (2) *tendineo* carneus, dimidio *summi humeri*: & (3) aliquantum *tendineus*, toti fere *spinæ scapulae*. (β).

Inferit.
EVST.
l: c:

III. Triplex *fibrarum directio* uarie quocumque mouet *scapulam*: rectae enim illam recta retrorsum agunt: oblique descendentes, illam oblique adtollunt: & oblique ascendentes, illam oblique deorsum retrorsumque ducunt.

Actio.

In cane *suprema ipsi origo a toto ligamento colli*; quod *infra leuatoris humeri proprii originem*: pars uero eius, *cucullae similis*, exit e *dorsi uertebri*, circa *illarum medium*: *series tandem fibrarum*, *scapulam recta retrorsum mouens*, coit, ope *tenuis membranae*, cum *suprema huius musculi parte*, cui *trianguli figura*.

Quum canem *deficiat clauicula*; eidem neque *inferi potuit hic musculus*.

§. 116. ELEVATOR, uel MVSCVLVS PATIENTIAE.

I. Oritur, carneus, a *processibus transversis uertebRARUM colli*, primo, secundo, tertio, & quarto nonnumquam, totidem distinctis fasciculis, postea illico coeuntibus.

Orig.
EVST.
T. 36.
VESAL.
T. 12. G.
T. 13. Q.
Inferit.
EVST.
T. 29. &

II. Inferitur carneus *scapulae baseos parti*, inter *spinam eius*, *superioremque angulum mediae*. (α).

l: c:
Actio.

III. *Scapulam sursum ducit*, paullulumque *antrorsum*. (β).

F 4

In

(α) ALBIN. §. 259. 1. 2.

(β) ALBIN. §. 257. 7.

(b) Firmata *scapula*, *collum flectit*: & retinet porro *scapulam*, ne nimis deorsum feratur.

In cane eleuatur scapula a duobus musculis, quorum unus est.

LEVATOR MAIOR, siue, ANTERIOR, oriundus carneus a largo processu transuerso primae colli uertebrae; insertusque in superiorem partem spinae scapulae, prope eius finem, quae in homine summum humerum constituit.

Alter, est LEVATOR MINOR, uel, POSTERIOR, oriundus tendineus ab occipite, prope eius spinam; qui, angustatus descendens ad longam rhomboidis portionem, inseritur, tendine exiguo, basi scapulae, prope eius superiorem angulum.

§. 117. RHOMBOIDES.

Hunc semper reperi diuisum in duas partes carneas, membrana intermedia coniunctas.

Origo.
EVST.
T. 34.

I. Superior, siue, minor, oritur tendineus, ab ultima spina colli, & aliquantulum a ligamento colli, quod supra illam.

Insertio.
EVST.
T. 29. &
l. c.
Origo.

II. Inferitur basi scapulae, partim supra illius spinam, partim uero, & quidem maxumam partem, infra eandem.

I. Inferior autem oritur tendineus a spinis quatuor uel quinque superiorum uertebrae dorsi.

Insertio.
EVST.
l. c.
Actio.

II. Inferitur toti fere reliquae baseos scapulae parti.

III. Scapulam oblique sursum ducit, & recte retrorsum.

In cane oritur carneus a toto ligamento colli, qui, quo magis descendit, eo largescit magis, donec uniatur parti, uenienti a dorsi spinis, prope scapulae angulum superiorem.

C A P V T XXV.

MUSCVLI THORACIS, ADPARENTES, CADAVERE PRONO.

§. 118. SERRATIVS MAIOR ANTI-
CVS. (a)

I. Oritur, carneus, a tota *scapulae* basi in-
trinfecus (α), inter insertionem *rhomboidis*
(§. 117. II.), & originem *subscapularis* me-
dius, complicatus quasi circa duos *scapulae*
angulos (β). Origo. *scapulae*
EVST. T. 36.

II. Inferitur octo costis superioribus, totidem
digitulis carneis. Insertio.
EVST. T. 33.

III. Eleuando costas, dilatat *thoracem*:
&, secundum quosdam, mouet *scapulam*, cui
(uti uolunt) inferitur antcrius ac inferne. Actio.

In cane oritur carneus, a quinque inferio-
ribus procesfibns transuersis uertebra-
rum colli, totidem diuersis capitibus, & tendineo-carneus,
a septem superioribus costis. Series fibrarum
prima, uel summa, descendit oblique ad inser-
tionem suam in basin *scapulae*, intrinfecus. Se-
cunda, a costis orta, adscendit oblique, inferi-
turque haud tantum basi *scapulae*; sed &
uastus carneusque, concauae illius parti. Hic
singulares cani *scapulae* motus efficit, pro ua-
rio fibrarum decursu; quin & cauet, ne sca-
pula

F 5

(a) Varia de eius fabrica & actione, eaque plane
singularia narrat VVINSL. in *actis Paris.*; diuidit eum
scilicet in tres musculös: unum medium, paruum:
duosque, longe maiores, extremos.

(a) ALBIN. §. 256.

(6) ALB. §. 257. 6. 7.

90 MVSCVLI THORACIS, &c.

pula exiliat, uel eleuetur nimis, animali illa stante, uel currente.

§. 119. SERRATVS MINOR ANTI-
CVS. (b)

Origo. I. Oritur, tendineus, a *processu coracoide*
EVST. *scapulae* (a), inde autem mox fit carneus ac
T. 32. 35. largior.

Insertio. II. Inferitur, tendineo-carneus, marginibus
EVST. inferioribus costarum ossearum, tertiae, quar-
l: c: tae quinaeque. (c).

Actio. III. Vel succurrit praecedenti (§. 118. III.);
uel mouet *scapulam* antrosum.

Hic deficit in cane.

§. 120. SERRATVS SUPERIOR POS-
TICVS.

Origo. I. Oritur, tendine largo tenuique, a parte
EVST. inferiore *ligamenti colli*, uel potius, ab unio-
T. 36. ne tendinea *spleniorum*: (2) ab *processu acuto*
ultimae *colli uertebrae* (a), ac duobus, uel
tribus, *supremarum dorsi* (d) (β).

Insertio. II. Inferitur costis, secundae, tertiae &
VES. T. quartae; totidem singularibus fasciculis car-
II. F. neis.

Actio. III. Eleuando costas, extendit *thoracem*.

§. 121. SERRATVS INFERIOR POS-
TICVS.

Origo. I. Oritur, tendine lato & gracili, a spi-
EVST. nis duarum inferiorum *uerterarum dorsi* (a),
T. 36. tot-

(γ) Gallis uocatur, *lingua sua, pectoralis minor*.

(a) ALBIN. §. 260.

(c) Inferitur nonnumquam *dentatus*; uti hanc diuer-
sitatem quoque docuit EVST. l: c:

(α) ALBIN. §. 133. 1.

(d) Vbi descendit, in medio multum tendinescit:
quia in praelo quasi collocatus.

(β) ALBIN. §. 132. 6.

(α) ALBIN. §. 132. 1. 2.

totidemque, uel pluribus, superiorum lumborum (e).

II. Inferitur, carneus, marginibus inferioribus costarum trium, uel quatuor, inferiorum, raro tamen ultimae. *Inferitio* uero haec ita ab *obliquo* (§. 1.) remota, ut fines utriusque musculi per indentationem sibi immitti nequeant. *EVST. l: c:*

III. Costas, quibus inferitur, deprimit: uel, ad minimum, motum illarum deorsum uersus adcelerat. *Alia*

§. 122. Prior (§. 120.) in cane oritur, tendine tenui, a parte inferiore ligamenti colli, eiusque extremo processu acuto: ut & ab octo superioribus processibus dorsi; insertus nouem supremis costis, prima tamen excepta, totidem distinctis digitulis carneis. Tendo eius coit cum tendine posterioris (§. 121.); sicque constituunt, ut sic loquar, fortem, tendineam fasciam, quae, subiectos musculos in situ continens, eorum uim in immensum auget.

§. 123. SACROLUMBALIS.

I. Oritur, eadem cum longissimo dorsi origine, extrorsum tendineus, introrsum carneus, (1) a singulis supremis spinis ossis sacri (α), (2) a posteriore parte spinæ ilium (β), (3) a spinosis processibus inferiorum uertebularum lumborum (γ), & (4) ab illarum transuersis: pone radices eorum. (δ). *Origo* *EVST. T. 36.*

II.

(β) IDEM §. 131.

(e) Originem ibi eandem habet cum latissimo dorsi: huius tendo est exterior. serrati uero musculi interior: quod obseruauit EVST. l: c.

(α) ALBIN. §. 143. 2. (β) Idem §. 191. 6.

(γ) Idem §. 131. (δ) Idem §. 136.

92 MVSCVLI THORACIS, &c.

Inferio. II. Inferitur, totidem longis tenuibusque
VES. T. tendinibus, quot sunt costae: & quidem sin-
31. Q. gulo quoque, tertiae costae parti, ubi iam in-
 curuari incipit, & altius, quam ubi a mus-
 culo hoc secedit. Tendo tamen supremus,
 qui & ultimus, finit in procesum transuersum
 imae uertebrae cervicis. (f).

Actio. III. Deprimit costas.

§. 124. A superiore parte sex uel septem
 costarum inferiorum procedunt totidem parui,
 tenuium tendinearum, carnearumque fibra-
 rum fasciculi, qui, paullulum progressi (g),
 inferuntur interno *sacrolumbalis* (§. 123.) lateri.
 Hos dixit STENONIS MVSCVLOS, AD
 SACROLVMBVM ADCESSORIOS.

§. 125. CERVICALIS DESCEN-
 DENS DIEMERBR: (h). p. 457.

Origo. I. Oritur, carneus. a procesibus trans-
 uersis uertebrae collis, tertio, quarto, quin-
 to & sexto.

Inferio. II. Inferitur costis, tertiae, quartae, quin-
 tae, sextae ac septimae (i), *sacrolumbalem* (§.
 123.) inter ac *longissimum dorsi*.

Actio. III. In inspiratione, leuat costas.

§. 126. LEVATORES COSTARVM
 STENON: (l).

Hosce

(f) Tendines illos SPIGEL: *ansas* uocauit: suntque
 tales tredecim.

(g) *Sacrolumbalis* tendines (§. 123. II.) decussant in
 formam litterae X.

(h) Hunc plerique *sacrolumbalis* (§. 123.) partem ha-
 bent.

(i) Collum potius flectit, illis costis longe mobi-
 lius: ut ergo potius a costis oriatur, & uertebis illis
 inferatur.

(l) *Intercostalibus* (§. 103.) illos adcentent alii.

Hosce *proprios* adpello, ut distinguantur a ceteris musculis, idem officium exsequentibus.

I. Oriuntur, tendinei ac carnei, a processibus transuersis *uertebrarum* dorfi (α). Inde feruntur oblique antrorsum, moxque.

II. Inferuntur lateri superiori costarum omnium, prima excepta.

III. Leuant costas, thoracemque ampliant: idque agunt omnium maxime: quum processus *uertebrarum* ipsis sint tot *hypomochlia*.

(α) ALBIN. §. 137.

C A P V T XXVI

MVSCVLI CAPITIS, CONSPICVI, CADAVERE PRONO.

§. 127. SPLENIVS. (a).

I. Oritur permultis, longis ac tenuibus tendinibus, a quinque superioribus spinis *uertebrarum* dorfi (α), & tendineus carneusque, ab ultima colli (β), totusque tendineus a colli *ligamento*; uel potius, tendines utriusque huius musculi uniuntur ibi inseparabiliter; ad secundam uero circiter colli *uertebram* secedunt ab inuicem, ut subiecti musculi pars quaedam uideri possit.

II.

(a) Hoc titulo, duos musculos descripsit *Auctor*, quorum alter *capitis splenivus* uocatur; alter *cervicis*: duosque delineauit EVSTACHIVS: ut adparet e citationibus.

(α) ALBIN. §. 132. §. 6, (β) IDEM §. 133. I.

Inferio.
EVST.
T. 29.

II. Inferitur, tendine simplici, procesui transuerso *uertebrae colli secundae* (γ): & duplici plerumque, eiusmodi procesui primae (δ): & tendineo-carneus inferiori anteriorique parti *procesus mammillaris* (ϵ): unde retrorsum fertur uersus *occiput*.

Actio. III. Caput uersus posteriora ducit in latus unus: uterque uero, simul contractus, caput recta retroagit.

In cane inferitur in procesum transuersum uertebrae colli primae, inque partem posticam lateralemque osis occipitis. A parte postica intime coniungitur cum suo pari alterius lateris, ab processu aspero ultimae uertebrae colli usque ad occiput, unde ab iis descendit tenuis pellucensque membrana ad omne ligamentum colli.

§. 128. TRACHELO MASTOIDAEVS; *sive*; PAR TERTIVM FALLOP.

(b).

Orig.
EVST.
T. 30. in
sinistro.

I. Oritur a procesibus transuersis *uertebrae dorfi*, primae ac secundae (α), & a tribus uel quatuor imarum colli (β), totidem tendinibus tenuibus, qui, uniti, sat crassum uentrem formant, adscendentem sub *splen i* (§ 127.)

Inferio.
EVST.
T. 37.
l. c.
Actio.

II. Inferitur, tendine tenui, medio partis posterioris *procesus mammillaris*. (γ)

III. Iuuat *complexum*.

Persaepe adcipit fasciculum carneum, aliquan-

(γ) ALB. §. 138. 5.

(δ) IDEM l. c. 6. (ϵ) IDEM §. 29. 4.

(b) Hunc *lysum naturae* putat COVVP. p. 119.

(α) ALBIN. §. 137. 4. 5.

(ϵ) IDEM §. 138. 1. 4. (γ) Idem §. 29. 4.

quantum teretem, a longissimo dorsi.

In cane, ubi ad occiput finitur, sic unitur cum tendine splenii (§. 127.), ut ab eo separari nequeat.

§. 129. COMPLEXVS.

I. Oritur, tendineus & carneus, a sex uel ^{Orig.} septem superioribus procesibus transuersis ^{EVST.} uertebrae *dorsi* (c), omnibusque iis colli, ^{T. 37. 39.} totidem distinctis originibus; primae tamen excepto (β); quin & uidetur, nasci cum aliquo modo ab obliquis *colli* procesibus (γ). Vbi adscendit, adhaeret spinae *ultimae colli uertebrae* (δ), ut & ligamento, ab illa ad secundam eunte, ibique, pari suo lateris alterius relicto, decurrit oblique antrorsum ad insertionem suam. (c)

II. Inferitur, carneus, *osfis occipitis*, inter ^{Infectio.} superiorem partem *obliqui superioris* & ^{EVST.} marginem protuberantiae, quae in medio illius ^{l: c:} osfis, medius. (a)

III. Vnus agens, caput paullulum inclinat ^{Actio.} in latus: uterque uero, caput extendit, uel recta retro mouet.

In cane oritur a quatuor superioribus procesibus transuersis dorsi, totidem tenuibus paruisque tendinibus; ut & a quinque inferioribus colli, totidem diuersis capitibus, serrati (§. 129.) digitulos referentibus. Hae cunctae origines confluant in largum uentrem, qui in tendinem, parti laterali occipitis, pro-

(a) ALBIN. §. 137. 4. 6. (β) *Idem* §. 138. 1-5.

(γ) *Idem* §. 123. 2-4. (δ) *Idem* §. 133. 1.

(c) In adscensu suo tendinescit hinc inde: quod & notauit EVST. l: c:

(*) ALBIN. §. 21. 1.

96 MVSCVLI CAPITIS, &c.

prope eius tuberculum insertum, desinit.

§. 130. RECTVS MAIOR.

Origo.
EVST.
T. 39.

I. Oritur, carneus, ab una *spinarum uertebrae secundae colli* (α): inde, inter adscendendum, fit largior; adscendit autem non recta, sed oblique, extrorsum; in duas quasi tenues portiones diuisus: quarum

Insertio.
EVST.
l. c:

II. Intima inseritur *occipiti*, prope *rectum lateralem*; altera uero, eademque largior, finit, tendinea ac carnea, in idem os, sub *obliqui maioris* parte.

Actio.

III. Caput extendit, uel mouet posteriora uersus.

Hic in cane est duplex: prior, siue RECTVS MAIOR, procedit ab inferiore parte illius processus: posterior, qui mihi RECTVS MEDIVS, ab superiore eiusdem spinae parte exit.

§. 131. RECTVS MINOR.

Origo.
EVST.
l. c:

I. Oritur, pari suo arctissime adpresus, angusto initio, a tuberculo, quod in medio posticae partis primae *colli uertebrae*. (α)

Insertio.
EVST.
l. c:

II. Inseritur sat largus lateribus sinus, qui in *occipitis osse*, ad magnum illius *foramen* (β). Latus eius internum tegit alter *rectus*. (§. 130).

Actio.

III. Iuuat descriptum (§. 130. III.), in concutiendo caput posteriora uersus.

§. 132. OBLIQVVS SUPERIOR.

Origo.
EVST.
l. c:

I. Oritur a processu transuerso primae *colli uertebrae*. (α)

II.

(α) ALBIN. §. 133. 4.

(α) ALBIN. §. 135.

(β) ALBIN. §. 21. 4.

(α) ALBIN. §. 138. 6.

II. Inferitur, tendineus ac carneus, *osfi-* *Inferio.*
bus, petroso ac occipitis, inter posticam pro- *EVST.*
cessus mammillaris partem (β), & complexum *l: c:*
 (§. 129.), medius.

III. Mouet caput oblique, uel, per femi- *Actio.*
 circulum.

Hic in cane praeterea est duplex: alter e-
nim musculus oritur carneus ab extremitate
processus transversi primae colli uertebrae; alter
uero ab toto superiore margine eiusdem proces-
sus: uterque uero coire uidetur circa insertionem
suam in occiput.

§. 133. OBLIQUVS INFERIOR.

I. Oritur carneus a secundae colli uertebrae *Origo.*
 spina (α), & parte quadam corporis eius- *EVST.*
 dem, uicina illi processui (β). *l: c:*

II. Inferitur primae processui transverso. *Inferio.*
 (γ). *EVST.*

III. Idem agit, quod praecedens (§. 132. *l: c:*
 III.) *Actio.*

In cane oritur a margine longi processus spi-
nosii secundae colli uertebrae.

(β) ALBIN. §. 29. 3.

(α) ALBIN. §. 133. 4.

(β) Idem §. 124.

(γ) ALBIN. §. 138. 6.

MVSCVLI COLLI POSTERIORES.

§. 134. SPINALIS.

Origo.
EVST.
l: c. in
dextro.

I. Oritur, copiosis tendineis carneisque fibris, a superioribus quinque transuersis processibus uertebrae dorfi (α). Inde adscendit obliquus, sub *complexo* (§. 129.)

Insertio.
Idem l: c:

II. Inferitur colli spinis, quintae, quartae, tertiae ac secundae (β), totidem paruis tendinibus.

Actio.

III. Collum extendit, id mouendo recta retrorsum.

In cane maiori iure nomen suum tuetur hic musculus, comes quippe omnium colli spinarum; oritur enim ibi ab apice primae dorfi spinae, rectaque transit ad illum secundae colli uertebrae processum, firmiter adhaerens lateribus processuum omnium intermediorum spinosorum.

§. 135. TRANSVERSALIS.

Origo.
C: BAR-
THOL.
in specim
b: a: T.
4. F. 3. &
4.
COVVP.
F. 8. K.

I. Oritur, tendineus ac carneus, partim a processibus obliquis quatuor inferiorum uertebrae colli (α); partim a spatio, inter illos processus atque transuersos medio (β). Est uero tantum continuatio fibrarum muscularium, dorfi musculos cognomines constituentium.

Insertio.

II. Inferitur ad radices superiorum spinarum colli (γ); suprema uero insertio non est tantum

(α) ALBIN. §. 137. 4. 6.

(β) ALBIN. §. 133. 3. 4.

(α) ALBIN. §. 128. 3.

(β) ALBIN. §. 140. 4.

(γ) ALBIN. §. 133. 1-3.

MUSCVLI COLLI POSTERIORES. 99

tum in secundae uertebrae spinam, sed & in eiusdem corpus, a latere (d).

III. Vterque, collum mouet recta retror- *Actio.*
sum: unus uero; oblique retrorsum.

In cane inseritur corporibus uertebrae collum.

§. 136. INTERSPINALES COVV-

PE: p. 110.

I. Oriuntur, carnei, a superiore parte cuius- *Origo.*
uis duplicis spinæ collum; primo excepto (α), ab *COVVP.*
ipso primæ uertebrae corpore oriundo (a) (β). *F. 8. LL.*

II. Inferuntur inferiori parti dictarum spi- *Insertio.*
narum omnium.

III. Acutos illos processus adducunt ad in- *Actio.*
uicem.

§. 137. INTERTRANSVERSALES COVVPE:

I. Distantiam inter processus transuersos *Origo.*
uertebrae collum, maxumam partem bifidos,
explet substantia carnea, ab inferiore proces- *Insertio.*
su oriunda, insertaque superiori. (α).

II. Hi transuersos illos processus addu- *Actio.*
cunt ad inuicem.

§. 138. INTERVERTEBRALES. ***

(b)

I. Oriuntur a corpore unius uertebrae, a late- *Origo.*
re. (α).

G 2

II.

(d) *Idem.* §. 124.

(α) ALBIN. §. 133. 2. 4

(a) Saepe uero uertebra quaedam caret tali muscu-
lo: ita, ut ab epistropheo transcat ad quartam, mus-
culo uero tali careat.

(β) *Idem.* §. 125.

(α) ALBIN. §. 138.

(b) Hi uidentur ad priores (§. 137.) pertinere.

(α) ALBIN. §. 123-125.

Inferio.

II. Inferuntur, oblique incedentes, parti posticae alterius *vertebrae*, quam proxime incumbentis.

Actio.

III. Corpora *vertebrarum* adducunt, ad inuicem, paululumque in unum latus.

§. 139. Numerus paruorum horum musculorum (§. 136-138.) est re uera incertus, nam & in pluribus cadaueribus uariat. Vltimi uero (§. 138.), omnium (§. 136. 137.) tenuissimi, praecipue dantur conspici supra posticam partem *vertebrarum*, primae secundaeque, ut & secundae ac tertiae.

§. 140. *Musculi omnes* (§. 136-138.) in cane sunt grandiores, quam in homine.

CAPUT XXII.

MVSCVLI DORSI.

§. 141. **L**icet musculi, dorsi lumborumque *vertebris* incumbentes, uel putante ita magno FALLOPIO, non uideantur esse, nisi tendinearum, fibrarumque carnearum ita uehementer, ac uarie, sibi inuicem intertextarum, ut, si non plane non, difficillime ad minimum separari possint, confusa indigestaque moles; nihilo tamen minus, ubi sectioni incubui, semper eos demonstraui, quippe in omnibus cadaueribus regulares, conformesque, in octodecim diuisos, nouem scilicet in quouis latere positos; quorum unus ad *thoracem* pertinet, nempe *sacrohumbalis* (§. 123.); tres ad dorsum; & reliqui ad lumbos. GALENVS & DVVERNEY unum idemque putant; siue illos, quos *spinales uer-*

tebralesque uocant, pro uno pari habeas; siue eorum numerum, pro *uertebrarum* numero, augeas; ego tamen posterius multae confusio- nis causam agnosco; prius autem artifice in- dignum habeo.

§. 142. LONGISSIMVS.

I. Eandem cum *sacrolumbale* (§. 123. I.) Origo.
EVST. habet originem.

II. Inferitur procesibus transuersis dorsi omnibus (α), & quidem singulis, tendine duplici; a quorum exterioribus lateribus sece- dunt fasciculi plures carnearum fibrarum, qui- bus pauca filamenta tendinea interspersa, inserti illico in inferiorem marginem costarum plu- rimarum, haud procul ab illarum *tuberculis*. (β). T. 36. 37.
Inferio.

III. Extendit dorsi *uertebras*; sicque tran- Actio. cum corporis tenet erectum.

A superiore huius musculi parte adscendit portio, teres, carnea, quae, ubi postea ten- dinescit, cum musculosa *trachelo-mastoidaei* (§. 128.) parte coit. (a).

§. 143. SEMISPINALIS.

I. Oritur, a procesibus transuersis infi- Origo. marum *uertebrarum* dorsi sex, uel septem (α), totidem singularibus tendinibus, inde mox fit carneus, rursusque tendineus; qualis

G 3

II.

(α) ALBIN. §. 137.

(β) ALBIN. §. 171.

(a) Mentio hic faciunda *semispinati*, detecti per BID- LOO, uel potius a *longissimo* (§. 142.) separati, cuius pars habetur a COVVER. Exit nempe ad inferiora dorsi ex illo musculo, qua spinam dorsi spectat fibrarum carnearum fasciculus inde adscendit, abitque in tres, uel quatuor tendines, quibus mediarum nonnullarum dorsi *uertebrarum* spinis inferitur. EVST. T. X^{XVII}. BIDL. T. XXIX. K. Saepe abest.

(α) ALBIN. §. 137.

Insertio. II. Inferitur omnibus superioribus dorſi ſpinis (β) ut & ultimae colli (γ).

Actio. III. Iumat ſequentes.

§. 114. TRANSVERSALES DORSI INTERIORES.

Origo. I. Oriuntur, cum tendinei, tum carnei, a ſuperiore parte proceſſuum tranſuerſorum dorſi (α): poſt, omnes fiunt carnei, & feruntur, ſupra proximam uertebra.

Inſertio. II. Inferuntur ſpinis dictarum uertebra-
rum omnibus, prope earum radices.

Actio. III. In uno latere poſiti omnes ſi agant ſimul, dorſum extendunt oblique, id eſt, illud mouent in unum latus: utriusque autem lateris una contracti, *uertebraſ dorſaleſ* extendunt, eaſdem mouendo, poſteriora ueſ-
fuſ.

(β) ALBIN. §. 132. 6.

(γ) Idem §. 133. 1.

(α) ALBIN. §. 137.

(ϕ) ALB. §. 132.

C A P V T XXIX.

MVSCVLI LUMBORVM.

§. 145. **A**d lumborum *uertebraſ* mouen-
das quinque obſeruantur mus-
culorum paria.

§. 146. SPINALIS COVVPE: p. 135.

Origo. I. Oritur, tendineuſ & carneuſ, uti *sacro-
lumbaliſ* (§. 123. I.) & dorſi *longiſſimuſ* (§.
142. I.), ab *ſacri oſſiſ* ſuperioribuſ ſpinis ſim-
plicibuſ. (α). II.

(α) ALBIN. §. 143. 2.

II. Inferitur, tendineus, spinosis processibus *uertebrae lumborum* omnibus. (β). *Inferio.*

III. Hasce uertebras extendit. *Actio.*

§. 147. TRANSVERSALIS LVMBORVM; uulgo SACER.

I. Oritur, carneus, ab obliquis processibus *uertebrae lumborum*. (α) (a). *Origo.*
EVST.

II. Inferitur prope radices spinosorum processuum illarum (β). *T. 39.*
EVST.

III. *Vertebrae lumborum* eodem mouet modo, quo *transuersales*, (§. 144. III.) *l. c.*
illas dorsi agunt. *Actio.*

§. 148. QUADRATUS.

I. Oritur amplius, tendineo-carneus, a posteriore parte *spinæ ilium* (α). *Origo.*
EVST.

II. Inferitur processibus transuersis omnium *uertebrae lumborum*, praeter ultimum (β): *T. 39.*
costae primae: & paruo tendine, sursum repente sub *diaphragmate* (§. 105.), ultimae *& 38.*
dorsi *uertebrae*, a latere. (γ). *Inferio.*
EVST.

III. Lumbos in unum latus mouet: uterque autem *uertebras* flectit recta antrorsum. *Actio.*

In cane oritur a spina ilium intrinsecus, ascendensque cohaeret cum processibus transuersis lumborum omnibus: tum, ingresus thoracis cauum, finit in decimam uel nouam uertebra,

(β) ALBIN. §. 131.

(α) ALBIN. §. 27. 2. 7.

(a) Eundem quoque oriri ab *osse sacro* notat ALBIN.

§. 144. l. c.

(β) ALBIN. §. 131.

(α) ALBIN. §. 191. 6.

(β) ALBIN. §. 136.

(γ) ALBIN. §. 122. 2.

bram, *desuper numeraueris.*

§. 149. A processibus transuersis, quarto, tertio, & secundo nonnumquam, nascuntur totidem parui musculi, coeuntes cum interno quadrati (§. 148.) latere, quod cauum abdominis respicit.

§. 150. ΨΟΑΣ PARVVS RIOLA:

Origo.
EVST.
T. 38.
Infertio.

I. Oritur, carneus, a suprema lumborum uertebra, a latere. (α).

II. Inferitur, tendine longo, plano ac tenui, illi osfi pubis parti, quae cum osse ilium committitur (β).

Actio.

III. Succurrit recto (§. 5. III. 2.), in eleuando pubis os, ut quando propria ui surgimus decumbentes, uti scribit COVPER p. 180. sed & (2) lumbos antrorsum flectere potest: tum uero origo eius trahatur ab osse pubis necesum est, ac insertio sit firmata in illis uertebis.

Hic in humano corpore q̄best saepe numero: in canino uero numquam, ubi ortum ducit a corporibus quatuor imarum uertebRARUM dorsi, quarundamque superiorum lumborum, totidem paruis tendinibus, a latere: carneus autem a medio omnium illarum uertebRARUM lateraliter. Inde illico largum, sed tenuem tendinem sibi adquiret, expansum supra magnum Ψοας.

§. 151. INTERTRANSVERALES.

* * *

Origo.

I. Hi inter transuersos lumborum processus (α) siti; oriundi a toto processus unius latere,

II.

(α) ALBIN. §. 121. 1.

(β) ALBIN. §. 186. 3.

(α) ALBIN. §. 136.

II. Inferuntur lateri alterius.

Inferio.

III. Procesus illos adducunt ad inuicem.

Actio.

Paruos hosce musculos primus detexi in cane: postea uero & in humano corpore illos semper praesentes inueni.

CAPVT XXX.

MVSCVLI HVMERI.

§. 152. **O**ssis humeri mouendo nouem dati sunt musculi.

§. 153. PECTORALIS. (a)

I. Oritur, carneus, (1) a dimidia fere anteriore *clauiculae* parte; & (2) a cartilaginibus costarum, quintae & sextae (α), unde semper descendit fasciculus unus, uel duo, fibrarum carnearum supra membranam, quae obliquum (§. 1.) integit, descripti accurate apud R: COLVMBVM L. V. C. XVI. (3) a tota fere ossis *pectoris* longitudine, tendinibus per multis, breuibus, eleganter decusantibus illos alterius lateris.

Origo.

EVST.

T. 35. 28.

II. Inferitur duobus fortibus crassisque tendinibus, sese mutuo interfecantibus, superiori ac interiori parti ossis *humeri*, inter *deltoidem* atque *bicipitem* (3).

Inferio.

EVST.

l. c.

III. Leuat humerum.

Actio.

A superiore eius tendine nascitur *innolu-*
G 5
crum,

(a) Fibræ eius summæ descendunt, per obliquum: mediae feruntur per transuersum: imæ autem adscendunt obliquæ.

(α) ALBIN. §. 137.

(3) ALBIN. §. 272.

crum, siue, ligamentum tendineum, colligans capita bicipitis.

Quum in cane fibrae illius musculi, triplici, uarioque modo, decurrant; in tres quoque potest diuidi musculos.

Horum largissimus principium habet acutum, carneum, a cartilagine ensiformi, & ab omni fere osse pectoris; finem uero, ope brevis robustique tendinis, in tuberculum capitis ossis humeri; ope membranacei, in idem os, longe inferius.

Secundus, prioris exteriori lateri adcumbens, oritur prope extremitatem cartilaginis ensiformis, inde adscendens, inseritur partim eodem cum praecedente modo; partim supra musculos, in interiorem humeri parte positos, descendit.

Tertius, a situ TRANSVERSALIS dicendus, oritur a superiore pectoris parte, tumque, supra primum per transversum latus, inseritur, uasto ualentique tendine, infra illum, parti anteriori ossis humeri extrinsecus, per omnem illius longitudinem.

§. 154. DELTOIDES. (b).

Origo.
1. EVST.
T. 18. 35.
(2. 3.)
EVST.
T. 29.

I. Oritur, carneus, a tota postica externa-que claviculae parte, a pectorale (§. 153.) libera: (2) cum tendineus, tum carneus, ab inferiore margine partis anterioris spinæ scapulae, & (3) totus tendineus, a postica eiusdem.

Inserio.
EVST.
l. c.

II. Inseritur, tendineus & carneus, protuberantiae, quae in parte antica humeri, circa

† (b) Hic, ut & prior (§. 153.), facillime in plures diuidi possunt musculos.

ca huius medium (α). Fibrae apicis eiusdem confunduntur cum brachiae interni parte aliqua.

III. Humerum adtollit recta: idque uel *Actio*. paullulum antrorsum, uel paullulum retrorsum, nam & diuersus fibrarum decursus.

In cane originem habet tendineo-membranosam ab omni fere scapulae spina (κ). Pars eius, a summo humero proueniens, distincta quidem uidetur ab altera origine, non tamen, sine ui, ab inuicem, separari queunt. Adtollit, extrorsumque mouet solum: non autem introrsum; nam non nascitur a clauicula, quippe quam non habet canis.

§. 155. SVPRASPINATVS.

I. Oritur, carneus, a tota basi scapulae, *Origo*. quae supra huius spinam (α): ut & a spina *EVST.* eius (β), & superiore costa. (γ). *T. 37.*

II. Inseritur, tendineus, parti tuberculi, *Insertio*. quod in osfis humeri capite, sinui bicipitis uicinum. (δ) *EVST.* *T. 39.*

III. Eleuat humerum. *Actio.*

§. 156. INFRASPINATVS.

I. Oritur, carneus, a tota illa parte baseos *Origo*. scapulae, quae inter eius spinam, inferiorem- *EVST.* que angulum interiacet, a spina usque ad *T. 37. & 38.* *38.* *ceruicem* eius, & denique a latere totius illius *fossae*, quae supra inferiorem eius costam. (α)

II.

(α) ALBIN. §. 272.

(κ) VESAL. L. I. C. XXI. F. III. C. D.

(α) ALBIN. §. 257. 7.

(β) Idem §. 259. 1.

(γ) Idem §. 257. 4.

(δ) ALBIN. §. 272. 2.

(*) ALBIN. §. 257.

Insertio.
EVST.
l. c.

II. Inferitur, crasso paruoque tendine, in superiorem partem protuberantiae asperae planaeque, quae in capite *osfis humeri*. (β).

Actio.

III. Humerum mouet recta retrorsum.

In cane, per mediam musculi huius longitudinem, procedit tendo, a quo, in quouis latere, secedunt fibrillae carneaе, plumae itaminibus haud dissimiles.

EVST.
l. c.

§. 157. Ad internum musculi huius (§. 156.), latus adparent duo, uel tres, largi tendines, per longitudinem carneaе substantiae decurrentes.

Membrana tendinea tegit tam hunc, quam praecedentem (§. 155.); neque solum robur illis addit, sed & impedit, ne extrorsum intumescant nimis.

§. 158. TERES MINOR,

Origo.
EVST.
T. 37.

I. Oritur, carneus, a toto rotundo margine inferioris *costae scapulae* (α); semper, quoties secui, ab *infraspinato* (§. 156.) ope insignis membranae, distinctus.

Insertio.
EVST.

II. Inferitur, tendineus, paullulum infra insertionem praecedentis (§. 156. III.), & carneus, aliquantum infra caput *osfis humeri*.

l. c.

III. Retrorsum ducendo humerum, iuuat sequentem.

Actio.

In cane oritur, tendine tenui, firmiter cohaerente cum infraspinato (§. 156.), a medio lateris inferioris scapulae, unde in teretem uentrem degenerans, uadit obliquus, supra longi caput, ad insertionem suam tendineam.

§. 159. TERES MAIOR.

I. Ori-

(β) ALBIN. §. 272. 1.

(α) ALBIN. §. 257. 5.

I. Oritur, carneus, ab inferiori angulo *scapulae* (α), & ab inferioris *costae* illius parte, omnium asperissima crassissimaque. Fibrae illius carnea continuantur supra *infraspinati* (§. 156.) partem, cui firmiter adhaerent. Origo.
EVST.
T. 37. in
sinistro.
T. 36.

II. Inferitur, tenui, paruo, latoque tendine, asperitati, quae mox sub capite *osfis humeri* intrinsecus. (β). Arcissime unitur tendini *latisissimi dorsi*, ita tamen, ut sese deserant ante, quam illi osfi inferantur. Insertio.
EVST.
l. c.
VES. T.
T. 30.

III. Humerum retrorsum deorsumque mouet. Actio.

§. 160. LATISSIMVS DORSI.

I. Oritur (1) tendine tenui, a posteriore parte *spinae ilium* (α); a spinis supremis *osfis sacri* (β), *uertebularum lumborum* omnibus (γ), septemque, uel octo inferiorum dorsi (δ), infra *rhomboidem* (§. 117.); (2) tendineus & carneus, ab extremitatibus quatuor uel quinque imarum costarum ossearum, prope illarum cartilagineas. Origo.
1. EVST.
T. 29. 34.

Vidi quandoque exiguum carnearum fibrarum fasciculum, oriundum ab externo *baseos scapulae* latere (α); prope eius inferiorem angulum (β), qui, adhaerens huius musculi superiori parti in progressu suo, per longitudinem *costae inferioris scapulae* (γ), euanescebat

(α) ALBIN. §. 257. 6.

(β) ALBIN. §. 272. 1.

(α) ALBIN. §. 191. 6.

(β) ALBIN. §. 143. 2.

(γ) Idem §. 131.

(δ) Idem §. 132. 1-5.

(α) ALBIN. §. 257. 3.

(β) Idem §. eod. 6.

(γ) VES. L. I. C. XXI. F. II. VV.

bat in ipsum, adcurate, ubi tendinescere incipit. Facile crediderim, illum adesse in omni corpore, quamquam eum nunquam, ante impressum hunc libellum, obseruarim. Connectitur quoque per membranas, *tereti* (§. 159.) & *rhomboidi* (§. 117.)

II. Inferitur, tendine tenui ualentique, supra marginem finus, qui pro *bicipite*, ad finem *pectoralis* (§. 153. II.)

Insertio. III. Idem efficit, quod *teres* (§. 159. III.)

EVST.

T. 33. in dextro: &

T. 34.

Actio.

Vbi in cane, musculus hicce peruenit ad teretem (§. 159), abit in elongationem tenuem, carneam, quae, supra longum cubiti descendens, finit tendinea in αλεκρων. Paullulum, ante terminationem suam; recipit membranam carnosam, quae est tenuis, musculosa, expansio, musculos, incumbentes superiori parti ossis femoris, ossibus, ilium & sacro; abdomini, dorso, maioriq[ue] thoracis parti, integens. Prope axillam fit angustior, sed crassior, confluitque cum hoc musculo, mox inferendo. Contractus panniculus hicce corrugat cutem; dorsique pilos erigit, quoties animal hoc irascitur, uel timet.

§. 161. CORACO-BRACHIALIS: (c)

Origo.

EVST.

T. 33.

I. Oritur, partim tendineus, partim carneus, ab inferiore latere *processus coracoidis scapulae*, ad huius mucronem. (α). Inter descendendum, cohaeret uni *bicipitis* capiti.

II.

(c) Vidi *Leidae*, demonstratore ALBINO, alium adhuc *coracobrachialem*, sed paruum, qui, ab eodem natus processu, ossi *umeri* inferebatur, infra eius caput. VESALIUS uero alterum *coracobrachialem bicipitis* partem habuit, quia cum huius capite breui, in adultis conrescit.

(α) ALBIN. §. 260. 5.

II. Inferitur, tendineo-carneus, circa medium internae partis *osfis humeri*, demittitque tenuem expansionem tendineam ad internum huius osfi *condylum*. (β). *Insertio.*
EVST.
l. c.

III. Eleuat humerum.

Per hunc musculum transit magnus quartus paris neruorum *cervicis* ramus, faciens primum *brachiale* par. *Actio.*
EVST.
T. 19. u.
trimque.

In cane est paruius, tenuis, musculus, oriundus, tendine oblongo, a protuberantia, quae in superiore parte superioris costae scapulae, qui, postquam humeri caput superauit, fit carneus, talisque terminatur in internum eiusdem osfis latus, infra ceruicem eius, ad pollicis, uel maiorem adhuc, distantiam.

§. 162. SVBSCAPVLARIS.

I. Oritur (1) carneus, a tota basi *scapulae* (α); ab omni eius superiore *costa* (β), & dimidia circiter inferiore (γ): (2), tendine duplici, a duobus tuberculis, in parte osfis illius *concaua*, prope basim, sitis, adque duos uel tres pollices ab inuicem distantibus. (δ). *Origo.*
EVST.
T. 33. 38.
BIDL.
T. 65. E.
Hi tendines pergunt per carneam huius musculi partem ad insertionem suam, ubi supra articulum procedunt, in plures alios diuisi.

II. Inferitur, tendineus, in latus superius *eminientiae*, quae in capite *osfis humeri*, a latere: (ε). *Insertio.*
EVST.
T. 38.

III.

(β) ALBIN. §. 272. 6.

(α) ALBIN. §. 257. 3.

(γ) ALBIN. §. 257. 4.

(2) VESAL. L. I. C. XXI. F. I. Pp.

(δ) VESAL. l. c: MMM.

(ε) ALBIN. §. 272. 2.

Adio.

III. Humerum adprimit costis. (d).

Tendines huius musculi, ut & *infra- & supraspinati* (§. 155. 156. III.) firmiter connectuntur cum membrana, ambiente articulationem humeri cum scapula; facillime uero ab inuicem separari possunt, absque fibrarum tendinearum laesione quadam (e).

In cane tres tantum partes concavae scapulae occupat hic musculus: reliquas uero eius serratus (§. 118.).

§. 163. *Restant adhuc duo musculi describendi; quos praeterea canis habet. Prior uocetur*

LEVATOR HVMERI PROPRIUS.

Oritur, membranofus & carneus, a toto spatio, quod inter terminationem tendineam mastoidaei (§. 84.) & spinam occipitis interponitur; & a suprema parte ligamenti colli, Tum longa haec origo contrahitur, & per collum oblique descendens, arcte adhaeret alicui parti leuatoris scapulae maioris (§. 116.), transscendensque articulationem humeri, recta deorsum it, donec inferatur parti anticae eiusdem ossis, prope flexuram cubiti, inter bicipitem atque brachiaenum internum medius. Posterior

MVSCVLVS, AD LEVATOREM ADCESSORIVS. Oritur ab osse occipitis, ad insertionem crassi tendinis mastoidaei (§. 84.), & recipiens crassum, carneum, musculum, descendit, ut inferatur leuatori proprio, ubi cum
hoc

(d) Hic, cum *terete* (§. 158. III.), mouet tam uarie humerum in iis, qui tympana pulsant.

(e) Retrahunt ergo illi musculi hanc capsulam, ne corrugata, ubi humerus mouetur, illius motui obstat.

hoc eiusdem est latitudinis. Præcise supra caput osfis humeri, ad musculi huius finem, uidetur osficulum, cartilagineum, falcatum, duobus paruis ligamentis ad scapulam, osfis-que pectoris mucronem adligatum, quod imperfecta uidetur clauicula.

In felibus musculus hicce inseritur toti clauiculæ longitudini: quam & eleuat. Adcesorius uero memoratus musculus, qui & felibus contingit, leuatori succurrere uidetur, ut os humeri adtollat, eodemque illud tempore paululum extorsum uertat: sicque caueat, ne pedes anteriores, inter currendum, uel saliendum, complicantur:

CAPUT XXXI.

MVSCVLI CVBITI.

§. 164. **C**ubitus, hoc est, id omne, quod inter extremitatem *osfis humeri* & initium carpi interiacet, duobus constans osfibus, *ulna & radio*; quinque adcepit musculos.

§. 165. BICEPS INTERNVS. (a).

I; Caput eius alterum, idque exterius, *Origo*, oritur, tendineum, a *cervice scapulae* (α), ad *EVST.* superius angustumque latus cavitatis, quae *T. 32. 35.* acetabulum: ubi descendit, includitur, ope ligamenti membranosi, a *pectorale* (§. 153.)

H pro-

(a) VESAL: eum dixit *flectentium cubitum anterior-*
rem.

(α) ALBIN. §. 258. 1.

prouenientis sinui, qui in capite *osfis humeri* (β). Alterum, uel interius, uenit, tendineum ac carneum, a *processu scapulae coracoide* (γ). Post, paullulum infra medium partis anterioris humeri, capita haecce duo coeunt in unum.

Infertio.
EVST.
I c:

II. Inferitur, tendine forti ac crasso, omni *tuberculo*, quod in *suprema radii extremitate*, intrinsecus. (δ).

Actio.

III. *Flectit cubitum* (b).

Vbi tendinescere incipit, hoc est, circa *flexuram cubiti*, demittit *απονευρωσιν*, primum detectam a Clarissimo Anatomico, COVPER *Myotem: reform: p: 147.*, integentem musculos omnes, qui in interiore *cubiti* parte. Fibrae eius decussant fibras membranae alterius tendineae subiectae.

In cane tantum unum ipsi caput, a ceruice scapulae prodiens: quare, incumbens quippe sequenti musculo, mihi adpellatur FLECTENS CVBITVM ANTERIOR.

§. 166. BRACHIALIS INTERNVS.
(c).

Origo.
EVST.
T. 38. 33.

I. Oritur, carneus, a medio *osfis humeri*, ad utrumque insertionis *deltoidis* (§. 154. III.) *latus*, implens omne inter istius ossis duo latera interuallum.

II.

(β) ALBIN. §. 272. 3.

(γ) *Idem* §. 260.

(δ) ALBIN. §. 281. 2.

(b) *Supinat & radium, ac maiori quidem ui, quam supinatores eius. Id primus intellexit VVINSL: in Actis Parisi:*

(c) Hic VESALIO uocatur *flectentium cubitum posterior.*

II. Inferitur, tendine forti, parti superiori *Inferitio.*
ac anteriori *ulnae.* EVST.

III. Iuuat descriptum (§. 165. III.). l: c: *Actio.*

In cane oritur, largus & carneus, a parte posteriore humeri, sub eius capite: inde uadit oblique ad osis illius anteriorem partem, pergitque, ut in homine.

§. 167. BICEPS EXTERNVS.

I. Caput prius, quod LONGVS muscu- *Origo.*
lus aliorum, oritur, largo tendine, a *costa* EVST.
scapulae inferiore (α); paullulumque carneum T. 29. &
ab eius ceruice (β). Posterior, quod BRE- T. 36. in
VIS aliis, habet originem acutam, tendineam, sinistro.
ut & carneam, ab *osse humeri*, ad pollicis circi-
ter distantiam, infra eius caput. Ambo in
postica *humeri* parte confluunt, cum sequen-
te musculo, in unum.

II. Inferitur superiori, exteriorique *ulnae* *Inferitio.*
procesui, qui *ωλεζερων.* EVST.

III. Extendit *cubitum.* l: c: *Actio.*

§. 168. BRACHIALIS EXTERNVS.

I. Oritur, acute carneus, ab *osse humeri*, *Origo.*
aliquantum supra insertionem *teretis* (§. 159.
II.). Circa humeri medium, procedit, sub
longo (§. 167. I.), quocum, ad exteriorem
ilius osis eminentiam confunditur (α), per-
gitque, sub illo, ad eiusdem lateris *condylum*,
ubi, cum *angonaeo*, sic confluit, ut separari
ab inuicem nequeant. Reliqua eius pars eam- EVST.
dem cum *bicipite* (§. 167. II.) habet termi- T. 39.
nationem.

H 2

§. 169

(α) ALBIN. §. 257. 5.

(β) ALBIN. §. 258. 1.

(α) ALBIN. §. 272. 5-

§. 169. *Biceps*, *brachialisque* (a), (§. 167. 168.) unum tantum constituunt musculum, tribus praeditum capitibus; quem nominabo **TRICIPITEM CVBITI**, *sive*, **EXTENSOREM CVBITI MAGNUM**, **TRIPlici PRINCIPIO NATVM**.

§. 170. **ANCONAEVS**, *sive*, **CVBITALIS RIOLA**:

Origo.

I. Oritur, terete paruoque tendine, a postica exterioris *condyli ossis humeri* (a). Inde carnescit illico, sicque intricatur cum *brachiali* (§. 168.), ut, absque violentia, separari omnino non possint.

Insertio.

II. Inferitur, carneus ac tenuis, parti laterali *ulnae*, ad paucorum pollicum distantiam infra *ωλεκράνον*.

Actio.

III. Confert ad extendendum *cubitum*.

§. 171. In *cane*, in *extensionem cubiti*, uel *ulnae*, conspirant quinque, uere distincti, musculi:

EXTENSOR PRIMVS, seu, **LONGVS**, ortus, ut in *homine* (§. 167. I.), largescit in *crasum uentrem*, post autem, sensim contractus, fit *tendineus*, & inferitur parti superiori exteriorique *processus ulnae*, qui in *humano corpore* *ωλεκράνον*.

EXTENSOR SECVNDVS, uel, **BREVIS** oritur a superiore & postica *humeri parte*, praecise sub *plano eius capite*, qui, descendens sub *longo*, abit in *paruum tendinem*, transcurrentem per *fulcum in ulnae extremitate*, ac insertum, paullulum infra *longum*.

EX-

(a) Haec post COVPPER p: 151. unanimis est omnium adcuratorum Anatomicorum sententia.

(a) ALBIN. §. 272. 5.

MVSCVLI PALMAE MANVS. 117

EXTENSOR TERTIVS, ex parte respondens brachiaeo (§. 168.); est sat crassus, carneus musculus, oriundus a superiore & posteriore humeri parte, ad eminentiam, prope insertionem teretis (§. 158. III.), & insertus externo processus ωλενηςανον lateri.

EXTENSOR QVARTVS, siue, **ANCONAEVS**, cui origo ac insertio eadem, quae in homine (§. 170.), replet cavitatem, quae inter radii ulnaeque capita.

EXTENSOR QVINTVS oritur, tendine tenui, ab interiori latere illius eminentiae scapulae, in quam terminatur supraspinatus (§. 155. III.), inde procedens sub teretis (§. 159. III.) tendine, fit carneus, tendineusque inseritur interiori lateri processus, quem ωλενηςανον nominauere.

C A P V T XXXII.

MVSCVLI PALMAE MANVS.

§. 172. **P**alma, uel, uola manus, duos sibi habet musculos.

§. 173. **PALMARIS LONGVS.**

I. Oritur, tendineus, ab interna osfis humeri eminentia (α): mox fit carneus, post paucorum pollicum distantiam uero rursus tendineus futurus. Circum annulare carpi ligamentum expanditur in amplum, diuergentemque tendinem, (qui & filamenta quaedam dicto ligamento, abduçtori pollicis, huiusque pri-

Orig.
EVST.
T. 35.

EVST.
T. 28.
T. 30.

H 3

mi

(α) ALBIN. §. 272. 6.

118 MVSCVLI PALMAE MANVS.

mi internodii *flexori* impertit,) quem inter & cutem multa pinguedinis copia interposita. Nonnumquam musculus hic ortum suum ducit ab *annulari ligamento* (a). Ad extremitatem inferiorem osium *metacarpi* plurimae; oblongae, tendineae fibrae, supra illum, ab uno latere ad alterum euntes, sese decussant inuicem.

Infertio.
EVST.
l: c.

II. Inferitur, tendine exiguo, duplici, lateribus cartilaginis, quae inuestit articulum cuiusvis digiti cum *ossibus metacarpi*.

Actio.

III. Contrahit palmam manus, sicque iuuat rem quamdam firmiter prensare. (b).

§. 174. PALMARIS BREVIS CAN-
NAN; uel, CARO QUADRATA (c).

Origo.
EVST.
T. 35. 32.

I. Oritur, tendine, membranae simili, a superiore exterioreque parte *ossis metacarpi* *minimi digiti* (d); inde adscendit obliquus, adhaerensque quarto osi *carpi*, incumbenti tertio, fit carneus, duobus, uel tribus locis, separatus mediis membranis; proceditque sub priore (§. 173.).

Infertio.
EVST.
l: c:

II. Inferitur tendineus *ligamento annulari* & osi *carpi*, commisso cum pollice. (e).

Pars tendinis suprema cohaeret cum *ab-*
duc-

(a) Confirmat MORGAG. *Adu.* II. p. 39.

(b) Subiecta defendit. Dum enim firmissime aliquidprehendimus, unde certa subditorum illi tendini laesio, pars musculoſa illum tendit: ut sic irriti fiant reagentium corporum impetus. Contingit aliquando, illum in eiusdem subiecto uno latere abesse, & in altero tamen adesse. Duos in una manu uidit *Auctor.* Vid. *praefatio eius.*

(c) Sic uocatur SPIGEL: L: V. C: XXXV.

(d) Veram hancce originem primus notauit COV-
PER p: 154.

(e) *Ossi multangulo maiori.*

ductore pollicis, inferior autem cum flexore secundi internodii eiusdem.

III. *Palmam manus concavam reddit, Abia.* fingitque DIOGENIS supellectilem, *pal-* mam pollicis ducendo uersus os metacarpi minimi digiti.

Et hocce musculo destituitur canis.

CAPVT XXXIII.

MVSCVLI CARPI.

§. 175. **C**arpo, octo constanti ossiculis, inter extremitatem *cubiti*, superioremque osium *metacarpi* partem, sitis, quatuor prospiciunt musculi; omnes tamen, notante VESLING, ossibus metacarpi inferuntur.

§. 176. FLEXOR CARPI RADIALIS.

I. Oritur, & tendineus, & carneus, ab *Origo.* interna *ossis humeri* eminentia (a), & a margi- *Inferio.* ne aspero totius anterioris processus *ulnae*, ubi *EVST.* firmiter cohaeret cum *pronatore radii terete.* T. 30. 35.

II. Inuolutus membranae, procedenti a *Inferio.* tendinibus ceterorum musculorum, quibus *EVST.* cum progreditur sub *annulari ligamento*, fer- T. 35. tur per *sinum*, qui in ossiculo carpi, articulationis ope, commisso cum pollice (a), & in

H 4

in-

(a) ALBIN. §. 272. 6.

(a) Nempe in osse *multangulo maiori*. Vid: ALBIN. §. 314. 4. Deducitur idem tendo quoque per *processum ossis cuneiformis*. Vid: ibidem.

inferitur, plano tendine, parti anteriori ac superiori *osfis metacarpi indicis*.

Actio. III. Carpum flectit una cum manu; ubi uero cum *radiali extensore* simul egerit, carpum mouet in latus, *radium* uersus.

§. 177. FLEXOR CARPI VLNARIS.

Origo. I. Oritur, tendineus, ab eodem humeri
EVST. tuberculo, ut prior (§. 176. I.); ut & car-
 T. 35. 37. neus, compactus, a latere processus *ωλεκρα-
 18*, quem inter & originem priorem, procedit magnus *bracchialium* neruorum *ramus*, *ulna-
 EVST.* ris adpellatus, ad cubitum. Vbi, secundum
 T. 19. *ulnae* longitudinem, descendit, tegitur ex-
 pansione tendinea, ut ceteri muscoli omnes, in exteriori *cubiti* parte conspicua, quae & per hunc solum musculum externo illius *osfis lateri* adhaerere uidetur.

Insertio. II. Inferitur, tendine breui fortique, in
EVST. quartum *os primi ordinis carpi*, tertio incumbens (b). In quadam ab hac *insertione* distantia transit *ligamentum* ab illo *osficulo* ad *os metacarpi minimi digiti*, quod nonnulli *continuatum* musculi huius tendinem habent.

Actio. III. Iuuat praecedentem, (§. 176. III.), flectendo *carpum*.

In cane duos distinctos constituit musculos; quorum maior oritur tendineus a tuberculo interno humeri, non procul a margine sinus, *ulnam* recipientis, & inferitur *osfi carpi*, extra ordinem prominenti. Minor autem nascitur tenuis, carneus, a processu, qui *ωλεκράνον*, ad pollicis circiter interuallum per interius *ulnae* latus; in-

(b) Vid. ALBIN. l: cit. Nonnunquam uero dat tendinem ad annulare ligamentum.

inferiturque eidem osfi, cui prior, in quadam tamen ab illo distantia.

§. 178. EXTENSOR CARPI RADIALIS.

I. Hic duos, distinctos, constituit musculos: alter, qui LONGVS mihi, uel SVPERIOR, oritur amplus, tenuis, carneusque, inter *condylum & supinatore* radii longum medius, ab inferiore parte externae eminentiae *osfis humeri* (α). Alter, qui INFERIOR, siue, BREVIS, uenit, tendineo-carneus, ex eadem protuberantia, ut prior. Vterque in externo radii latere ponitur: posterior autem descendit magis, quam prior.

II. Longus inferitur, superiori parti *osfis metacarpi* indicis: brevis autem illi, sustineti medium digitum. Vtriusque uero insertio est tendinea.

III. Extendit carpum, manumque retro mouet.

In cane sat proprie BICORNIS dici potest; nam & origines eius non, nisi ingenti ui, ab inuicem separaueris.

§. 179. EXTENSOR CARPI ULNARIS.

I. Oritur, tendineus, inter *anconaeum* (§. 170.) (c), & *extensorem digitorum communem*, ab exteriori eminentia *osfis humeri* (α): ut & carneus a superiori *cubiti* parte, a latere. Inde, descendens secundum istius osfis longitu-

H 5

di-

(α) ALBIN. §. 272. 5.

(c) *Anconaeum* hinc multi habuere musculi huius partem: communi enim inuoluuntur membrana.

(α) ALBIN. §. 272. 5.

dinem, teres illius tendo continetur in sinu, qui in ulnae extremitate (β), unde ad insertio-
nem suam transit per ligamentum, ut uaginam.

Insertio.
EVST.
l: c:
Alia.

II. Inferitur, tendineus, superiori parti
osfis metacarpi, fulcientis minimum digitum.

III. Idem eius est usus, qui praecedentis
(§. 178. III.)

Huncce musculum uestit expansio ten-
dinea, deorsum continuata a quibusdam *ex-*
tensorum cubiti tendinibus: haec etenim *a-*
πνευγμωσις eleganter expanditur supra mus-
culos quosque, in exteriori anterioris hu-
meri latere sitos, aequae, ac illa *bicipitis* (§.
165.) illos interioris lateris integit.

Quoties musculus hicce cum *flexore* (§. 177.)
contrahitur: toties carpum, cum manu, in
latus mouet, *ulnam* uersus.

In cane tendinem dat ad os carpi, alteri inni-
tens; sicque, ubi extendit, carpum paullulum
extrorsum ducit: qui sane insignis usus est cur-
renti illi animali.

(β) ALBIN. §. 281. 3.

C A P V T XXXIII.

MVSCVLI QVATVOR DIGITORVM MANVS.

§. 180. **M**usculos quatuor digitorum dis-
cerno in communes & pro-
prios. Illorum, qui ad omnes quatuor digi-
tos pertinent, recensentur tredecim; scilicet:
extensor unus, duo *flexores*, quatuor *lumbric-*
ales; & sex *interossei*.

§. 181.

§. 181. PERFORATIVS. (a)

I. Oritur, (1) tendineo-carneus, ab *int. Orig.*
riori osfis humeri condylo (a): (2) *tendineus*, *EVST.*
 ab *antere* processu *ulnae*, prope marginem *T: 38.*
sinus lunati: & (3) tendineo-membranosus,
 circa medium anterioris partis *radii*. Haecque
 origo se extendit fere a *flexoris pollicis magni*
 ortu usque ad tres, uel, quatuor pollices sub
 illo osse. Prius autem, quam per carpi ligamen-
 tum progrediatur, in quatuor abit tendines. *BIDL.*
T. 67.
CCCC.

II. Qui inseruntur superiori parti osfis secun-
di cuiusque digiti, quorum qui ad minimum di-
 gitum transit, ceteris multo minor. In uola ma-
 nus omnes communicant inter se, continentur-
 que ad priores maiores tendines per molles, uis-
 cosas membranas. Circa primum digiti cu- *BIDL.*
 iusuis internodium iam omnis tendo adparet *l: c:*
 fissus, pro singulo *perforantis* tendine trans-
 mittendo: post rursus uniuntur, ibique ten-
 dinea filamenta utriusque lateris se eleganter
 decusant. Inde rursus diuisi, prout recte
 docuit COVPER p. 156., procedunt ali- *BIDL.*
 quantisper supra ossum latera, donec illo- *l: c:*
 rum superiori parti inferantur; ut semper in-
 ueni.

III. Flectit secundum digitorum interno- *Adie.*
 dium.

In cane musculi huius tendines pro perforantis
tendinibus fissi non sunt, sed formant teretem
capsulam, quae, primo internodio par longitudine,
illos tendines in omni suo itinere integit. In
exteriore eius latere adparet exiguus sinus oualis
fi-

(a) Aliis uocatur *sublimis*.

(*) ALBIN. §. 272. 6.

124 MVSCVLI QVATVOR DIGIT:

figurae. Neque subdividuntur illi tendines.

§. 182. PERFORANS. (b)

Origo.
EVST.
T. 32.
in dextro
& T. 33.

I. Oritur, carneus, (1) a tota superiore *ulnae* parte lateraliter, quae origo eius deorsum pergit ab externa eius *spina* usque ad eius medium: (2) ab eiusdem ossis interiori ac anteriori latere: & (3) a dimidio *ligamento*, *ulnam* connectente *radio*.

Pars musculi crassior, superior ac carnea arcte includitur *tendinosae fasciae*, uestienti musculos, in externa cubiti parte sitos (§. 179.)

Insertio.
BIDL.
l: c:
HHHH.
IIII.

II. Paulo ante, quam sub transverso *carpi* ligamento progrediatur, in quatuor finditur tendines, permeantes fissuras, quae in praecedentis (§. 181. II.) tendinibus, continuatos usque ad insertiones suas in tertium os omnium quatuor digitorum. (c).

Actio.

III. Flectit ultimum digitorum intermedium.

In cane tria, distincta, carnea habet principia: extimum nempe a suprema mediaque radii parte: intimum a summa ulnae, quod descendit per maxumam eius lateris partem. Ambobus haec capita sunt ualde exigua. Tertium uero latum, magnique uentris musculum constituit, in duos, uel tres, ut uidetur, diuisum, ac oriundum, ab interiore ossis humeri eminentia. Enarrata haec tria principia tandem confluunt, unumque crassum latumque tendinem formant, mox in quinque minores fissum;

(b) Aliis *profundus* adpellatur.

(c) Et quidem in *eminentiam* asperam, quae in illius ossis media, ac interiore parte. ALBIN. l: c: §. 332.

sum; quorum quatuor finiunt, ut in homine: quintus uero terminatur in pollicem.

§. 183. LUMBRICALES.

I. Quatuor hi muscoli oriuntur tenues & ^{Origo.} EVST. T. 32. carnei ab exteriori tendinum *flexoris* (§. 182. II.) latere (c), paullulum infra *transuersale ligamentum*; cui, ubi descendunt, adhaerent aliquantum; ubi uero ab illo secedunt, fiunt teretes & satis ampli.

II. Inferuntur in largos *interosseorum* tendines, circa medium primi *internodii*, quod ^{Inferio.} EVST. l. c. spectat pollicem, a latere, tendinibus *prae-* longis, qui feruntur supra cartilagineum, transuersumque ligamentum, incrustans articulationes digitorum primorum ossium cum *metacarpo*.

III. Hos dicunt concurrere ad flectendum ^{Actio.} primum digitorum internodium. (d).

§. 184. EXTENSOR DIGITORVM COMMVNIS.

I. Oritur, acuto tendine, ab exteriori ^{Origo.} protuberantia *ossis humeri*, inter *carpi exten-* EVST. T. 29. *sores* (§. 178. 179.) medius, firmissime ad *nexus radii supinatori breui*. Ante, quam per *carpi ligamentum* transeat, in quatuor, planos, ^{EVST.} T. 28, tendines finditur, quorum quisque adhuc in plures minores diuidi potest. Et praecipue quidem circa ossium *metacarpi* extremitates communicant omnes, emissis filamentis *tendineis*.

(c) Suspiciatur COVVP. p. 160., illos procedere communi cum *perforante* (§. 182. II.) origine, qui post cum illius tendinibus coeant, rursusque secedant.

(d) Extensores illos perperam putauit FALLOP. Musculi dicuntur *fidicinales*, quia minutos illos motus, in Musica necessario perficiundos, efficiunt.

126 MVSCVLI QVATVOR DIGIT:

dineis. Vnum uero tendinem transmittit ad minimum digitum, praeter huius extensorem proprium.

Inserlio.
EVST.
l: c.

Tendines illi inseruntur in supremam partem ossis secundi cuiusuis minoris digiti: tumque per illum tractum primo ibi adhaerent internodio. (e).

Actio.

III. Extendit primum ac secundum digitorum internodium.

In cane decurrit, inter duo ligamenta, ab secundo internodio ad tertium euntia, medius, ad ultimum os cuiusuis digiti. Haecce ligamenta ultimum internodium retrahunt, eleuant ac suspensum tenent, ne tendo extensor semper nimis extendatur; uti alibi hoc explicabitur fusius.

9. 185. INTEROSSEI. (f)

Origo.

I. Recte diuiduntur in *externos* & *internos*. Illi replent omne spatium, quod *metacarpi* ossa in dorso manus relinquunt. Hi, qui, proprie dicendo, *interosseorum* nomen haud merentur, in *uola* tantum manus, minime uero in *dorso* illius, conspici, oriuntur ab anteriori parte ossium *metacarpi*, palmam manus respicientium. Externi uero utrobique adparent.

Origo.
EVST.
T. 38.

Musculus *interosseus* primus oritur tendineus & carneus a tota anteriore parte ossis *metacarpi indicis*, inter caput eius ac *condylum* medius: ut & a superiore parte ossis *metacarpi medii* digiti. Hicce, *internorum* primus, ad

(e) Integunt digitorum dorso, lata *anastomosis*: prout ubique habet EVST.

(f) Hosce primus uere descripsit HABICOT dans la *semaine anatomique*, lectione XII. p: 260-263.

ad illud indicis latus pertinet, quod medium digitum respicit.

Secundus, qui *externorum* primus, oritur a *Origo.*
maxima parte exterioris lateris *osfis metacar-* *EVST.*
pi medii digiti; & aliquantum tendineus ab *T. 39.*
antica eius, sub eius capite. Hic tam in vo-
la, quam in dorso manus uideri potest, de-
currens iuxta longitudinem illius lateris digiti
medii, quod *indici* uicinum.

Tertius, hoc est, *externorum* alter, ad al- *Origo.*
terum medii digiti latus, iuxta eius longitu- *EVST.*
dinem, positus, occupat omne spatium, quod *l: c: &*
inter ossa *metacarpi* dicti digiti, ut & annu- *T. 38.*
laris, reliquum. Iam ab utroque hocce osse
prodit, ut & a parte quadam illius osfis la-
teraliter; in palma manus similiter optume
conspiciendus.

Quartus, qui *internorum* secundus, in la- *Origo.*
tere digiti annularis, medio proximo, oritur *EVST.*
a tota anteriore parte osfis *metacarpi*, cui an- *T. 38.*
nularis innititur. infra eius caput.

Quintus, qui *externorum* tertius, per o- *Origo.*
mnem alterius lateris dicti digiti longitudinem *EVST.*
decurrens, implet, in dorso manus, omne *l: c: &*
interuallum, quod inter digiti dicti & mini- *T. 39.*
mi ossa *metacarpi* adparet: & ab illis osfibus
exoritur.

Sextus, seu, *internorum* tertius, ad latus *Origo.*
minimi digiti, annularem respiciens, per o- *EVST.*
mnem longitudinem situs, oritur tendineus ac *T. 39.*
carneus ab anteriori latere totius osfis *metacar-*
pi minimi digiti.

Omnes hi utriusque generis muscoli pro-
cedant sub *ligamento cartilagineo* (§. 183. II.),
&

128 MVSCVLI QVATVOR DIGIT:

& quisque uenter abit in duos tendines.

Inferio.

II. Tendo unus mox inferitur parti superiori primi *internodii* a latere: alter dilatatur amplius, multumque tegit, tendini *extensoris* (§. 184. II.) connexus, *internodium* primum: tum, ubi ad superiorem secundi *internodii* partem, ubi *extensor* (§. cit.) finit, adpellit, fertur oblique secundum longitudinem illius ossis, donec superiori parti ultimi *internodii* illius digiti inseratur. Ante tamen cum pari suo alterius lateris confluit.

Actio.

III. Longi tendines contracti, extendunt *internodium* ultimum; sicque, in quo *extensor* magnus defecit, supplent. Breues uero in latus mouent digitos, hoc est, digitos uel adducunt ad inuicem, uel a pollice remouent.

In cane deprehendo sex musculos, descriptis quodammodo respondentes: quorum quatuor ingentes sunt, non inter ossa metacarpi, sed in concava eorum positi, deorsumque recta lati: reliqui uero sunt exigui, obliqui.

Magni oriuntur, *tendinei* & *carnei*, a superiore parte ossium metacarpi, cui quoque per omnem descensum suum cohaerent. Ad primi *internodii* os sesaminum quisque abit in duos tendines, qui, oblique lati per latera digitorum, uniuntur, non separandi, tendini *extensoris* (§. 184.), prope inferiorem partem ossis primi cuiusuis anterioris digiti.

Paruorum alter ad indicem pertinet, qui, oriundus a superiore parte ossis metacarpi medii digiti, descendensque obliquus, tendinescit, circa *internodium* primum, inseriturque illi ossi,

fi, circa medium, lateraliter, intrinsecus.

Alter oritur ab osse metacarpi tertii digiti, finitque, post obliquum progressum, in internum latus primi ossis minimi digiti.

Hi duo adducunt minores hosce digitos ad medium.

§. 186. Musculi digitorum proprii, uel ad indicem, uel ad minimum digitum, referuntur.

C A P V T XXXV.

MVSCVLI INDICIS MANVS.

§. 187. **A**d indicem tres spectant musculi.

§. 188. EXTENSOR SECUNDI INTERNODII INDICIS PROPRIUS ;
uulgo, INDICATOR.

I. Oritur, acute carneus, a medio *ulnae*, ^{Origo.} immediate infra *extensores pollicis*. (a) Post ^{EVST.} tendinescens, transit sub eodem *annulari li-* ^{T. 33.} *gamento*, cum *extensore* (§. 184.). ^{in dextro.}

II. Inferitur superiori parti secundi internodii, ad internum *extensoris* (§. cit.) latus. ^{Inferio.} ^{EVST.} ^{l. c.}

III. Indicem extendit oblique paullulum. ^{Actio.}
In cane, inferitur internodio ultimo.

§. 189. EXTENSOR TERTII INTERNODII INDICIS. (b).

I

I. Ori-

(a) Oritur quoque quandoque a *ligamento interosseo*.

(b) Hunc *extensorem*, ut & illum *minimi digiti* referunt

Origo. I. Oritur, carneus, ab omni exteriori latere *osfis metacarpi*, quocum committitur *index*.

Insertio. II. Inferitur, duplici tendine, ut *interosfei* (§. 185. II.), altero breui, in superiorem partem primi illius *osfis* a latere: altero largo longoque, in superiorem partem ultimi *osfis*, cohaerente cum *interosseo primo* (§. cit.)

Actio. III. Breuis tendo *indicem* abducit a reliquis: sicque *abductoris* nomen retinere potest: longus autem iuuat illum *interosfeum*. in extendendo ultimum indicis articulum.

Hic in cane non datur.

§. 190. ABDVCTOR.

Origo. I. Oritur, largus & carneus, a superiore exterioreque parte primi *osfis pollicis*.

EVST. T. 36. II. Inferitur, paruo tendine, in superiorem partem primi *osfis indicis* a latere, prope pollicem (c).

Insertio. III. *Indicem* abducendo a medio digito, illum adducit ad pollicem. Pollicis ergo respectu, *adductor* adpellari potest: medii digiti uero, *abductor*.

Actio. Neque hic inuenitur in cane.

runt quidam ad *interosfeos* (§. 183.), licet minime inter ossa fitos, ob originem ac insertionem, cum *interosfeis* (§. 185. II.) eandem.

(c) Sed & quandoque finit praeterea in *os metacarpi indicis*.

C A P V T XXXVI.

MVSCVLI MINIMI DIGITI MANVS.

§. 191. **D**igitis auricularis tres proprios fibi habet musculos, unumque cum *extensore* (§. 184.) communem, quibusdam singularem tamen habitum: estque is, qui sequitur.

§. 192. EXTENSOR MINIMI DIGITI.

Hunc prodire perhibent ab exteriori *humeri* protuberantia, & superiore *ulnae* parte. Me tamen iudice, distinctum ab *extensore* (§. EVST. 184.) musculum constituere nequit; nam eos, T. 34. & absque sectione, neque separaueris. Verum 31. qui quoque ab *extensore* (§. 184.) equidem est, tendinem eius, distinctum a reliquis tribus tendinibus, procedere sub *annulari ligamento*, qui dein in duos abeat; id uero *illum d. uisisse uideatur.* nouo musculo formando non sufficit.

§. 193. Omnis, in uola manus, promi-nens mollis caro *osfi metacarpi minimi digiti* incumbens, Graecis uocatur ΤΠΟΘΕΝΑΡ: quae infra illam conspicitur, ΘΕΝΑΡ ipsis audit. Eadem uero facillime in tres diuiditur musculos.

§. 194. EXTENSOR TERTII INTERNODII MINIMI DIGITI.

I. Oritur carneus, intertextis quibusdam *Orig.* fibris tendineis, ab osse *carpi*, incumbente tertio primi ordinis; ut & a ligamento, connec-

132 MVSCVLI MINIMI DIGITI &c.

tente illud os ad os metacarpi minimi digiti. (a).

Inseritio.

II. Habet insertionem *interosfeorum* (§. 185. II.); hoc est, paruo tendine, in superiorem partem primi ossis huius digiti a latere: longo uero, in superiorem partem ossis ultimi: cui alterius lateris *interosfeus* (l. c.) adcumbit.

Actio.

III. Iuuat internodii ultimi extensionem: brevis uero tendo solus illum digitum abducit a ceteris.

§. 195. ABDUCTOR MINIMI DIGITI. ΤΠΟΘΕΝΑΡ ΡΙΟΛΑ :

Origo.

EVST.

T. 39. 38.

Inseritio.

EVST.

l. c:

I. Oritur carneus, a tenui, protuberante parte ossiculorum carpi omnium. (b).

II. Inferitur, tendine sat longo ac terete, interiori lateri brevis tendinis *extensoris* (§. 195. II.), prope superiorem partem primi ossis huius digiti.

Actio.

III. Minimum digitum haud tantum abducit a reliquis, sed & flectit aliquantulum.

§. 196. FLEXOR PRIMI INTERNODII MINIMI DIGITI. (c)

Origo.

I. Oritur, tendineus & carneus, ab inferiore parte tenuis lateris octo carpi ossium, ut & ab omni interno latere *ossis metacarpi* huius digiti. Vbi ad huius *condylum* peruenit, diuiditur in duos tendines, insertos a quouis la-

(a) Hoc est ossiculum *subrotundum*, adplicatum *tri-quetra*. Vid: ALBIN. l. c: § 297.

(b) Oriri hunc musciculum adserit ALBIN. a processu ossis illius carpi, cui *cuneiformis* nomen imposuit. Vid l. c: §. 314. 3.; ut & sequentem musciculum.

(c) Hunc, & praecedentem musciculum (§. 195.) pro uno describit COVPER p: 164.

MVSCVLI POLLICIS MANVS. 133

latere in superiorem partem primi ossis huius digiti.

II. Facit ad flectendum primum digiti *mi-* *Actio.*
nimi internodium.

§. 197. *Hi omnes (§. 194-196.) absunt in cane.*

C A P V T XXXVII.

MVSCVLI POLLICIS MANVS.

§. 198. **P**ollex manus, reliquis digitis omnibus; quibus, alterius manus instar, opponitur; par robore, a nouem mouetur musculis.

§. 199. FLEXOR TERTII INTERNODII.

I. Originem habet acutam, carneam, a *Origo.*
 superiore parte radii, paullulum infra *bicipi-* *EVST.*
tis (§. 165. II.) insertionem, protractam per *T. 38.*
 aliquam ossis anteriorem partem (a). Paruae ac carnea eius fibrae decurrunt ibi dupliciter ad tendinem intermedium.

II. Inseritur tertio (b), uel ultimo pollicis *Inserio.*
 ossi, posteaquam progressus sub quibusdam *EVST.*
 annularibus ligamentis, ab uno secundi ossis *l: c:*
 latere ad alterum euntibus.

III. Flectit ultimum pollicis internodium. *Actio.*

§. 200. FLEXOR SECUNDI INTERNODII.

I 3

I. Hic

(a) Oritur quoque a *ligamento interosseo*: & nonnumquam a maiori humeri condylo. V. *EVST. T. XXXV.*

(b) Auctor scilicet *os metacarpi pollicis* primum habet os pollicis.

234 MVSCVLI POLLICIS MANVS.

Origo.
EVST.
T. 38.

I. Hic in duos, distinctos, diuidi potest musculos, quos inter decurrit praecedentis (§. 199.) tendo medius. *Exterior* procedit ab osse *carpi*, quod cum pollice articulatur (c). *Interior* uero ab eiusdem ossis parte, ut &, communi cum *adductore* ortu, a superiore parte *ossum metacarpi*, *indicis* & *medii digiti*.

Insertio.

II. Ambo inseruntur duobus *ossibus sesaminis* secundi internodii pollicis. (a).

Actio.

III. Flectunt illud *internodium*.

§. 201. FLEXOR PRIMI INTERNODII.

Origo.
EVST.
T. 35.

I. Oritur, *abductori* subditus, a *ligamento transversali*, ut & ab osse *carpi*, quod articulatur cum pollice.

Insertio.

II. Inferitur carneus toti interiori lateri primi ossis pollicis.

Actio.

III. Flectit illud *internodium*.

§. 202. EXTENSOR. PRIMI INTERNODII. (d)

Origo.
BIDL.
T. 70.

I. Oritur, carneus, (1) a superiore atque exteriore *ulnae* parte, immediate infra insertionem *anconae* (§. 170. II.); (2) a postica *radii*, infra eius *supinatore* breuem; & (3) a *membranoso ligamento*, connectente ossa *cubiti*.

Insertio.

II. Inferitur, semper duplici tendine: sed & saepe, triplici: & primo quidem, largo ac terete, qui plurimorum minimorum uidetur col-

(c) Hocce os ALBINVS dixit *multangulum maius*, descripsitque l: c: §. 298. & seqq.

(a) ALBIN. §. 328.

(d) Hunc nonnumquam in duos, immo tres diuisum musculos scribit COVVP. p. 169.

collectio, in superiorem partem primi ossis pollicis; secundo, immiscetur origini carnea *abductoris pollicis*; tertio denique, non semper reperiundo, os *carpi*, quod articulatur cum pollice.

III. Extendit primum os pollicis.

Actio.

§. 203. EXTENSOR SECUNDI INTERNODII.

I. Oritur (1) carneus, a parte *radii* postica, circa mediam carnem prioris (§. 202.), cui quoque, inter descensum suum, firmiter adhaeret: (2): a parte quadam *ligamenti membranosi*.

Origo.

BIBL.

T. 71.

II. Inferitur superiori parti secundi ossis pollicis.

Insertio.

III. Extendit secundum internodium.

Actio.

§. 204. EXTENSOR TERTII INTERNODII.

I. Oritur, acute tendineus ac carneus, (1) ab *ulna*, paullulum infra ortum *extensoris* (§. 202.): (2) ab ligamento interosseo.

Origo.

Tendo eius decurrit in sinu proprio, qui ad extremitatem *radii*.

II. Inferitur tertio, uel ultimo, os *pollicis*.

Insertio.

III. Vltimum internodium retrorsum du- cendo, illud extendit.

Actio.

§. 205. ABDUCTOR, CENAP RIORI- LANI.

I. Oritur, largus, tendineus ac carneus, (1) a *ligamento transverso carpi*: (2) ab uno os- siculo carpi, quod articulatur cum pollice.

Origo.

II. Inferitur secundo internodio *pollicis digitorum manus*.

Insertio.

BIBL.

T. 64. I.

Actio. III. Pollicem abducit a digitis.

§. 236. ADDUCTOR AD INDICEM,
ANTIÖENAP. RIOLA:

Origo. I. Oritur, a latere exteriori superioris par-
bidl. tis ossis metacarpi indicis.

T 71. L. II. Inferitur primo internodio pollicis, de-
Inferio. mittens tendinem tenuem, iuxta extensoris (§. 202. I.) longitudinem decurrentem.

Actio. III. Pollicem adducit ad indicem.

§. 207. ADDUCTOR AD MINIMUM
DIGITVM.

Origo. I. Oritur, paullulum tendineus, sed in
primis carneus, a tota longitudine ossis me-
tacarpi, medio suppositi digito. Inde fibrae
eius aequabiliter, in utroque latere, coar-
tantur, uaduntque ad pollicem.

Inferio. II. Inferitur internodio eius secundo, paul-
lulum infra unum os sesaminum.

Actio. III. Pollicem adducit ad digitos, annula-
rem & minimum.

§. 208. Pollex in cane, uel osfium ordo,
a ceteris digitis, in quadam distantia, remo-
tus, unum tantum habet extensorem, unum-
que flexorem.

EXTENSOR, cuius ortus, progressus ac
insertio paullulum diuersi ab extensore (§. 204.)
in homine; est tenuis, planusque musculus,
nunc tendineus, nunc carneus, explens cavi-
tatem, quae inter ossa cubiti.

FLEXOR est admodum exiguus, oriundus
ab uno osfium carpi, insertusque secundo inter-
nodio, quod pollicem in illo animali refert.

CAPVT XXXVIII.

MVSCVLI RADII.

§. 209. **R**adius, qui alterum os cubiti, flectitur extenditurque a musculis, toti cubito communibus, iamque descriptis *capite primo & trigesimo*. Vt autem singulares sibi *pronationis supinationisque* motus edere posset, adhuc quatuor ipsi sunt muscoli.

§. 210. PRONATOR TERES.

I. Oritur, (1) carneus, ab osse humeri, paululum supra internum illius condylum: (2) tendineus & carneus, ab illa protuberantia (a): & (3) totus tendineus ab processibus *ulnae* anterioribus.

Origo.
EVST.
T. 30.

II. Inferitur tenuis, & tendineo-carneus, medio *externae partis radii*.

Insertio.
EVST.
l: c:

III. *Pronat* manum; hoc est, *radium*, una cum *carpo*, & omni manu, introrsum uertit, palmamque deorsum.

Actio.

§. 211. PRONATOR QUADRATUS.

I. Oritur, latus, membranofus, & carneus, a parte inferiore ac interiore *ulnae*. Inde ortus fertur per transuersum: &

Origo.
EVST.
T. 38. in
dextro.

II. Inferitur, eadem latitudine seruata, *exteriori & inferiori radii parti*.

Insertio.
EVST.
l: c:

III. Eundem habet usum, quem prior

Actio.

(§. 210. III.)
In cane incumbit membranae, duo cubiti ossa coniungenti, hisque adhaeret: ubi autem ad

I 5

in-

(*) ALBIN. §. 272. 6.

(a) Cohæret ibi in adultis cum *flexoribus* (§. 176. 177.) ut & cum *palmari longo*. (§. 173.)

inferiorem ulnae finem peruenit, dimittit tendinem, oblique latum ad extremitatem radii, cui immittitur.

§. 212. SVPINATOR LONGVS.

Origo.
EVST.
l. c:

I. Oritur, acutus ac carneus, ab exteriori eminentia *osfis humeri*, supra originem *bicornis* (§. 178. I.), ad duorum uel trium digitorum latitudinem.

Insertio.
EVST.
l. c:
Actio.

II. Inferitur parti externae ac inferiori radii, prope *carpum*.

III. *Supinat* manum; hoc est, *radium*, una cum *carpo* ac omni manu, extrorsum uertit, palmamque eius fursum mouet.

Hoc caret canis.

§. 213. SVPINATOR BREVIS.

Origo.

I. Oritur, (1) tendineus, ab externa eminentia *osfis humeri* (α): (2) tendineo-carneus, ab externa ac superiore *ulnae* parte, firmiter adhaerens membranae, coërcenti illorum *ossium articulationem*.

Insertio.
EVST.
T. 39. F. I.

II. Inferitur interiori radii lateri, supra insertionem *bicipitis* (§. 165. II.); praesertim uero sub illa.

Actio.

III. Manu *supina*, *radium* retroducit: sicque adfistit praecedenti (§. 212. III.)

(α) ALBIN. §. 272. 5.

CAPVT XXXIX.

MVSCVLI FEMORIS.

§. 214. **O**s femoris sexdecim nactum est musculos.

§. 215. ΨΟΑΣ MAGNVS.

I. Oritur, (1) carneus, a corpore imae *thoracis uertebrae*, a latere (α): (2) a lateribus *uertebrae* omnium *lumborum*, totidem distinctis fasciculis carneis (β): (3) aliqua parte tendineus, ab omnibus illarum transuersis processibus (γ). Origo.
EVST.
T. 38.

II. Inferitur, (1) tendineus, *trochanteri* *minori ossis femoris* (δ): (2) carneus ipsi *femori*, paullulum, infra illum processum (ϵ). Insertio.
EVST.
l. c:

III. Flectit femur: dum illud antrorsum mouet. Actio.

§. 216. ILIACVS INTERNVS.

I. Oritur, (1) a toto interno labio partis *femicircularis ilium* (α): (2) a margine illius *ossis*, inter eius anticam spinam atque *acetabulum* interiacente: & (3) a maxuma parte *costae* illius (α). Origo.
EVST.
l. c:

II. Vbi prior (§. 215.) tendinescit, cum illo coit, eandemque habet insertionem. Insertio.
EVST.
l. c,

III.

(α) ALBIN. §. 122. 2.

(β) Idem §. 121.

(γ) Idem §. 136.

(δ) Idem §. 200. 4

(ϵ) Idem l. c: 5.

(α) Idem §. 191. 2.

(a) Sinum leuem summae peluis orae, supra *acetabulum*, & ante *os ilium*, imprimit. V. ALBIN. §. 192. 7.

Actio.

III. *Flectit femur, idque recta antrorsum mouet, ubi progredimur.*

§. 217. **PECTINALIS:**

Origo.
EVST.
T. 38.

I. *Oritur, latus ac carneus, a spina ossis pubis, id est, eius superiore ac interiore parte (α) (b).*

Insertio.
EVST.
l: c:

II. *Inferitur, tendine plano breuique, ossi femoris, paululum sub trochantere minore (β).*

Actio.

III. *Flectit os femoris, dum eleuat (c). 13*

In cane oritur teres ac carneus ab osse pubis, moxque in largum tenuemque tendinem abiens, interno femoris condylo infigitur.

§. 218. **GLVTAEVS MAXVMVS.**

Origo.
EVST.
T. 34.
T. 29.

I. *Oritur (1) carneus, a superiore parte ossis coccygis: (2) membranofus & carneus, ab omnibus geminatis sacri ossis spinis, & una uel duabus infimis simplicibus eius; (3) ab omni exteriori latere eiusdem ossis, infra spinam posticam ossis ilium (α): (4) ab utroque ligamento, ab osse ischio ad os sacrum pertingente, altero nempe eorum ab illius aspero processu: altero uero, ab eius tubere oriundo (β): (quod utrumque illi origini imminet, magnae plicae instar:) (5) totus carneus, a parte marginis circularis ilium, plus, quam*

(α) ALBIN. §. 186. 6.

(b) Decurrit in longiore ossis pubis sinu Vid: ALBIN. §. 193. 8.

(β) ALBIN. §. 200. 5.

(c) Potius introrsum illud ducit, ac circumrotat paululum, ut dum poplitem genu imponimus.

(α) ALBIN. §. 191. 6.

(β) ALBIN. §. 190. 2-4.

quam dimidia (γ): & denique (δ), a reliquo illius marginis anterieus, gracili largoque tendine, per quem pars subiecti musculi conspici potest, qui & inseparabiliter cohaeret cum *membranosi* tendine.

II. Inferitur, magno crasfoque tendine, *femori*, paullulum, infra maiorem *trochanterem*, ubi insignis asperitudo in uno latere superioris partis *lineae femoris asperae* (δ). Inferio. EVST. l: c:

III. Extendit femur, illud recta retrorsum ducendo (d). Albio.

§. 219. GLVTAEVS MEDIVS.

I. Oritur, carneus, a toto exteriori latere *spinæ ilium* (α), excepta eius parte postica, ubi e *costa* illius ossis prodit (β). Origo. EVST. T. 34.

II. Inferitur, largo tendine, sed oblique lato, maioris *trochanteris* latitudini (γ). Inferio. EVST. l: c:

III. Iuuat priorem (§. 218. III.) (e). Albio.

§. 220. GLVTAEVS MINIMVS.

I. Oritur (1) carneus, ab inferiore parte exterioris uel posterioris partis *ossis ilium* (α): (2) antrorsum a latere *spinæ* eius *anterioris* (β): & (3) posterius, a margine ingentis sui *sinus*. Origo. EVST. T. 36.

II. Inferitur, magno tendine, secundum Inferio. lon- EVST. l: c:

(γ) ALB. §. 191. 5.

(δ) ALBIN. §. 200. 5.

(d) Coccylum quoque ab illo eleuari posse, putat VVINSLOVV.

(α) ALBIN. §. 191. 5.

(β) *Idem* l: c: 3.

(γ) *Idem* §. 200. 2.

(e) Flectit quoque extrorsum, retrorsum.

(α) ALBIN. §. 191. 3.

(β) *Idem* l: c: 7.

longitudinem superioris ac anterioris partis maioris trochanteris (γ): & (2) uno exiguo, ceruici ossis femoris (δ); nempe, tendineae eius fibrae quaedam disperguntur supra membranam, inuoluentem illam ossis istius partem.

Alia.

III. Iuuat duos priores, in extendendo femore (§. 218. III. 219. III.)

§. 221. In cane primum (§. 218.) adpello *GLVTAEVM EXTERNVM*, qui nascitur membranofus a tota fere externa parte spinæ ilium; hæcque origo confluit cum alia, quæ ab osse sacro: tum & exit e ligamento, quod inter sacrum os ac ilium protenditur. Inde procedens, circa subiecti musculi medium, fit totus carneus, inseriturque tendineus, paululum infra maiorem trochanterem, extrinsecus.

Secundus, siue *MEDIVS*; qui & longe maior, oritur, carneus, a tota spina ilium, cuius concavam partem replet, inseriturque, tendineus, superiori ac exteriori trochanteris maioris parti.

TERTIVS, uel, *INTERNVS*, oritur carneus, a medio ossis ilium, extrinsecus, cuius utrique lateri, inter descendendum, adhæret. Inseritur uero, partim tendineus, partim carneus, superiori atque interiori parti maioris trochanteris.

Origo.
EVST.

T. 36. 38.

§. 122. *PYRIFORMIS*, uel, *ILIACVS EXTERNVS*.

I. Oritur, crassus, largus, ac carneus, ab inferiore parte ossis sacri, prope os ilium: ut & ab hoc osse, pro parte: inde sensim fit angustior;

(γ) ALBIN. §. 200. 2.

(δ) Idem §. 197. 12

gustior, abique in tendinem (f).

II. Immisum superiori parti sinus, qui ad *Inferio:*
maioris trochanteris radicem (α). EVST.

III. Eleuat os femoris, idque aliquantum *l: c:*
rotat extrorsum. *Actis.*

§. 223. MARSVPIALIS; uel; OBTV- RATOR INTERNVS.

I. Oritur, corpore carneo, ab *Origo.*
nominatis; interiorē περιφρεσιαν magni fora- EVST.
minis, quod osfa, ischium & pubis, formant T. 29.
(α), ambiens. Intrinsecus est tendineus, di- EVST.
uiditurque in plures, minores musculos, an- T. 37.
te insertionem suam unitos (a).

II. Inferitur sinui descripto (§. 222. II.) *Inferio:*

III. Os femoris rotat oblique, & per se- EVST.
micirculum, extrorsum: sicque opem fert prio- *l: c:*
ri (§. 222. III.) *Actis.*

§. 224. GEMINI.

I. Hi sunt duo, ipsa re distincti muscoli, *Origo.*
(h), connexi, ope musculosae membranae, EVST:
tam supra, quam infra; sicque formant, si T. 37.
ita dicere licet, marsupium, pro condendo
marsupiali (§. 223. II.) tendine. Superior enas-
citur ex acuto processu ossis ischii (α); inferior
uero

(α) ALBIN. §. 200. 3.

(α) Idem §. 189. 3.

(f) Egreditur e pelui, per ingens foramen, descriptum
ALBIN. §. 192. 4.

(g) Quatuor, uel quinque, qui & ipsi ossi sua
nonnumquam imprimunt uestigia. Elabatur autem hic
musculus ex pelui, per hiatum, inter tuber ossis ischii,
& duo ligamenta, ab illo tubere ad os sacrum pertin-
gentia, iam descripta (§. 218. I.) & mox repetenda,
relictum.

(h) Alii eos pro uno habent: contrarium sensisse ui-
detur EVST.

(α) ALBIN. §. 190. 4.

uero ex exteriori parte tuberis illius ossis (β); ut & ab *ligamento*; quod a dicto osse ad *sacrum os* protenditur. (γ).

Insertio.
EVST.
T. 19.

II. Vterque infigitur eidem cavitati (§. 222. II.)

Inter paruos hosce duos musculos procedit *marfupialis* (§. 223. III.) tendo ad insertionem suam.

Actio.

III. Seruiunt non solum extrorsum rotando osi femoris; sed & cauent, ne tendo ille immisus uel laedatur a duro sinu *ossis ischii*, per quem transit; uel exiliat ex illa cavitare, ubi *marfupialis* (§. 223.) contrahitur agens.

§. 225. QVADRATVS FEMORIS.

Origo.
EVST.
T. 29.

I. Oritur, latus, tendineus & carneus, a latere exteriori tuberis *ossis ischii*. (α): Inde procedit transuersus.

Insertio.
EVST.
l: c:

II. Inferitur exteriori lateri maioris *trochanteris*, & infra eum, usque ad minoris initium (β).

Actio.

III. Os femoris extrorsum ducit.

In cane exit de tuberculo ossis ischii, huiusque antica parte, prope magnum foramen.

§. 226. TRICEPS.

Hoc sub titulo, quatuor, distinctos certe, comprehendo musculos, quibus, ab actione sua, sequentia nomina impono,

ADDVCTOR FEMORIS PRIMVS.

I. O-

(β) ALBIN. §. 188. 1.

(γ) Idem §. 190. 2.

(α) Idem §. 188. 1.

(β) Idem §. 200. 1.

I. Oritur, forti tendine ac teretiusculo, a *Origo.*
superiore parte *osfis pubis*, prope *pectinaeum* EVST.
(§. 217.), supra *gracilem* (α). Sic ortus, ad- T. 36.
cipit compactum uentrem, &

II. Inferitur, tendineus, circa medium *li-* *Inferio-*
neae asperae, supra quam, per quinque, uel EVST.
sex pollices, continuatur (β) dato ante ten- l: c:
dine, qui cum illo quarti capitis confluit.

ADDUCTOR FEMORIS SECVN- DVS.

I. Oritur, tendine lato, sed, maxumam *Origo.*
partem, carneo principio, ab *osse pubis*, im- EVST.
mediate sub *gracili* (α). T. 33.

II. Inferitur *lineae asperae*, a parte eius, *Inferio.*
quae mox sub *trochantere* minore, usque ad EVST.
priorem *primi adductoris* infertionem (β). l: c:

ADDUCTOR FEMORIS TER- TIVS.

I. Oritur ab exteriori margine *ossum pu-* *Origo.*
bis ischiique, inferius, quam praecedens (α). EVST.
Inde decurrit, obliquus, *trochanterem mino-* T. 36. int
rem uersus. sinistro.

II. Et infigitur, prope *glutaeum* (§. 218. *Inferio.*
II.) (β).

ADDUCTOR FEMORIS QVARTVS.

I. Oritur, tendineus & carneus, a protu- *Origo.*
berantia *osfis ischii*, & eiusdem *osfis* interiore
parte, quae illi proxima. (α).

K

II.

(α) ALBIN. §. 189. 2.

(β) *Idem* l: c: §. 200. 5.

(α) *Idem* §. 189. 2.

(β) *Idem* §. 200. 5.

(α) *Idem* §. 189. 2.

(β) *Idem* §. 200. 5.

(α) *Idem* §. 188. 2.

Insertio.

II. Inferitur, tendine longo & terete, superiori, partique asperae inferioris ac interni processus *osfis femoris*, cui, paululum supra eius *condylum*, ut & parti cuidam *lineae asperae*, adfigitur. (β).

Actio.

III. Cuncti hi quatuor muscoli, pro diversa fibrarum suarum directione, os femoris introrsum ducunt.

§. 227. OBTVRATOR EXTER- NVS.

Origo.
EVST.
T. 38.

I. Oritur, carneus, ab omni inferiore parte *osfium*, *pubis* & *ischii*, circumambiens anteriorem magni illorum *foraminis* marginem, arcteque adhaerens illius membranae (α).

Insertio.
EVST.
l: c:

II. Inferitur, ualido tendine, cavitati descriptae (§. 222. II.)

Actio.

III. Os femoris oblique extrorsum rotat.

§. 228. Ceteroquin in cane adhuc alius, parvus, carneus observatur musculus, *PARVVS, IN ARTICVLATIONE FEMORIS SITVS*, nominandus; enimvero, ubi ab osse ilium, prope marginem cavitatis eius, acetabulum dictae, exortus est: procedit oblique, supra femoris articulationem, cui osfi quoque, inter uastum internum atque cruraeum medius, immittitur.

(β) ALBIN. §. 200. 5.

(α) ALBIN. §. 189. 3.

C A P V T XL.

MVSCVLI COCCYGIS.

§. 229. **C**occyx, hoc est, os, *osfis sacri* extremitati adiunctum, in quouis latere, unum habet musculum, qui iamdicatur.

COCCYGAEVUS * * * (a).

I. Oritur, tendineo-carneus, ab acuto processu *osfis ischii* (a), inter ligamentum, ab illo ad *sacrum os* productum (β), unumque *geminorum* (§. 224. I.) caput, medius. Vbi ita angustus natus est, sensim sensimque expanditur in gracilem uentrem, cui tamen quaedam fibrae tendineae intersperguntur.

Origo.
EVST.
T. 37.

II. Inferitur (1) toti *osfis coccygis* longitudini, a latere (γ): & quandoque, adhuc (2) inferiori parti *osfis sacri*.

Insettis.
EVST.
l. c.

III. Induratis *faecibus* eiectis, *coccygem* introrsum, siue antrorsum ducit (b).

Alia.

Quaerendo musculum, cuius mentionem iniicit RIOLANVS, titulo LEVATORIS ANI QVINTI, *coccygi*, & *osfis sacri extremo*, ut scribit, *adfixum*; huncce *coccygaeum* feliciter detexi.

§. 230. Duo ligamenta, *coccygaeorum* (§.

K 2

229.

(a) Hunc VVINSLOVV adpellat *ischio-coccygaeum*; nam & demonstrat alterum, ab *osse sacro* oriundum: qui ipsi *sacro-coccygaeus*.

(α) ALBIN. §. 190. 4.

(β) Idem l. c. 3.

(γ) Idem §. 147.

(b) Alii uero contendunt, illum extrorsum ducere *coccygem*, ubi uel foeces eliciundae; uel foetus excludendus.

229. III.), actioni opposita, describam in descriptione mea comparata de ossibus, breui edenda.

§. 231. *Cauda canis, quae tantum est productus coccyx, uarie mouetur a pluribus musculis; quibus uero, sigillatim describendis, nonim uel mihi molestus esse, uel lectori.*

CAPUT XLI.

MVSCVLI TIBIAE.

§. 232. **C**ruri, quod componunt duo ossa, *tibia ac fibula*, undecim adplicantur musculi; quorum illi, qui, ab *osse innominato* oriundi, alterutri cruris ossi inseruntur, ad totum crus pertinere dicuntur: illi uero, qui, ex *osse femoris* prodeuntes, *tibiae* infiguntur, huic soli habentur proprii.

§. 233. MEMBRANOSVS.

Origo.
EVST.
T. 28:

I. Oritur, angustus, tendineus ac carneus, ab antica *spinæ ilium*, extrinsecus. Vbi paululum infra maiorem *trochanterem* peruenit (α), uenter eius carneus iam degenerat in uerum tendinem, qui, descendens, firmiter adhaeret toti *asperae lineae* (β), ambosque *uastos & rectum* integit.

Insertio.
EVST.
T. 29.

II. Proprie inseritur superiori *tibiae* processui, a latere; illius inter tuberculum, *fibulaeque* caput medius; deorsum uero elongatur adhuc, pro inuoluendo *tibiali antico*. Ab
inte-

(α) ALBIN. §. 200. I.

(β) *Idem* l: c: 5.

interiori autem femoris latere descendit supra tibiam; neque tamen obseruaueris, eum, per omnem illum tractum, *tibiae* capiti ullibi firmiter adnecti.

III. Extendit tibiam, eamque rotat aliquantum extrorsum. Larga uero eiusdem *ανωθεν* subiectos sibi musculos in propriis suis locis continet; sicque actiones eorum intendit quam maxime (a).

In cane, illius loco, duo, uere distincti, uidentur musculi. Illorum superior, nascitur a spina ac dimidia costa osis ilium, abique, ubi supra rectum recta descendit, in crasum uentrem: ad distantiam uero trium, uel quatuor, pollicum, infra originem suam, expanditur in membranofum tendinem, cum patellae, tum tibiae capiti, insertum. Fascia haecce tendinea protenditur porro supra eiusmodi expansionem bicipitis: quae utraque inuestit omnes eiusdem lateris musculos, ad tarsum usque. Quum iam binarum harum fasciarum fibrae in diuersa ferantur, id est, sese decussent mutuo; constat omnino, quantum robur addant musculis, quibus incumbunt?

Inferior, gracili, carneoque principio, a superiore costa osis ilium natus, aliquantum infra illam, membranescit, firmiterque adfixus interiori osis femoris parti, supra uastos & rectum extenditur. Infra maiorem trochanterem uero tendinea haecce expansio coit cum tali glutaei (§. 221.) elongatione.

§. 234.

SARTORIUS.

K 3

I. O.

(a) Carneus ipsi innascitur musculus, qui tibiam extendentes, quando extendunt, reprimat: hinc in erecto homine illi musculi non protuberant.

Origo.
EVST.
T. 32. 35.

I. Oritur, tendineus, ab anteriore parte *spinæ ossis ilium*, intrinsecus: tum illico fit carneus: & descendit, primo aliquantum supra *rectum*, tum, oblique introrsum supra *uas- tum internum*, &, circa *ossis femoris* medium, supra partem *tricipitis* (§. 226.); inter cuius tendinem, & *musculum gracilem* pergit ulterius deorsum.

Insertio.
EVST.
l: c:

II. Inferitur anteriori *tibiae* parti intrinsecus, prope *spinam* eius, haud procul ab inferiore parte illius processus.

Actio.

III. Crus mouet oblique, uel efficit, ut crus unum femur alterum decuset.

In cane oritur carneus, a costa, prope spinam intrinsecus, finitque superius in interiorem partem eminentiae, quæ in tibiae medio.

§. 235. RECTVS.

Origo.
EVST.
T. 35.

I. Oritur, (1) carneus, a tuberculo, quod in inferiore parte anterioris *spinæ ilium* (α); (2) tendineus, a *costa ilium*, paululum supra *acetabulum* (β).

II. Inferitur, tendineus, supremæ parti *patellæ* (b).

Insertio.
EVST.
l: c:
Actio.

III. Extendit crus.

In cane oritur, tam tendineus, quam carneus, ab inferiore parte costæ ossis ilium, &, magnum, teretemque uentrem recipiens, descendit, ut in homine.

§. 236. VASTVS EXTERNVS.

I. Oritur (1) latus, tam tendineus, quam car-

(α) ALBIN. §. 191. 9.

(β) Idem l: c: 3.

(b) Notetur fibrarum decursus, omnium optime l: c: expressus ab EVST.

carneus, a magno *trochantere* (α): & (γ), prope insertionem *glutaei* (§. 220. II.), oblique extrorsum, supra maiorem *trochanterem*, usque ad *lineam asperam* (β); uel potius, a tota aspera linea, carneis fibris, oblique antrorsum decurrentibus ad tendinem medicum, cui immittuntur.

II. Inferitur *patellae* capiti, a latere.

Insertio.

III. Idem efficit, quod praecedens (§. 235.

EVST.

III.)

T. 33. 36.

Actio.

§. 237. VASTVS INTERNVS.

I. Oritur, tendineus & carneus, (1) inter anteriora *ossis femoris*, minoremque *trochanterem* medius: & (2) a toto fere interiori latere *lineae asperae* (α), unde fibrae eius carnea oblique antrorsum deorsumque eunt, & quidem inferius, quam quidem praecedentis musculi (§. 236. I.).

Origo.

EVST.

T. 36. 33.

II. Inferitur, tendineus, interiori *patellae* lateri; ibique a tendine illo procedit *απὸ τοῦ ἑσῶς* supra musculos, infra *tibiae* caput positos.

Insertio.

EVST.

T. 33.

III. Leuando tibiam, illam extendit.

Actio.

In cane oritur a collo femoris intrinsecus.

§. 238. Ab inferiori *patellae* latere descendit ualens crassumque ligamentum, inditum *tuberculo*, quod in parte anteriore ac suprema *tibiae*. Eius auxilio tibia aequè facile extenditur, ac si extensorum tendines illi ipsi infererentur (α)

K 4

§. 239.

(α) ALBIN. §. 200. I.

(β) Idem §. 200. 5.

(γ) Idem I: c:

(α) Idem §. 204. 2. 3.

§. 239. CRVRAEVUS. (c).

Origo. I. Oritur, carneus, inter utrumque tro-
EVST. chanterem femoris: & adhaeret toti fere ante-
T. 33. riori parti osfis illius.

Insertio. II. Inferitur, tendineus, patellae, sub recto
EVST. (§. 235. III.)

l: c: III. Iuuat extendere tibiam.

Actio.

§. 240. Cani adhuc quintus extensor, quem, quia demonstretur opus est, primus iam uoco EX-
TENSOREM TIBIAE PRIMVM, CA-
NI PROPRIVM. Hic exoritur a spina
& dimidia costa osfis ilium: ubi descendit, ad-
haeret sartorio (§. 234.), membranae ope, in-
figiturque patellae.

§. 141. GRACILIS.

Origo. I. Oritur, tenui ac lato tendine, ab osse
EVST. pubis, prope eius commissuram (a). Post,
T. 28. 35 illico fit tendineus, descendensque, per inter-
na femoris.

Insertio. II. Inferitur tendineus, interiori tibiae la-
EVST. teri, prope sartorium (§. 234. II.)

l: c: III. Femur, atque crus, flectit intror-
Actio. sum.

In cane oritur; tendine paruo, a tubere os-
fis ischii, adscenditque, per obliquum, ad infe-
riorem & anteriorem osfis pubis partem. Vbi
eo peruenit, fertur paullulum per transuer-
sum recta; sicque unitur pari suo, eodem modo
pro-

(c) Hic pars uasti (§. 237.) habitus est a VESAL.
Descripti uero omnes (§. 235. 237. 239.) coeunt ad in-
sertionem suam communem; hincque unum quadricipi-
tem constituunt: ut notat rectissime COVVP: p: 202.
Qui & insignia de eorum actione ibidem tradit.

(a) ALBIN. §. 189. 2.

procedenti, ubi sese decusant inuicem. Prope terminationem suam, demittit tendinem supra tibiam; ut & aliam expansionem membranosam, quae cum talibus bicipitis & membranosi (§. 233. II.) productionibus confluit.

§. 242. SEMINERVOSVS.

I. Oritur, carneus, eadem cum longiori *Origo.*
bicipitis capite origine, a postica protuberan- *EVST.*
tiae osfis ischii (a) (α). *T. 34. 29.*

II. Inferitur, plano tendine, interiori la- *Insertio.*
teri spinae tibiae, ad pollicis circiter distan- *EVST.*
tiam infra insertionem ligamenti (§. 238.). *l. c.*

Circa tibiae caput, ab musculi huius tendine deriuatur expansio tendinea, deorsum continuata supra interioris tibiae musculos.

III. Tibiam flectit retrorsum, eamque *Actio.*
paullulum introrsum ducit.

§. 243. SEMIMEMBRANOSVS.

I. Oritur, tendineus, a superiore parte tu- *Origo.*
beris osfis ischii (α). Vbi descendit, succum- *EVST.*
bit bicipitis capiti, inter quod, & praecedentem muscolum (§. 242.), fertur deorsum per *T. 29.*
posteriora femoris.

II. Inferitur, tendineus, superiori ac post- *Insertio.*
eriori parti capitis tibiae: ubi pars huius ali- *EVST.*
qua confunditur cum ligamento, quod, a ti- *l. c. &*
bia natum, utrique inferitur condylo; uel for- *T. 30.*
sitan a condylis ortum, inditur tibiae.

III. Flectit tibiam, illa recta retrorsum *Actio.*
agendo.

§. 144.

BICEPS.

K 5

I. O.

(a) Huius uenter incumbit *semimembranosi* uentri: tendo uero illius huius tendini subiacet.

(α) ALBIN. §. 188. 2.

(α) Idem §. 188: 1.

Origo.

1. EVST.

T. 34. 29.

2. EVST.

T. 36. in

sinistro.

I. Oritur dupliciter: (1) *superius*, corpore tendineo ac carneo, ubi *seminervosus* (§. 242. I.); (2) *inferius*, capite acuto & carneo, a *linea aspera*, paullulum infra *insertionem glutaei* (§. 218. II.): inde descendit, semper latescens magis, donec cum priori capite coeat.

Insertio.

EVST.

I. c.

II. Inferitur, tendineus, superiori *fibulae* capiti (α), ita tamen, ut & pars tendinis quaedam ad uicinum *tibiae* caput pertingat.

Prope insertionem suam, dat expansionem tendineam, productam supra musculos, uesientes exteriora cruris.

Actio.

III. Flectit crus.

In cane musculi huius principium crassissimum ac maximum est partim a tubere ossis ischii, partim a ligamento, ueniente a sacro osse ad illam ossis ischii eminentiam. Vbi descendit, dilatatur in amplum uentrem; qui & gastrocnaemii parti incumbit. Caput alterum; paruum, teres, ac carneum, procedit ab eodem ligamento, ope longi paruique tendinis. Post iunguntur ambo haec capita, circa popliteum, in unum musculum, qui, paullulum infra illum, tendinem recipit, superiori ac anteriori parti *spinae ossis tibiae* insertum. Latam insuper dat, tendineamque fasciam, quae, ubi ad tarsum descendit, arcte cobaeret medio anterioris tibiae, ac circumdatur musculis omnibus, qui in exteriori cruris parte: pars uero eiusdem postica producit distinctum tendinem, qui, cum chorda magna coiens, osi calcis adfigitur.

§. 245

POPLITAEVS.

I. Ori-

I. Oritur, tendine terete, a margine sinus, *Origo.*
 qui in inferiore parte exterioris *condyli femoris*, *EVST.*
 posteriora uersus. Inde exiens, progreditur *T. 36.*
 sub *ligamento*, inuolunte articulum: arcte-
 que adnatus parti *catilaginis lunatae* (α), ubi
 ligamentum illud perforauit, iam fit carneus,
 coiturus cum altera, carnea, origine, quae
 ab eadem membrana.

II. Inferitur superiori *tibiae* parti, intrin- *Insertio.*
 secus (β). *EVST.*

III. Tibiam oblique extrorsum mouet; *Actio.*
 quin & adcommodatus est illi flectendae.

(α) ALBIN. §. 203. 7.

(β) ALBIN. §. 210. 2.

CAPV T. XLII.

MVSCVLI TARSI.

§. 246. *Tarsus* mouetur a sex musculis.

§. 247. EXTENSOR TARSI SVRA-
 LIS; uel; EXTENSOR MAGNVS.

I. Oritur, quatuor capitibus; quorum bina
 exteriora musculus constituunt, *gastrocnae-
 mius externus*, uel & *gemellus*, uulgo ad-
 pellitatum.

I. Principum alterum est, duplici tendine, *Origo.*
 crasso ac breui, a parte postica interni *condy-* *EVST.*
li femoris; tum & ab ipso femore, aliquan- *T. 34. 29.*
 tum supra illum *condylum*. Alterum est ten-
 dineum a tuberculo, quod in exteriori *con-*
dylo, praecise sub *poplitei* origine (§. 245.
 1.);

I.); id uero mox fit carneum (a). Ventres horum, paullulum infra articulum, coeunt in medium, tendinem: ad mediam uero *tibiam* iam omnem perdunt carnem.

Capita bina intima cognita fuere haecenus adpellatione *solaei* & *gastrocnaemii interni*.

Origo.
EVST.

T. 29. 34.

I. Principium alterum exit e superiore & posteriore parte processus *fibulae*: a cuius postica per aliquod spatium, infra occursum tendinum, quasdam *fibrillas carneas* nanciscitur. Alterum autem nascitur a postica *tibiae* (α), circa mediam carnem *popliteae* (§. 245.): sicque pergit nasci ab illo ossis latere, tam inferne, quam alterum caput.

EVST.
l: c:

Tendines, a quatuor hisce originibus producti, efficiunt, coalitu suo, unum, ingentem tendinem, cui *chordae magnae*, uel, *tendini Achillis* nomen.

Insertio.
EVST.
l: c:

II. Inseritur superiori ac posteriori *ossis calcis* parti (β). Hocce uero os quum ultra *tibiam* productum sit; inde fit insignis distantia, *tibiam* inter, & illum tendinem.

Pars media, ut & superior, binorum duorum inferiorum capitum, gaudet quoque, loco, inter ossa, a quibus oriuntur, medio, tendineo margine, cui arcus figura, sub quo magna uasa, aliaque, ad crus pertinentia, procedunt.

Actio.

III. Tarsum retrahendo, deorsumque duendo, illum extendit.

In

(a) Hisce originibus inesse duo ossa *sesamina* notant VESAL. & RIOLA. L: V. C: XLIII; quae uero alii habent induratos tendines.

(α) ALBIN. §. 210. 6.

(β) IDEM §. 213. 4.

In cane uero, duo tantum existunt capita, eademque tendinea & carnea, a binis ossibus feminis, quae ad duos femoris condylos: unumque carneum, ab inferiore parte femoris.

§. 248. EXTENSOR TARSI MINOR;
uulgo; PLANTARIS.

I. Oritur, angustus, tenuis ac carneus, a *Orig.* parte superiore, eademque postica exterioris *EVST.* eminentiae ossis femoris; inter descendendum, *l: c:* adhaerescens membranae, obductae articulo. Mox uero mutatur in longum, gracilem, tenuemque tendinem, qui, emergens inter *extensoris* (§. 247.) uentres, descendit iuxta magni tendinis (§. cit.) internum latus: &

II. Inferitur (1), infra magnam chordam *Inferio.* (§. cit.), extremitati ossis calcis (α): & quan- *EVST.* doque, praeterea, (2) ipsi illi ossi, a latere, *l: c:* tendine duplici (b).

III. Iuuat praecedentem (§. 247. III.), *Actio.* in extendendo tarso.

In cane uenter huius musculi eandem cum flexore digitorum communi habet originem, cui quoque, in descensu suo, per sat magnum spatium adhaeret, ab illo haud separandus: finit uero, distincto tendine, in os calcis.

§. 249. *Απονευρωσις tendinea*, quae, proxime sub pinguedine adparens, obducta muscu- *CAS-* *SER. T.* lis, in planta pedis sitis, duas habet, angus- *42, F. 1.* *D. D. D.* tas, origines; a parte inferiore ac posteriore *utcum-* ossis calcis, prope ortum musculi sublimis. *O-* *que,* *rigo*

(α) ALBIN. §. 213. 4.

(b) Errat COVVP. p. 207. dum *απονευρωσις*, mox describendam, tendinem huius musculi adstruit.

rigo eius longissima firmiter cohaeret cum parte carnea memorati musculi: illius vero margo membranofus & extenditur supra adcumbentem *abductorem pollicis*, & hunc inter musculum & *perforatum*, ossibus adnectitur inferius.

Diuiditur porro in quatuor tendines, quorum singuli innox rursum finduntur in duos, ut uia paretur *flexoribus digitorum*. Tandem se immittit, ab utroque latere, cartilagini, obductae primo digitorum articulo. Nascitur eadem haec expansio secundo, ab eodem *osse calcis*, sed magis exteriora uersus: inde, antrosum lata, obducit se dimidia *abductoris minimi digiti* parti, priori tamen origini adhaerens, per medium tendinem. Atque haec partim inseritur superiori parti *ossis metatarsi minimi digiti*; partim, tendine longo, in extremitatem *ossis metatarsi*, prope eius articulationem cum tertio digito. Subiecta defendit a compressu, dum stamus, ambulamus &c.; & praeterea iuuat flexionem primi digitorum internodii, deprimendo cartilagineum illud corpus.

§. 250. TIBIALIS ANTICVS (c).

Origo
EVST.
T. 35. 28.
BIDL.
T. 21. E.

I. Oritur, tendineus & carneus, a medio superioris processus *tibiae* extrinsecus (α): inde descendit ad latus, supra exteriora *tibiae*, a qua quoque, membranam, quae illam adligat *fibulae*, ut & ab ipsa hac membrana (β), dispersas fibras carneas recipit. Circa inferiora *tibiae* uadit sub *annulari ligamento*.

II.

(c) *Musculus catenae* dicitur a SPIGE L.

(α) ALBIN. §. 210. 5.

(β) *Idem* l. c. 1.

II. Inferitur, (1) grandi tendine, interio- *Inferio.*
 ri lateri *osfis cuneiformis maioris*, quod *osfi* EVST.
metatarfi pollicis proximum (2): & (2) ten- l: c:
 dine paruo, superiori parti dicti *osfis metatar-*
fi, lateraliter (3).

III. Flectit tarsum, dum eleuat.

Adio.

In cane oritur, carneus, a superiore ac an-
teriore parte tibiae, & explet omne cauum,
quod inter extensorem digitorum pedis com-
munem, & tenuem, osseam spinam, quae cir-
ca superiora tibiae, quibus quoque, inter de-
scendendum, firmiter adfixus, relinquitur. Paul-
lulum infra ligamentum, quod ipsi circumda-
tur, procedit ad omnes pollicis pedis articulos:
quos ergo extendit.

§. 251. TIBIALIS POSTICVS.

I. Oritur (1) angustus & carneus, a parte *Origo.*
 anteriore *osfis tibiae*, praecise sub eius pro-
 cessu, *fibulae* vicino (2): inde ortus, se penetrat
 per superiorem partem ligamenti interossei
 (3); tumque pergit oriri (2) a parte postica 2. EVST.
fibulae intrinsecus (3) a dimidio fere superio- T. 37. 1
 ris partis *tibiae*, & a ligamento interosseo.

II. Postquam per *fissuram* ad internum *Inferio.*
 malleolum transiit (3); inferitur, tendineus, BIDL.
superiori parti osfis navicularis intrinsecus, a T. 85.
 latere (4). Tendo ille tamen continuatur usque
 ad os *cuneiforme medium* (5), fibrasque aliquas

ten-

(1) ALBIN. §. 235. 4.

(2) Idem §. 241. 1.

(3) Idem §. 210. 6.

(3) Idem l: c: 1.

(2) Idem l: c: 9.

(3) Idem l: c: 11.

(4) Idem §. 235. 2. 3.

(5) Idem l: c: 5.

tendineas, & osfi calcis (b), & flexori pollicis brevis impertit.

Actio.

III. Tarsum introrsum ducit (a).

In cane est tantum exiguus musculus, carneo corpore, oriundus, a postica ossum cruris, inter flexorem digitorum profundum & subplataeum (§. 245.) medius; tum, circa tibiae medium, in gracilem longumque mutatus tendinem, eodem confluit cum memorati flexoris tendine, paullo ante, quam hicce, in suo ad digitos itinere, diuiditur in partes.

§. 252. PERONAEVS PRIMVS, seu, POSTICVS.

Origo.
EVST.
T. 36.
in dextro.

I. Oritur (1) tendineo-carneus, a parte antica capitis fibulae, atque mox satis teretem sibi uentrem acquirit, rectis constantem, carneis, ac compressis fibris: (2) pluribus tenuibus ac carneis fibris, a parte superiore ac exteriori fibulae, ubi in teretem marginem protuberat (α): (3) a sinu, qui inter illum marginem, & anticam fibulae spinam. Longus eius tendo procedit, per sinum, ad externum malleolum, una cum sequente (β): tum, reflexus in cavitatem calcanei (γ), decurrit, plantae pedis musculis subiectus, per omnem longitudinem sinus, qui in osse cubiformi (δ).

Insertio.

II. Inferitur parti exteriori superioris ossis me-

(b) ALBIN. §. 216. 2.

(δ) Agit praecipue, ubi nautae antennas adscendunt.

(α) ALBIN. §. 210. 8.

(β) Idem l: c: 10.

(γ) Idem §. 216. 1.

(δ) Idem §. 235. 9.

metatarsi, ubi pollicem pedis sustinet (ε):
(2), fibrarum nonnullarum tendinearum ope;
uni *ossi cuneiformi*, illi *metatarsi ossi* uicino.
(η).

Os cartilagineum; in tendine huius musculi reperiundum, primoque, ni fallor, a VESALIO detectum; sinuatum obseruavi; ut eo commodius reciperet paruam eminentiam, quae in *osse cuboide*, cui; ut trochleae, incumbit.

III. Tarsum extrorsum mouet: (2) illum *Assis*.
flectit ex parte.

In cane oritur carneus, & aliquantum tendineus, a latere exteriori fibulae, praecise, ubi iam incipit firmiter adhaerere tibiae, a cuius quoque parte aliqua carneum sibi sumit principium: finit tandem in illud metatarsi os, cui index digitorum pedis continuatur.

§. 253. PERONAEVS SECVNDVS;
uel, ANTICVS.

I. Oritur carneus, (1) acuto principio; *Orig.*
ab exteriori *fibulae* parte, supra eius medium *EVST.*
(α): (2) ab exteriori latere spinae anterioris *T. 36. 30.*
eiusdem ossis: & (3) a terete eius margine
extrinsecus, posteriora uersus. Tendo pergit per *fissuram* ad externum malleolum (β);
ubi, cum praecedente (§. 252. I.); inclusus
ligamento; ulteriusque progressus, decurrit
sub alio, sibi singulari.

II. Inferitur superiori ac anteriori parti *Inferit.*
L *os* *EVST.*
l: 6.

(ε) ALBIN. §. 241. 1.

(η) Idem §. 235. 4.

(α) Idem §. 210. 8.

(β) Idem l: c. 10. 1

162 MVSCVLI QVAT: MINOR: &c.

BIDL.
T. 82. E. *osfis metatarsi minimi digiti pedis (γ), plurimis fibris tendineis, quarum una, uel duae recta deorsum feruntur, coiturae cum tendine, illum extendente digitum.*

Alb. III. Tarsum digitosque pedis extrorsum ducit.

In cane ipsi progressus est omnino idem, qui in homine: sed diuersa origo: oritur enim ibi ab eminentia, quae in capite tibiae, prope fibulam, a latere: & (2) a fibulae parte superiore.

(γ) ALB. §. 241. 2.

C A P V T XLIII.

MVSCVLI, QVATVOR MINORIBVS DIGITIS PEDIS COMMVNES.

§. 254. **M**usculi digitorum pedis uel sunt communes quatuor minoribus omnibus; uel pollicis digitorum, ac minimo digito proprii; uel ad utrumque hunc pertinent.

§. 255. Digitos quatuor minores omnes mouent quindecim musculi; duo scilicet *flexores*; totidem *extensores*; quatuor *lumbricales*; & septem *interossei*.

§. 256. EXTENSOR LONGVS.

Orig.
CASSER.
T. 40. F. 2.
GHH
K K. (1) Oritur (1) angustus tendineus ac carneus, a superiore ac exteriori parte capitis tibiae, prope fibulam (α): (2) carneus, a fibulae superiore

(α) ALBIN. §. 210. 5.

periore parte (β). Tum, diuisus in quatuor tendines, progreditur, ligamento annulari coërcitus.

II. Inferitur parti superiori ossis secundi cuiusuis minoris digiti. Inferio.
BIDL.

III. Extendit articulos omnes quatuor minorum digitorum. T. 81. D.
CASSER.
l. c.

In cane exit, terete tendine, ex anteriore parte externae femoris apophyseas, prope patellae canalem. Inde ortus, procedit per sinum, qui in tibiae capite, fitque carneus: ac ita per illud os descendit, donec, ad eius extremitatem, sub ligamento procedat, in quatuor diuisus tendines, superiori parti cuiusuis digiti insertos, prope ungularum initia. Vbi articulos superscandunt, adfiguntur firmiter sesaminis ossibus. Adio.

§. 257. Tam in postico, quam in antico canis pede, duo lustrari possunt ligamenta, ultimum cuiusuis digiti os erectum suspensumque continentia. Eadem ergo, currente cane, extensori illi succurrunt in actione sua: uel & sola eius munia explent, ne extensor ille semper agat. Ast de illis plura in descriptione mea comparata ossium.

§. 258. MVSCVLVS, PEDEM MOVENTIVM NONVS VESAL: re vera distinctus ab extensore (§. 256.) uidetur; oriundus a spina fibulae, circa eius medium, ubi membrana interossea adfigitur, permultis fibris carneis, quae ad tendinem suum oblique deorsum feruntur, ut stamina plumae. Inferitur ille tendo, saepe uero in duos EVST.
T. 19.

L 2

uel

uel tres fissus, superiori parti *osfis metatarsi* minimi digiti (a).

Qui musculus in canino corpore numquam re-
pertus.

Origo.

CASSER.

T. 39. F. 1.

L.

§. 259. EXTENSOR BREVIS.

I. Oritur, carneus, & aliquantum tendi-
neus, ab antica *osfis calcis* extrinsecus, ubi *os*
cuboides adtingit: inde expanditur in uentrem
carneum, facile in quatuor partes diuiden-
dum, proceditque, praecedentis (§. 256.)
tendinibus succumbens, per dorsum pe-
dis.

Insertio.

CASSER.

l: c:

MMMM.

Actio.

II. Immittitur, quatuor tendinibus, osfi
secundo digitorum.

III. Extendit illos pedis digitos.

In cane musculus hic uidetur duplex, oriun-
dus a superiore ac anteriore parte osfis calcis,
ubi extrinsecus cum astragalo committitur, &
quidem alter, principio tendineo, alter, carneo.
Musculus interior, mox carneus factus, unum
tantum producit tendinem, digito, qui pollicem
excipit, insertum, inclusumque, circa medium
primi internodii, tendinis longi (§. 256.) Ex-
terior autem reliquis digitis suos largitur ten-
dines.

§. 260. PERFORATVS, uel, FLE- XOR SVBLIMIS.

Origo.

BIDL.

T. 85. I.

CASSER.

T. 42. F. 2.

D D.

I. Originem habet angustam & carneam,
ab *osse calcis*, ubi inferius protuberat (α),
inter pollicis pedis minimique digiti *abducto-*
res mediam: inde, descendens, abit in cras-
sum, uentrem.

II.

(a) Et tertii *minoris digiti metatarsi osfi* eundem in-
feri scribit ALBIN. §. 241. l: c:

(α) ALBIN. §. 216. 3.

II. Inferitur, quatuor tendinibus, fisis, ^{Inferio.}
 coeuntibus, se mutuo interfecantibus, rur- ^{BIDL.}
 sumque diuisis, & ad osium latera adpreslis, ^{l. c:}
 secundae phalangi minorum digitorum qua- ^{CASSER.}
 tuor, aequae, ac illi in manu (§. 181. II.) ^{l. c:}
 aaaa.

III. Flectit secundum internodium illorum digitorum.

In cane oritur (1) carneus, a parte postica externi condyli ossis femoris: (2) paullulum tendineus, ab osse sesamino, laxae adhaerente illi condylo. Carne sua, succumbit gastrocnaemio, uel extensori furali (§. 247.) a cuius quoque exteriori capite separari potest, sed difficulter. Quam primum uero tendineus factus, descendit, iuxta longitudinem tendinis, ab illo musculo producti, ad os calcis, quod superat; tumque finditur, in quatuor, tenues, tendines, capsulae speciem formantes, cui, in exteriori latere, pro transmittendis sequentis musculi tendinibus, exigua canitas. Inuolucrum uero huius pars dimidia circa primi internodii medium interrumpitur, tumque tendo, lato fine, ac integro, inferitur secundi internodii principio.

Vbi tendo huius musculi in cane supra finem calcanei procedit, in illius medio deprehenditur durum corpusculum cartilagineum; quod illam partem tendinis non tantum defendit ab aspero illius ossis fine, sed & quum sit patellae instar, motum eius promptiorem, fortioremque, reddit, ubi canis procurrit.

§. 261. PERFORANS, uel, FLEXOR
 PROFVNDVS.

I. Oritur (1) acuto tendine, qui uero mox

fit carneus, a parte *tibiae* postica, supra insertionem *poplitaei* (§. 245. II.), ad duorum, uel trium pollicum ab ossis illius capite distantia (α), pergitque oriri, paruis, tendinei fibris, ab eiusdem ossis interioris latere, tandemque, cum magno muscoli huius tendine confluit: (2) tendine gracili, disperso, cui tamen copiosae *fibrillae carnea*e intertextae, a latere *fibulae*. Huic iam duplici fibrarum ordini includitur *tibialis* (§. 251.) Tum transit, liber a duobus *ligamentis*, ipsi obductis, per sinum, qui in *osse calcis* (β), paruumque tendinem antrorsum mittit, cum tendine *flexoris pollicis longi* communicatum, moxque, circa mediam plantam pedis, in quatuor finditur tendines.

CASSER.
T. 22. F. 3.
B.

MASSA CARNEA, uel, MVSCVLOSAE CARNIS PORTIOSYLV: recte haberi potest muscoli huius origo tertia; nam ubi prodiit, gracilis, ac carnea, a maxuma parte excavati *calcanei*, & aliquo eiusdem ossis spatio, anteriora uersus: tum quoque (2) tenuis ac tendinea, ab inferiori eiusdem ossis tubere: mox fit tota carnea, & cum tendine muscoli huius *flexoris*, praecise, ubi in quatuor suos tendines abit, coniungitur, per transuersum.

CASSER.
T. 42. F. 3:
D D.

Insertio.
BIDL.
T. 84. H.
CASSER.
I: c:

333.
Actio.

II. Tendines illi quatuor, *perforati* (§. 260. II.) *fissuras egressi*, inferuntur, parti superiori ultimi ossis digitorum minorum pedis omnium.

III. Flectit illos digitos.

In

(α) ALBIN. §. 210. 6.

(β) *Idem* §. 216. 2.

In cane musculus hicce procedit a tota dimidia superiore fibulae parte, aliquantum a tibia remota, repletque totum fere spatium, quod inter illa ossum illorum loca interiacket. Dividitur in quinque tendines, quorum unus transit ad pollicem digitorum, qui in cane omnium digitorum minimus: ceteri autem pervadunt totidem capsulas, a sublimis (§. 260.) tendinibus fictas, tertio cuiusvis digiti os inferendi.

MOLES CARNEA non inuenitur in cane.

§. 262. In foetu, cuius musculos praeparatos seruo, reperi paruum, carneum musculum, qui, oriundus a fibula, prope eius extremitatem, inter flexorem pollicis longum & peronaeum (§. 253.) medius, in sinuato calcaneo tendinescit; inque suo, uersus anteriora, progressu, firmiter adnascitur *mas-sae carnea*e (§. 261. I.), ibique loci coit cum perforantis (§. 261. II.) tendine, qui ad digitum, pollicis pedis adcumbentem, pertingit.

§. 263. **LUMBRICALES.**

I. Hi omnes exeunt e tendinibus perforantis (§. 261. II.) in quadam ab unione *mas-sae carnea*e (l: c: I.), cum illius tendine, adhuc solitario, distantia.

Orig.
BIDL.
T. 86. F.
1. A. C. F.
E. F.

II. Inferuntur, quatuor parvis tendinibus, lateri interiori primi internodii quatuor digitorum minorum pedis.

Insertio.
BIDL.
l: c:

III. Auxiliantur, ubi illi digiti flectendi:

Actio.

§. 264. **INTEROSSEI.**

BIDL. Musculis septem *interosfeis* idem situs, ea-
 T. cit: demque est insertio, ut in manu; differunt ue-
 F. 2. AAA. ro ab his, *origine*, & *actione*.
 BB.

Origo. Primus, siue, ABDVCTOR INDICIS PEDIS COVVP: p. 224. oritur a toto exteriori latere & anteriore parte *osfis metatarsi indicis*.

Origo. Secundus, seu. ADDVCTOR INDICIS PEDIS COVVP: ib: replet interval- lum, inter *osfa metatarsi*, indicis, & medii digiti, relictum, a quorum quoque lateribus princi- pium suum capit.

Origo. Tertius, uel, ADDVCTOR MEDII DIGITI COVVP:, intrinsecus tantum ui- sendus, ad latus secundi minoris digiti, in- dicem respiciens, pertinet, oriturque ab *osfis metatarsi* illius digiti anteriore parte tota; ut &, paucis fibris, a superiore parte *osfis me- tarsis indicis*,

Origo. Quartus, seu ABDVCTOR MEDII DI- GITI COVVP:, ab altero latere, per digiti illius longitudinem decurrens, prouenit, ex- trinsecus, ab ossibus metatarsi medii digiti & tertii: inter quae relictum omne spatium oc- cupat.

Origo. Quintus, siue, ADDVCTOR TERTII DIGITI COVVP:, oritur (1) a parte su- periore *osfis metatarsi* tertii digiti; & (2) a membrana, obducta tendini *peronaei* (§. 252. I.), illumque in *osfis cuboidis sulco* inclu- dente.

Origo. Sextus, qui in altero tertii minoris digiti latere; oritur a lateribus *osfis metatarsi* illius digiti, ut & ab ultimo *osse metatarsi*: in quo- rum

rum ossium intercapedine in dorso pedis constituitur. Quin & adhaeret, per tendinem; *peronaeo* (§. cit.).

Ultimus; qui ADDVCTOR MINIMI *Origo.* DIGITI COVVP. oritur (1) a parte superiore *ossis metatarsi minimi digiti:* & (2) a membrana *peronaei* (§. cit.), iam descripta.

III. Mouent quatuor minores digitos in *Inserta.* latus. Ac *interni* quidem illos introrsum mouent, ad pollicem eorum: *externi* uero illos adducunt ad minimum digitum, uel, eos abducunt a pollice digitorum, exteriora uersus.

§. 265. *Musculi, quatuor recti ac duo obliqui, in planta posterioris pedis in cane siti, plane eodem decurrunt modo, ut illi in anteriore pede* (§. 185:).

C A P V T XLIIII.

MVSCVLI POLLICIS DIGITORVM PEDIS.

§. 266. **A**d pollicem digitorum pedis sex spectant musculi.

§. 267. EXTENSOR LONGVS.

I. Oritur, acute tendineus & carneus, (1) *Origo.* a *fibula*, prope eius supremam partem (a): *EVST.* (2) a membrana interossea (β) (a) *cruris.* *T. 33.* *BIDL.*

L 5

II. T. 81. E.

(a) ALBIN. §. 210. 7.

(β) *Idem* §. 210. 1.

(a) Oriri eundem a *tibiae* latere, spectante *fibulam*, obseruat ALBIN. l: c §. 210. 5.

170 MVSCVLI POLLICIS DIGIT: &c.

Insertio.
EVST.
l: c:
Actio.

II. Tendine suo, superiori parti ultimi ossis pollicis digitorum pedis inseritur (b).

III. Extendit illud internodium, dum adtollet.

§. 268. EXTENSOR BREVIS COVVP:

p. 215.

Origo.

I. Oritur, principio tendineo & carneo, ab antica ossis calcis, prope eius articulationem cum talo.

Insertio.
BIDL.
T. 82.

II. Inferitur, tendineus, secundo ossi pollicis digitorum, prope eius supremam partem.

Actio.

III. Extendit illud internodium.

§. 269. Pollex pedis in cane, armatus ungula, omnium maxime incuruata inter quatuor reliquos digitos, committitur cum uno osse tarsi, prope superiorem partem ossis metatarsi, digito indici respondentis: unde pes posticus canis magis humanam manum refert, quam quidem anticus. Ille iam pollex a duobus extenditur musculis, quorum unus ipsi proprius est, oriundus, principio carneo, a fibula, ut § a membrana interossea cruris. Paruus illius uenter mox degenerat in subtilem tendinem, qui, cohaerens tibialis (§. 250. II.) tendini, procedit ad ultimum pollicis pedis internodium, ibidem infingendus.

Alter autem est tendo, descendens a tibiali (§. c: II.), iamque ibi descriptus.

§. 270. FLEXOR LONGVS.

Origo.
EVST.
T. 36.

I. Oritur, principio aspero, carneo ac tendineo, a parte superiore & postica fibulae, ad ossis huius

(b) Observatur quoque nonnunquam alium dare tendinem primo pollicis ossi.

MVSCVLI POLLICIS DIGITOR. 171

huius extremitatem fere (α): tendineque suo procedit sub ligamento, ad malleolum internum (β): tumque in itinere suo, *osfi calcis* tendinem communicat (γ).

II. Inferitur ultimo osfi pollicis digitorum pedis (δ). Insertio.
BIDL.

III. Flectit illud internodium.

T. 85. K.
Actio.

§. 271. FLEXOR BREVIS.

I. Oritur, tendineus, ab osfibus, *cuboide* ac *cuneiformi*, ultra pedis fundum exserto (α), inseparabiliter connexus tam *adductori pollicis*, quam *abductori*. Origo.
BIDL.
T. 85. F. 1.

II. Inferitur, *adductori* adnatus, *osfi sesa-* *mino* exteriori pollicis pedis (β). Insertio.
BIDL. l. c.

III. Flectit secundum internodium pollicis. Actio.

In cane illud officium commissum est fasciculo, a flexore (§. 261.) secedenti.

§. 272. ADDUCTOR.

I. Oritur, tendine longo, tenui ac diuergente, ab osfibus, (1) *calcis*, sub tendine *mas-* *sae carnea* (§. 261.): (2) *cubiformi*: (3) *cuneiformi medio*, prope *peronaei* (§. 252.) finem (α): & (4) *metatarsi* secundi digiti, in suprema eius parte. Tumque dilatatur in uentrem, mediocris magnitudinis. Origo.
BIDL. T.
86. F. 2. D.

II. Inferitur eidem osfi, cui *flexor* (§. 271. II.). Insertio.
BIDL. l. c.

III.

(α) ALBIN. §. 210. 9.

(β) Idem §. 205. 8.

(γ) Idem §. 216. 2.

(δ) Idem §. 251.

(α) Idem §. 235. 6.

(β) Idem §. 245.

(α) Idem §. 235.

172 MVSCVLI POLLICIS DIGIT. &c.

Actio.

III. Pollicem pedis adducit ad reliquos digitos.

§. 273. ABDVCTOR.

Origo.
BIDL.
T. 86. F.
2. CC.

I. Oritur (1) carneus, ab anteriore latere protuberantiae inferioris *osfis calcis* a latere (α), &, tendineus, a tuberculo, quod eidem osfi prope os *naviculare*: tum adhuc saepius (2) a latere ultimo memorati osfis (β), ubi quoque filamenta quaedam tendinea a *tibiali* (§. 250.) recipit. Reliquis uero osfibus, quae in interiori pedis parte, adhaeret tantum, repletque omnem cauitatem, quae in *osse metatarsi pollicis*.

Insertio.
BIDL.
1. c.

II. Inferitur *osfi sesamino* interno primis osfis pollicis digitorum (γ), ita tamen, ut tendines eius adhuc ulterius supra idem os procedant.

Actio.

III. Pollicem digitorum pedis abducit a reliquis digitis.

Bini ultimi musculi (§. 272. 273.) in cane deficiunt.

(α) ALBIN. § 216. 2.

(β) *Idem* §. 235.

(γ) *Idem* §. 245.

A P V T XLV.

MVSCVLI MINIMI DIGITI PEDIS.

§. 275. **M**inimus digitus duos sibi habet musculos.

§. 276. ABDVCTOR (a).

I. Ori-

(a) Facit carnem externam minimi digiti.

I. Oritur (1), carneus tendineusque, a margine *semicirculari* sinus, qui in exteriori latere inferioris eminentiae *osfis calcis* (α): (2) corpore tendineo, ab *osse cubiformi*: & (3) a superiore parte *osfis metatarsi minimi digiti* (β).

Origo.

BIDL.

i: c: B.

CASSER.

T. 42. F. 2.

GG.

II. Inferitur parti superiori primi *osfis minimi digiti*, extrinsecus, & a latere (γ).

Insertio.

BIDL. ib.

CASSER.

ib. HH.

III. Abducit minimum digitum a vicino sibi digito, exteriora uersus.

§. 277. FLEXOR PRIMI INTERNODII MINIMI DIGITI COVVP:

Actio.

p. 223.

I. Exit (1) carneus, e toto exteriori latere *osfis metatarsi* illius digiti, infra eius protuberantem partem (α): (2) e *peronaei* (§. 252. 1.) tendine, ubi decurrit in *fulco osfis cubiformis*. (β).

Origo.

CASSER.

T. 42. F. 3.

HH.

II. Immittitur cartilagini, obducenti articulationem primi internodii illius digiti (γ).

Insertio.

III. Quod internodium flectit.

Actio.

§. 278. Et hisce motoribus. (§. 276. 277.) caret canis.

(α) ALBIN. §. 216. 1.

(β) Idem §. 241.

(γ) Idem §. 246.

(α) Idem §. 239. 1.

(β) Idem §. 235. 9.

(γ) Idem §. 244.

CAPVT XLVI.

MVSCVLVS, POLLICI DIGITORVM
PEDIS, HVIVSQUE MINIMO
DIGITO COMMVNIS.§. 279. TRANSVERSALIS PEDIS
CASSER:

Orig. I. Oritur, tendineus, ab externo *sesamino*
BIDL. T. osse pollicis digitorum (α), arcta adhaesione ad
 86.F.2. E. *adductoris* (§. 272.) tendinem: moxque fac-
 tus carneus, procedit supra duorum osium
metatarsi extremitates, inter illa atque *digito-*
rum flexores (§. 260. 261.) medius. Inde la-
 tescit, ac

BIDL. l.c: II. Inferitur, partim tendini, prouenienti
CASSER. ab *expansione tendinea* (§. 249.): partim liga-
 T.43.F.1. mento cartilagineo, ambienti articulum primi
IKL. internodii tertii minoris digiti cum *suo osse me-*
 T.40.F. *tatarsi*, ut & tali ligamento ultimi digiti, fi-
 4.P. bris nonnullis carnis (β).

Adio. III. Binos ultimos pedis digitos adducit ad
 reliquos, & ad pollicem digitorum (α).

Neque hic musculus in cane.

(α) ALBIN. §. 245.

(β) *Idem* §. 244.

(α) Sicque cauam facit plantam: idque in pueris.
 Dixitque ALBINVS, qui pedibus scribere valent: il-
 lud, huius solum ope musculi, praestare posse.

A D P E N D I X.

MUSCULI CLITORIDIS ET VAGINAE, IN FEMINA.

§. 280. **D**uo clitoris nactus est musculorum paria.

§. 281. Musculus alter, inuentus a FALLOPPIO.

I. Oritur, tendineus ac carneus, ab osse *ischio* interne, prope eius coniunctionem cum *osfis pubis* (α) (a). Dum adscendit, adhaeret *margini interno pubis osfis*. Orig. EVST. T. 14. F. 1.

II. Inferitur carneus *cruri clitoridis*, hoc est, principio eius. Insertio. EVST.

III. Vterque, cruorem retinendo in ca- l: c: Añio uernosa clitoridis substantia, illam erigit.

§. 282. Alter uero improprie uocatur VAGINAE SPHINCTER apud de GRAAF, quum numquam illam cingat orbicularibus fibris, ut actionem, tali debitam musculo, edere possit.

I. Oritur, carneus, a *sphinctere ani* (§. 113.) partim ab alba compactaque substantia, sita sub *perinaei* cute, inter *pudendi* partem inferiorem, *anumque*. Inde adscendit ad *uaginae* latus, prope eius orificium exterius, tegitque Orig. EVST. T. 14. F. 1. omne

(α) ALBIN. §. 189. 2.

(a) Medio, inter *tricipitem* (§. 226.) ac *gracilem* (§. 241.), loco.

omne corpus uaginae uasculo-spongiosum, quod ipsa clitoridis productio:

Insertio. II. Inferitur, lateraliter, corpori, uel *cru-*
EVST. *ribus clitoridis.*

l: c: III. Idem efficit, quod praecedens musculus
Actio. (§. 281.); & praeter ea, comprimendo *spon-*
giosum corpus, siue *plexum retiformem*, com-
primit *uaginae orificium*, negando exitum re-
deunti inde *cruori* (b).

§. 283. *Vaginae uteri* duo data sunt mus-
culorum paria, nemini, quantum scio, de-
scripta.

Origo. §. 284. Musculus prior I. oritur ab inte-
riori *osfis pubis* latere (α), ad dimidiam par-
tem spatii, quod inter *os ischium*, & princi-
pium *cruris clitoridis*. Inde adscendit, obli-
quus aliquantum, &

Insertio. II. Inferitur *uaginae*, ad *meatus urinarii*
orificium.

Actio. III. Vaginam dilatat, illudque *meatus o-*
rificium aperit.

Origo. §. 285. Posterior I. prodit, & tendineus,
& carneus, ab *osse pubis* intrinsecus, eadem
quippe cum *levator* (§. 110. I.) origine (β).

Insertio. II. Inferitur superiori *uaginae* parti, ad
latus *meatus urinarii*, uel *colli uesticae*.

Actio. III. Vaginam eleuat, sicque, excreto lo-
tio, collum uesticae contrahit.

§. 286. Musculos hosce omnes (§. 280-286),
rite haud conspexeris, ni *os pubis* ab *osibus*
ilium, *ischioque*, separaueris, illique, abrupto,
rectum intestinum, *uaginam*, *uesticamque uri-*
nariam, cohaerentia reliqueris. §. 287.

(b) Ultimus hicce usus debetur CQVVP. p. 35.

(α) ALBIN. §. 184. 4.

(β) Idem §. 184.

§. 287. *Ut musculi canini haleantur e scripti omnes, iam uidendi adhuc supersunt musculi praeputii ac urethrae.*

§. 288. *Praeputium, cui in homine nullus datus est musculus, in cane ab uno pari, unoque, sine pari, mouetur.*

§. 289. *Prior dicatur.*

PRAEPUTIUM ADDUCENS, qui, a membrana carnosâ (§. 160.), ad cartilagineum ensiformem, oriundus, ubi iuxta utrumque lineae albae (§. 9.) latus descendit, fit crassior ac compactior, tandemque inseritur praeputio, a latere. Hic, (sic putarim;) contractus, praeputium obducit glandi, copulatione facta, (licet uelit **BLASIVS** (a) illum educere penem antrorsum, tempore coitus:) iuuaturque contractione duorum ligamentorum, quae ab alba linea (§. cit.), circa eius medium, oriunda, desinunt in praeputium.

§. 290. *Posterior qui*

PRAEPUTIUM ABDUCENS, uel, **RETRAHENS**, est paruus, pari carens, oriundus a sphinctere (§. 123.) arctèque adnatus adceleratori (§. 15.) unde duos fasciculos carneos recipit, iam memoratos, decurrit, iuxta urethrae longitudinem, inseriturque parti inferiori praeputii, ubi fibrae eius diuergentes supra illud totum sese expandunt. Praeputium retrahit, sicque succurrit denudandae glandi, ubi illud animal, coitum adpetit. Quin & certo respectu, seruire potest tum temporis dilatandae ac apertam retinendae urethrae, ne

M

semini,

(a) *Anat. Animal.* p. 23.

semini, in tanto itinere, ullum obstare possi impedimentum.

§. 291. *Partem tandem urethrae illam, quae inter prostates, unionemque cauernosorum corporum, interiacet, cui duorum uel trium pollicum longitudo, pro ratione scilicet magnitudinis animalis; gracilis ac carneus circumit musculus, qui, comprimens copiosas ibi glandulas, in urethram apertas, contenta earum exprimit, uehiculum futura descensuro, coitus tempore, semini: quin & plurimum conferunt fibrae eius carneae contrahendo illi canali, prout recte in apris ac tauris obseruauit COVPER.*

CATALOGVS MUSCVLORVM COR-
PORIS HVMANI, IN CANINO
DEFICIENTIVM.

Pyramidalis abdominis.

Musculus, frontalis, uerus.

————, *naso proprius, uel rinæus.*

Eleuator labiorum communis.

Depressor —————

Stilo-chondro-yoidæus.

Salpingo-staphilinus,

Coraco-yoidæus.

Thyreostaphilinus.

Subclavius.

Leuator ani. externus.

Serratus minor Anticus.

Palmaris longus.

———— *brevis.*

Vnus extensorum carpi radialium.

Extensor tertii internodii indicis.

Adductor indicis.

Musculi pollicis manus omnes, uno flexore,
unoque extensore, exceptis.

Musculi omnes digiti minimi manus, praeter
extensorem.

Supinator longus.

Coccygaeus.

Tendinosa expansio, in planta pedis.

Par nouum pedis VESALI.

Massa carnea, in planta pedis.

Musculi omnes pollicis digitorum pedis, u-
num si exceperis extensorem.

Abductor minimi digiti.

Flexor primi internodii minimi digiti.

CATALOGVS MUSCVLORVM, SINGVLARIVM CANI.

<i>Transuersalis penis.</i>	§. 16.
<i>Musculus oculi suspensorius.</i>	29.
——, <i>trochleae proprius.</i>	eod:
<i>Musculi plurimi auriculae.</i>	44.
<i>Chondro cerato-yoideus.</i>	57.
<i>Inio-cerato-yoideus.</i>	eod:
<i>Musculus epiglottidis, seu, yoglottus.</i>	72.
<i>Tympano-petroso-salpingo-pterigo-palatinus.</i>	82.
<i>Musculus, in summo thorace situs.</i>	101.
<i>Leuator scapulae, minor.</i>	116.
<i>Panniculus carnosus.</i>	160.
<i>Leuator humeri, proprius.</i>	163.
<i>Musculus, ad leuatorem adcesorius.</i>	eod.
<i>Flexor carpi. ulnaris alter.</i>	177.
<i>Extensor cubiti quintus.</i>	171.
<i>Musculus parvus, in articulatione femoris situs.</i>	228.
<i>Musculi caudae.</i>	231.
<i>Extensor tibiae quintus.</i>	240.
<i>Praeputium adducens.</i>	289.
——— <i>abducens.</i>	290.
<i>Musculus urethrae,</i>	1291.

TABULA, EXPLICANS MVSCVLO- RVM NOMINA.

Musculi sua fortiuntur nomina

I.

Ab Actione: inde

Abductor, ab *abducere*.

Accelerator, ab *accelerare*.

Adductor, ab *adducere*.

Adnuens, ab *adnuere*; ut, quando in rem aliquam consensuri sumus.

Adtollens, ab *attollere*.

Caput concutiens, a *concutere*.

Constrictor, a *constringere*.

Cremaster, uel *suspensorius*, a *κρεμαω*, *suspendo*.

Depresfor, a *deprimere*.

Detrusor urinae, a *detrudere*.

Diaphragma. a *διαφραττω*, *intersepio*, quod thoracis abdominisque uentres fecernit ab inuicem.

Dilatator, a *dilatare*.

Distortor oris, a *distorquere*.

Extensor, ab *extendere*.

Flexor, a *flectere*.

Indicator, ab *indicare*; quia illo digito utimur, rem quamdam demonstraturi.

Leuator, a *leuare*.

Masfiter, a *μασσαιμαι*, *manduco*, *comedo*.

Pronator a *prono*: quod uocabulum quidem illum situm notat, ubi uultui incumbimus, iacentes: hic uero adcipitur pro depressione manus.

Renuens, a *renuere*; ubi aliquid recusamus.

Retrahens, a *retrahere*.

Sartorius; quia seruit sartoribus, quoties sedent, pedibus, in crucis formam redactis.

Sphincter; a σφιγγω, constringo.

Supinator; a *supino*; qui est situs corporis ille, ubi dorso incumbimus, elato uentre: hic uero fumitur pro conuersione palmarum manus, superiora uersus.

Tensor, vide: *extensor*.

I I.

Ab origine: sic;

Graphoides; uel *stiliformis*, a γραφίς, *stilus*, quia a cognomine *osis* temporum processu oriri putabatur. Veteres sic adpellauerunt musculum digastricum.

Pectinaeus, uel, *pectinalis*; a *pectine*, hoc est, *osse pubis*.

Pterigoidaeus, seu; *aliformis*; a πτερυξ, *uget*, *ala*, & εἶδος *forma*.

Sacer, ab *osse sacro*.

Sacro-lumbalis; ab *osse sacro*, & processibus lumborum transuersis.

Semifibulaeus; a dimidia parte *fibulae*.

Transuersalis, a processibus transuersis, dorsi & colli.

Zygomaticus; ab *osse*, ζυγωμα dicto, quod deriuatur a ζυγόν, uel, ζευγόν, *iugum*: unde *os iugale*.

I I I.

A colore: ita:

Liuidus, hoc est, *pectinaeus*; a tali eius colore.

III.

A compositione sua, uariisque suis partibus.

Biceps; quia bina habet capita, uel origines.

Bicornis; quod duo habet principia, cornubus similia.

Complexus, quia componitur a fibris, tam tendineis, quam carneis, uarie mixtis, haud extricandis.

Complicatus: quod est aliud eiusdem musculi nomen, eadem de causa, ipsi inditum.

Digastricus, uel, *biuenter*, a *dis* & *γαστήρ*; quia duos habet uentres, unumque, illis interpositum, tendinem.

Gemellus; a gemino sui ortu.

Gemini; quia duo distincti musculi, membrana tantum coniuncti.

Quadriceps: a quatuor capitibus, quibus nascitur.

Triceps: quia tribus prodit capitibus.

V.

A fibrarum decursu.

Obliquus.

Orbicularis.

Rectus.

Transuersalis.

VI.

A figura.

Cucullaris; a similitudine, qua inferior huius musculorum pars ad cucullam monachorum adcedit, inter humeros propendentem.

Deltoides, seu, *deltiformis*; a Δ ; quae quarta Graecorum littera: & Δ , forma.

Fascia lata; quia includit plurimos musculos, *osfi femoris* incumbentes.

Fascialis, id est, *sartorius*; quia quosdam femoris crurisque musculos decussat, *fasciae* instar.

Lumbricales; quia lumbricos referunt.

Marsupialis; quia *gemini*, nonnullis illius musculi pars habiti, connexionem suam membranosa, *marsupium* carneum fingunt, per quod illius tendo transeat.

Pyramidalis; quia exoritur, *lata basi*, & definit in angustum uerticem, pyramidis instar: talis enim pyramidi est figura.

Pyriiformis; quia *pyrum* aliquantum referre uidetur.

Quadratus; quia quatuor habet latera.

Rhomboides, a $\rho\omicron\mu\beta\omicron$, *adamas*: & $\epsilon\iota\delta\omicron$, *forma*: hoc est, figura, adamanti similis, cuius opposita latera ac oppositi anguli aequantur.

Rotundus; a figura sphaerica ac rotunda.

Scalenus; a figura trianguli, cuius omnia latera inaequalia, $\sigma\kappa\alpha\lambda\eta\nu\omicron$ Graecis dicti.

Serratus; quia, ad finem suum, in plures, distinctas, carneas portiones diuiditur, *serrae* dentibus bene comparatas.

Solaeus, uel; *soleus*; a *solea*.

Splenius; a *splenio*, quod Chirurgi ossis fracti lateribus adplicare solent.

Teres; quia longus & rotundus.

Trapezius; a $\tau\rho\alpha\pi\epsilon\iota\zeta\alpha$; quo nomine, in Geometria, speciem figurae quadrilaterae intelligunt: proprie uero *mensam* denotat: inde musculus hic quibusdam *musculus tabulatus* audit.

Tri-

Triangularis; a *triangulo*, quod est figura, cui tres anguli.

VII.

Ab insertione.

Ciliaris; a *ciliis*, quae sunt molliores margines cartilaginei palpebrarum, quibus infinguntur *tarfi*.

Mastoidaeus, uel, *mastoides*; id est: *mammiformis*; a *μασθ*, *uber*, *mamma*, & *ειδος*, *forma*.

Semispinalis; a numero dimidio *spinarum* dorfi.

Spinalis; a plurimis *procesibus spinosis* colli.

IIX.

Ab origine & insertione.

Basio-glossus; a *βασις*, quae os anterius *osfis yoidis* & *γλωσσα*, *lingua*.

Cerato-glossus, a *κερας*, *ατος*, *cornu*, & *γλωσσα*.

Coraco-brachialis; a *procesu*, *κορακοειδης* dicto, quod a *κοραξ*, *κος*, *coruus*, & *ειδος*, *forma*: & *brachio*.

Coraco-yoidaeus: ab eodem *procesu*, & *osfe yoidis*.

Cico-arytaenoidaeus: a *κρικος*, *annulus*, & *αρυταινα*: *guttur*, seu *gutturium*.

Crico-thyreoidaeus; ut supra: & a *θυρεοειδης*, id est, *scutiformis*.

Genio-glossus, a *γενειον*, *mentum*.

Genio-yoidaeus: ut modo explicitum, & ab *osfe yoidis*.

Glosso-staphilinus; a *γλωσσα*, *lingua*; & *σταφυλη* quae *uua*, *uuula*, *gargareon*.

Mylis-galeus; a *μυλοι*, *dentes molares*.

Occipito-frontalis ; ab *occipite* , & *cute osfis frontis*.

Palato-staphilinus ; ab *osse palati* ; & *σαφυλη* , *uvula*.

Salpingo-staphilinus ; a *σαλπιγξ* , *ιγγος* , *tuba*.

Sterno-yoidaeus ; ab *osse sterni* , uel , *pectoris*.

Sterno-thyreoidaeus.

Stilo-chondro-yoidaeus ; a *στυλος* , *stilus* , hoc est , *processus stiliformis* ; & *χονδρος* , *cartilago*.

Stilo-glossus : a *στυλος* & *γλωσσα*.

Stilo-yoidaeus.

Thyre-arytaenoidaeus ; a *θυρεος* , *scutum*.

Thyre-staphilinus.

Trachelo-mastoidaeus ; a *τραχειος* , *collum* , *ceruix* ; quia ab eius *vertebris praecipue oritur*.

To-thyreoidaeus.

Observari meretur omnino , primum uocabulum semper indicari muscoli originem ; ultimum autem insertionem eius.

IX.

A partibus , ad quas pertinent.

Coccygaeus ; a *κοκκυξ* , *cuculus* ; hoc est , *os coccygis* ; nam & illius formam habet.

Oesophagaeus , ab *οισοφαγος* ; *oesophagus* , *gula*.

Pharyngaeus ; a *φαρυγξ* , *guttur* , *fauces*.

Cephalo-pharyngaeus , a *κεφαλη* , *caput*.

Chondro-pharyngaeus ; a *χονδρος* , *cartilago*.

Crico-pharyngaeus ; a *κρικος* , *annulus*.

Glosso-pharyngaeus - a *γλωσσα* , *lingua*.

To-cerato-pharyngaeus.

Mylo-pharyngaeus ; a *μυλοι* , *dentes molares* :

Pte-

Pterygo-pharyngaeus; a πτερυξ, ala.

Salpingo-pharyngaeus, a σαλπιγξ, tuba.

Stilo-pharyngaeus.

Syndesmo-pharyngaeus; a συνδεσμος, uinculum, ligamentum.

Thyreo-pharyngaeus; a θυρεος, scutum.

Rinaeus: a ριν, rinos, nasus.

Strapidaeus; a στραπεδε.

X.

A partibus, quas componunt.

Buccinator; quia maxumam buccae partem facit.

Gastrocnaemius, a γαστροκνημια, sura: quae uox descendit a γαστηρ, uenter, & κνημη, tibia.

Glutaeus; γλυτες, nates.

NB. *Pharyngaeus*, cum cunctis, diuerſis, fibrarum suarum ordinibus, huc, pari iure, referri potest, quo *glutaeus*.

Suralis; a sura.

Θεναρ; sic dixere Graeci prominentem in uola manus carnem: quod uerbum uero deriuari uidetur a θειναι, percutere, uerbe rare.

XI.

A progressu per partes quasdam.

Perforans; quia tendo eius pervadit fissuram, quae in perforati tendine.

Trochlearis; quia tendo eius fertur per cartilaginem; trochlea uocatam.

XII.

A magnitudine, cum aliis collata.

Breuis.

Gracilis, quia tenuissimus ac gracillimus musculorum *tibiae*.

Latisimus; quia dorso, uel collo, incumbentium musculorum maximus ac largissimus.

Longissimus; quia dorsi musculorum longissimus.

Longus.

Magnus.

Maior.

Maximus.

Medius.

Minimus.

Minor.

Paruus.

Haec explicatione non egent.

Platysma-myoides, h: e:, *expansio*, uel *dilatatio*, *muscularis*; a πλατυσμα, *latum lin-teum*; uel, *aliquid ei simile*: seu, a πλατυσμος, *dilatatio*: μος, *musculus*, & εides, *forma*.

Vastus; quia, cum pari suo, est *tibiae* musculorum crassissimus & maximus.

XIII.

A situ.

Angonaeus, uel, *anconaeus*; ab αγκων, *cubitus*; in stricto tamen sensu sumitur pro processu quodam cubiti.

Anticus; quia in anteriore parte collocatus.

Αντιθενας; a situ, musculo *θενας* opposito; uel, ab actione, illi του *θενας* contraria.

Brachiaeus; a βραχιων, *brachium*.

Cruraeus; a crure, hoc est, *femore*.

Cubitaeus) ; a cubito, id est, ulna.
Cubitalis)

Externus.

Fibulaeus ; a fibula.

Iliacus, ab osse ilium.

Immersus ; quia immersus quasi, sub ceteris
scapulae musculis.

Infraspinatus ; infra spinam *scapulae*.

Intercostales ; quia inter costas siti.

Internus.

Interosseus ; inter ossa *metacarpi* manus, &
metatarsi pedis, medius.

Interspinales ; hoc est, spinis colli interpo-
 siti.

Intertransversales ; qui inter processus trans-
 versos colli, uel lumborum.

Interuvertebrales ; quia supra, ac intra corpo-
 ra nonnullarum colli *vertebrarum* collo-
 cati.

Palmaris ; quia tendo eius supra palmam ma-
 nus expanditur.

Plantaris ; quod crediderunt, tendinem eius
 supra plantam pedis, sub cute, dispergi.

Pectoralis, ab osse *pectoris*.

Peroneus ; a *περον* ; quod cruris os bre-
 uius,

Popliteus a poplite.

Posticus : qui in parte posteriori collocatus.]

Yocae ; a *Yoa*, lumbis.

Radiaeus)

Radialis) ; a radio.

Subclavius ; a *clauicula*, cui succumbit.

Subscapularis ; sub *scapula*.

Supraspinatus ; supra spinam *scapulae*.

[Tem-

Temporalis ; a temporibus.

Tibiaeus) ; a tibia.

Tibialis) ;

Ulnaris ; ab ulna.

ὑποθενεα; quia infraθενεα.

XIV.

A proprio corpore.

Membranofus ; a tendine suo lato , membranæ simili.

Semimembranofus ; quia per dimidium membranofus.

Seminervofus) ; quia dimidius tendinofus.

Semitendinosus) ;

MUSCULORUM HUMANORUM, IAM DESCRIPTORVM, INDEX VNIVERSALIS.

A.

A bductor indicis.	§. 190.
_____ minimi digiti manus.	195.
_____ pedis.	276.
_____ oculi.	28.
_____ pollicis manus.	205.
_____ pedis.	273.
Adcelerator urinae.	15.
Adductores femoris.	226.
Adductor oculi.	27.
_____ pollicis manus ad indicem.	206.
_____ minimum digitum.	207.
_____ pedis.	272.
Adtollens auriculam.	44.
Angonaeus.	170.
<i>Artibeyae.</i>	236.
Aperiens palpebram, rectus.	19.
Arytaenoidaeus maior.	67.
_____ minor.	68.

B asioglossus.	59. I. 2.
_____ piceps externus.	167.
_____ femoris.	244.
_____ internus.	165.
Brachialis externus.	168.
_____ internus.	166.
Buccinator.	42.

C.

C apitis per tertium.	§. 128.
Cephalo-pharyngaeus.	74. I.
Cerato-glossus.	59.
Cervicalis descendens.	125.
Chondro-glossus.	59. I. 3.
———— pharyngaeus.	74. II.
Ciliaris.	20.
Coccygaeus.	229.
Complexus.	129.
Coraco-brachialis.	161.
———— yoidaeus.	55.
Corrugator.	17.
Costarum depressores proprii.	106.
———— leuatores ————	126.
Cremaster.	12.
Crico-arytaenoidaeus lateralis.	70.
———— posticus.	69.
———— pharyngaeus.	74. III.
———— thyreoidaeus.	65.
Cruraeus.	239.
Cubitalis.	170.
Cucullaris.	115.

D.

D artos.	11.
Deltoides.	154.
Depressor labii inferioris proprius.	38.
———— superioris. ————	39.
———— labiorum communis.	34.
———— oculi.	26.
Deprimens auriculam.	44.
Detrusor urinae.	108.
Diaphragma.	105.
Digastr. c.	9.

E.

E levator labii inferioris, proprius.	§. 36.
_____ superioris. _____	37
_____ labiorum communis.	33.
_____ oculi.	25.
_____ scapulae.	116.
Erector penis.	14.
Extensor carpi radialis.	178.
_____ ulnaris.	179.
_____ communis digitorum manus.	184.
_____ digitorum pedis brevis.	259.
_____ longus.	256.
_____ minimi digiti manus.	192.
_____ pollicis pedis brevis.	268.
_____ longus.	267.
_____ primi internodii pollicis manus.	202.
_____ secundi internodii indicis proprius.	188.
_____ pollicis manus.	203.
_____ tarfi minor.	203.
_____ furialis, seu, magnus.	247.
_____ tertii internodii indicis.	189.
_____ minimi digiti manus.	194.
_____ pollicis manus.	204.
Externus auris DVVERN.	47.
_____ FABRIT.	45.

F.

F ascia lata.	233.
Flexor carpi radialis.	176.
_____ ulnaris,	177.
_____ digitorum manus profundus.	182.
_____ sublimis.	181.
_____ pedis profundus.	261.
_____ sublimis.	260.
_____ pedis pollicis brevis.	271.
_____ longus.	270.
_____ primi internodii minimi digiti manus.	196.
_____ pedis.	277.

N

Flexor

Flexor primi internodii pollicis manus.	201.
— secundi —————	200.
— tertii —————	199.
Frontalis uerus, seu corrugator.	17.

G.

Gastrocnaemius.	247.
Gemini.	224.
Genioglossus.	58.
— yoidaeus.	52.
Glosso-pharyngaeus.	74. III.
— staphilinus.	75.
Glutaeus maximus.	218.
— medius.	219.
— minimus.	220.
Gracilis.	241.

Iliacus externus.	222.
— internus.	216.
Indicator.	188.
Infraspinatus.	156.
Intercostales externi.	103.
— interni.	103.
Internus auris.	46.
Interossei manus.	185.
— pedis.	245.
Interspinales.	135.
— transuersales colli.	137.
— lumborum.	151.
— uertebrales colli.	138.

L.

Latissimus colli.	43.
— dorsi.	160.
Leuator ani magnus, seu, internus.	110.
— paruus, uel, externus.	111.
— scapulae.	116.
Lingualis.	1.
	Lon-

Longissimus dorsi.
 Longus colli.
 Lumbricales manus.
 ————— pedis.

195
 f. 142.
 90.
 183.
 163.

M.

Marsupialis.
 Masfiter.
 Mastoidaeus.
 Membranofus.
 Musculi, ad sacrolumbum adcesforii.
 ————— auriculae.
 ————— clitoridis.
 ————— uaginae.
 Musculus, caput concutiens.
 ————— meatus auditorii.
 ————— stapedis.
 ————— patientiae.
 ————— tubae nouus.
 Mylo-pharyngaeus.
 ————— yoidaeus.

223.
 94.
 84.
 233.
 124.
 44.
 280 282.
 283-285.
 88.
 49.
 48.
 116.
 81.
 74. VI.
 51.

N.

Nasalis.

30.

O.

Obliquus adscendens.
 ————— auris.
 ————— capitis inferior.
 ————— superior.
 ————— descendens.
 ————— oculi inferior.
 ————— superior.
 Obturator externus.
 ————— internus.
 Occipito-frontalis.
 Orbicularis palpebrarum.

2.
 47.
 133.
 132.
 1.
 23.
 22.
 227.
 212.
 18.
 20.

P.

P alato-salpingaeus.	§. 81.
———staphilinus.	76
Palmaris brevis.	174.
———longus.	173.
Pectinalis.	217.
Pectoralis.	153.
Perforans manus.	182.
———pedis.	261.
Perforatus manus.	181.
———pedis.	260.
Peronaeus primus.	252.
———secundus.	253.
Pharyngaeus.	73. 74.
Plantaris.	248.
Popliteus.	245.
Pronator quadratus.	211.
———teres.	210.
Rectus magnus.	215.
———parvus.	150.
Pterigoidaeus externus.	97.
———internus.	96.
Pterigo-pharyngaeus.	74. VII.
Pteristaphilinus externus.	77.
Pyramidalis.	4.
Pyriformis.	222.

Q

Q uadratus femoris.	225.
———genae.	41.
———lumborum.	148.

R.

R ectus abdominis.	5.
———capitis internus, major.	85.
—————minor.	86.
Rectus	

Rectus capitis lateralis.	197
———— maior.	87.
———— minor.	130.
———— femoris.	131.
Rhomboides.	235.
Rinaeus.	117.
	30.

S.

Sacer.	147.
Sacrolumbalis.	123.
Salpingo pharyngaeus.	74. IIX.
———— staphilinus.	77.
Sartorius.	234.
Scalenus.	100.
Semimembranosus.	243.
———— nervosus.	242.
———— spinalis dorsi.	143.
Serratus, inferior, posticus.	121.
———— maior anticus.	118.
———— minor, ————	119.
———— superior, posticus.	120.
Solaeus.	247.
Sphincter ani externus.	112.
———— internus.	113.
———— labiorum.	35 a.
———— uesticae.	107.
Spinalis colli.	134.
———— lumborum.	146.
Splenius.	127.
Stapedis musculus, uel stapedaeus.	48.
Sterno - thyreoidaeus.	64.
———— yoidaeus.	56.
Stilo chondro - yoidaeus.	54.
———— glosus.	60.
———— pharyngaeus.	74. X.
———— yoidaeus.	53.
———— alter.	54.
Subclavius.	102.
Subscapularis.	162.
Supinator radii brevis.	213.
	Supl-

Supinator radii longus.
 Supraspinatus.
 Syndesmo-pharyngaeus.

212.
 155.
 74. IX.

T.

Temporalis.

— Teres maior.
 — minor.

93.
 159.
 158.
 205.

Devag.

Thyreo - arytaenoidaeus.
 — pharyngaeus.
 — staphilinus.

74. XI.
 78.

Tibialis anticus.

250.

— posticus.

251.

Trachelo - mastoidaeus.

128.

Transversales dorsi interiores.

141.

Transversalis abdominis.

6.

— colli.

135.

— lumborum.

147.

— pedis.

279.

Trapezius.

115.

Triangularis sterni.

104.

Triceps cubiti.

169.

— femoris.

226.

V.

Vastus externus.
 — internus.

236.
 237.

Y.

Yo - pharyngaeus.
 — thyreoidaeus.
Yodineg.

74. V.
 63.
 195.

Z.

Zygomaticus.

32.

*Leges , quas sibi figit JACOBVS DOV-
GLAS , tenendas , ubi integram COR-
PORIS HVMANI COMPA-
RATAMQVE ANATO-
MIAM pertractabit.*

In parte de OSSIBVS.

I. **D**iferendum de *osibus* , *cartilaginibus* & *ligamentis* in genere.

II. *Os*a singulatim examinanda , quae omnia sic sint praeparata , ut interna eorum fabrica aeque bene conspici possit , ac quidem exterior.

III. Articulationes *osium* tam in *scelet*o , quam in recenti cadauere exhibendae.

IV. Demonstrentur *περιστερ* , *medulla* , *ingressus* & *egressus* uasorum sanguineorum , ut & *glandulae mucilaginosae* omnes , in articulis , uel prope illos , collocatae.

V. *Os*a *foetus* & *adulti* inter se conferenda ; docendumque , qua ratione *os*a crescant , a conceptione usque in natiuitatem.

VI. Ostendenda differentia inter *sceletum* masculinum & femininum.

VII. *Cartilaginis* & *ligamenta* omnia ostendenda sunt , describendaque.

In parte de MVSCVLIS.

I. Exponenda fabrica *fibrae* , *membranae* & *musculi* in genere.

II. *Musculus* quisque sigillatim demonstrandus , ut uideatur eius ortus , progressus & insertio : *inuentor* eius citandus ; quique eum omnium optume descripserit.

I. Enarranda diuifio corporis , ut & descriptio communium eius partium , & continentium , ut *cuticulae* , *cutis* &c.

II. *Viscera* , in cauis *thoracis* ac *abdominis* , contenta , in *situ naturali* uidenda , ut eorum situs , mutuaque connexio conspici , indeque plurima *φαινομενα* , in praxi *physica* ac *chirurgica* occurrentia , explicari possint.

III. Vnumquodque *uiscus* separatim demonstrandum. §

IV. Ostendendae sunt partes , quae , in utroque sexu , ad generationem faciunt , tam in praeparatis siccis , quam recentibus.

V. Qua duplici ratione & offerantur instrumenta *sensuum*.

VI. Demonstrantur partes , quibus *foetus* humanus ab adulto discrepat : quales sunt *thymus* , *glandulae renales* (quarum copiosissima uasa diuersi cera coloris repleta sint) , *funiculus* ac *uasa umbilicalia* , *foramen ouale* , *canalis BOTALLI* uel *ductus arteriosus* , *ductus uenosus* &c.

VII. Inquirendum in *placentam uterinam* , & *membranas* , *foetum in utero* includentes.

In parte de NERVIS.

I. Loquendum de *neruis* in genere.

II. Omnes neruorum uiae quaerendae , qui , oriundi a *medulla oblongata* , transeunt per foramina cranii , inferendi naso , oculis , auribus , linguae , cuti capitis , ac faciei , cervici , partibusque , in thorace atque abdomine contentis : ut & illorum legenda uestigia ,
qui,

qui, e *medulla spinali* nati, ad artus feruntur; ubi & in primis desinunt.

De GLANDVLIS.

I. Fabrica *glandularum* in genere explananda.

II, Demonstrandum *εγκεφαλον* & *medulla spinalis*, una cum omnibus membranis, illa integumentibus.

III. Examinandae *glandulae salivares, mammae*, ceteraeque *conglomeratae* omnes, ductibus quarundam secretoriis, *argento uiuo, ceraque*, repletis.

IV. Demonstrandae sunt plurimae *lymphaticae*, hoc est, *conglobatarum* species.

In parte de VASIS.

I. Sermo faciendus de *arteriis, venis*, uasisque *lymphaticis* in genere, exhibitis simul pluribus earum membranis, ac ostiolis.

II. In *arterias* omnes iniicienda *materies ceracea*.

III. Replendi sunt *sinus durae matris*, ut & *uenae* nonnullae, uarii coloris cera: ceterarum autem uenarum progressus est persequendus, & quidem in specie. αζυγς; ramorum *uenae portarum*; earumque, quas in *uenae sectione* aperiunt.

Haec iam memorata omnia exhibebuntur in corporibus humanis, sed &, maxumam partem, in praeparationibus siccis. Vbi uero circa partes illas describendas uersabimur, sequentia in primis singularia considerabimus: nempe earum nomina Graeca, Latinâ ac Anglicâ; illorumque originem; inuentores; numerum; situm; connexionem: figuram; ipsum

corpus ; cavitates ; magnitudinem : membranas ; uasa ; colorum &c. denique *usum earum*, uero omnium simillimum. Adstruuntur, in *uiscerum* ac *glandularum* demonstrationibus, nonnulla, in sectionibus corporum, morbo enectorum, obseruata ; ac, qua ratione sic adfici potuerint, quaeque talem statum insequi debeant, explicabitur.

In parte Anatomiae COMPARATIVA.

I. Partes omnes *quadrupedis* demonstrandae, eodemque tempore, cum illis *corporis humani* comparandae sunt, ut illarum diuersitas eo clarius elucescat.

II. Oculis lustranda sunt *uasa lactea*, glandulae *mesenterii*, *receptaculum chyli*, *ductus thoracicus*, huiusque in *uenam subclauiam* apertura.

III. Demonstrentur quatuor *uentriculi animalium ruminantium* ; & addatur tractatio, de usu ac causa *ruminatiois*.

III. Videatur *motus* intestinorum *peristalticus*, & actio *diaphragmatis* in cuniculo.

V. Exhibeatur *uterus uaccae*. cum *cotyledonibus* suis, & *membranis*, ac humoribus inclusi *foetus*.

VI. In *uolatili* omnes separandi *musculi* ; *arteriae* replendae : inque *neruorum* itinera inquirendum. Examinanda *fabrica interna* ac *externa auris* ; demonstranda *membrana nictitans* ; intelligendaque ratio, cur tendo contracti illius *musculi globum oculi* non comprimat ? Vt & ceterarum *oculi partium* indaganda *fabrica*. Examinentur duo *uentriculi* ; *ingluuias* scilicet & *uentriculus*, cum *prolobo* seu *uestibulo* ; cor &

& pulmones, ac, quo hi modo in plurimas, pellucas, membranofas, uesiculas, plicis intestinorum interpositas, aperiantur?

VII. In gallo cernantur testes, renes fuc-
centuriati, ureteres, duo penes, & cloaca.

VIII. In gallina ouarium cum racemis uitel-
lorum, oviductus ac uterus.

IX. Microscopiorum auxilio; uideatur
circulatio sanguinis, & animalcula in semine
masculino.

X. Describendae partes omnes ostrei;
piscis alius, cui dura cutis (a); astaci; ut &
apuae. In qua ultima exhibenda cordis fa-
brica, intestinorumque elegans ratio. Quin &
in illis omnibus motus cruoris explicandus;
quum corda eorum uno tantum gaudeant
uentriculo.

XI. Exhibenda fabrica abstrusissimi orga-
ni auditus, in septem, uel octo, differentibus
animalibus.

Demonstrationibus horum omnium recen-
sitorum fidelibus adcuratisque praemissis, cur-
sum huncce Anatomicum concludet succinc-
ta OECONOMIAE ANIMALIS historia,
ab exhibita nominatarum partium fabrica de-
ducta, sequentibus includenda capitibus: de
masticatione; deglutitione; digestionem; chylica-
tione; sanguificatione; motu sanguinis circula-
torio, tam in foetu, quam in adulto; de nu-
tritione; de singularium omnium in corpore
hu-

(a) Descriptionem eius substitui termino Latino.
mihi ignoto. Angli dicunt *skait*.

humorum a massa sanguinea secretionibus ; de-
generatione , respiratione ; de motu musculari
ac progressivo ; de ratione , qua sentimus
&c.

A: P: C: N: c13 13 ccvi. D. XXIII.
Septembris,

ORDO MVSCVLORVM,

ab interprete additus.

Communiter Anatomici demonstrationes suas ordiuntur, a musculis, *anteriori trunco corporis supini incumben- tibus*: & quidem omnium primo ab iis, qui *abdomini ad-* applicati. *Musculorum abdominalium tria sunt strata.*

Nempe, ablatis communibus corporis integumentis, primum adparet, quod fit a solo obliquo externo EVST. XXVIII. Secundum ab obliquo interno; recto, & pyramidali; T. XXXIII. ex parte. Tum & uidetur cre- master. T. XXVIII. XXXII. Tertium a transuersario l: c: : iam tum sequitur peritona- eum.

In thorace autem anteriore, sub integumen- tis, primo obtutui se sistunt *pectoralis maior, tectus pro parte ab origine latis- simi colli; digiti serrati antici maioris; & portio latis- simi dorsi* V. T. XXVIII.

Primum ergo stratum facit *pectoralis maior*: l: c: ; hoc remoto, secundum fit a serrato, antico, superiore T. XXXII. Tertium ab intercostalibus externis; quartum, ab internis. T. XXXII. Inter primam uero costam & claviculam adpellat subclavius. T. XXXII.

Iam aperitur peritona- eum, ut uiscerum ab- dominalium situs uideatur: illis uero exemptis, uidetur concaua diaphragmatis facies. Tum

Ordo ab- domina- lium.

Thoraci anteriori incumben- tium.

In caui- te abdomi- nis sitorum catalogus.

Ψoas paruus integer ; origo ac progressus magni Ψoas ; quadratus lumborum integer : iliaci interni origo & progressus.

*Dorsi cer-
uicisque
posterioris
musculi.*

Iam, cadavere inuerso, pronoque, dorso incumbunt sequentes : hinc integumenta dissecantur per omnem trunci longitudinem, initio facto ab *occipite*. Iam uidebitur primum *dorsi* statum, a duobus musculis factum, quorum superior *trapezius*; inferior uero *latissimus dorsi*. Vna uero tum conspiciuntur aliorum portiones musculorum : ut *rhomboidis*; *infraspinati*; & *teretium*. T. XXXI. *Trapezio* dissecto, uidetur stratum secundum, quod fit a *rhomboide* T. XXIX. in dextrâ. Sub hoc sequitur *ferratus, posticus, superior* T. XXXVI. *Latissimum* uero ablatum excipit *ferratus, posticus, inferior* l: c: In ceruice autem posteriore mox, sub *cucullare*, uidentur *splenii*; his ablatis sequuntur *complexus*; ad cuius latus externum *trachelo-mastoidaeus*; post, *levator scapulae* T. XXXVII. Iis remotis, sequitur uniuersale stratum, quod inferius, communi tendine, enatum; abit in *longissimum dorsi*, eius spinae propiorem, & *sacro-lumbalem*: ad huius latus exterius uidentur *musculi*, ad *sacrolumbum adcesorii*. Inter *longissimum*, & spinam, in dorso uidetur *semi-spinatus* BIDL: In ceruice uero ex *longissimo dorsi* enata uidetur *portio*, ad *trachelo-mastoidaeum adcesoria*: & ex *sacrolumbali* fere procedens *cervicalis descendens*. Remoueantur & hi; tum adparebit in dorso *semi-spinalis*: in collo uero *spinalis colli*. Et hisce separatis, ab ultimis lumbis usque ad secundam

dam uertebam colli uidebuntur *sacer: transuersarii dorsi & ceruicis*: inter secundam uero uertebam & occiput sunt *recti & obliqui colli posteriores*. Ultimo; sub his, in lumbis uidentur *transuersarii*, in dorso *leuatores costarum* STEN:; in ceruice autem *transuersalis; interspinales; interuvertebrales*. Iam sola osfa.

Cadauere rursus supino; quaerantur *musculi*, anteriori colli parti, inter maxillae inferioris inferiorem marginem & pectus incumbentes. Primum ergo stratum facit *latisimus colli* T. XXX. Hoc ablato, occurrunt in oculos, qui expressi in T. XXVIII. Nempe remoto *platysmate myoide*, uidetur *mastoidaeus* l. c. Hoc remoto, inter *osfa pectoris & yoidis*, sequentes uidentur: *coraco-yoidaeus & sterno-yoidaeus* T. XLI. F. V. in dextro: *sterno-yoidaeo* subiacent *sterno- & yo-thyreoidaei*; l. c. in sinistro: ut & portio, a *glandula thyreoidaea ad os yoidis procedens*; sub hac uero *crico-thyreoidaeus*. l. c. F. VIII.

Inter *os yoidis* uero & *maxillae inferioris* inferiorem marginem hi iam sunt conspicui: omnium primo, sub *latisimo colli*, *digastri- cus & stilo-yoidaeus*: T. XXVIII. hisce remotis, uidentur *myo- & genio-yoidaei*; T. XLI. F. V. Hisce succumbentes uidentur omnes *linguae musculi*: l. c. F. VIII. *stilo-yoidaeus alter*, & *stilo-pharyngaeus*. F. XI. Iam, a colli latere, uidentur *scaleni omnes; intertransuersarii: musculus, caput concutiens; rectus internus maior capitis; & longus colli*, XLI. F. XIII. sub recto. Tum, separata a
trun-

trunco scapula, conspiciatur *ferratus*, *anticus*, *inferior* totus. T. XXXIII. pro parte.

Iam aperiendus thorax: & quidem *os pectoris* in uno latere separandum a costarum cartilaginibus: sicque eleuandum, ut *triangularis* alterius lateris uideri possit: & adhaesio diaphragmatis relinquatur: reclinetur in abdomen: & uideantur; origo *longi colli: transversarii dorsi interiores: depressores costarum proprii*; ac altera *diaphragmatis* facies.

Pharyngis. Separato a uertebriis *pharynge*; & capite circa *epistropheum* truncato, sic se ordine *pharyngaei musculi* excipiunt: ac superius quidem primo *mylo-pharyngaei*: tum *pterigo*; *salpingo-pharyngaei*: in parte uero postica, medio inter *salpingo- & glosso-pharyngaeos* loco, *cephalo pharyngaei*: tum *glosso-pharyngaei*. Inferius *chondro*; *yo-cerato*; *syndesmo*; *thyreo*; *crico pharyngaei*.

Uuulae. Hos sequuntur *uuulae musculi*: nempe membrana oris, a lingua usque ad inferiorem maxillam dissecta, ut & *pharynge*, a latere aperto, per longitudinem suam; uidentur; *glosso*; *thyreo*: & *pterigo staphilini*.

Capitis. Tum demonstrantur musculi capitis ita; *occipito-frontulis*; *corrugator uerus*; *sphincter oculorum & ciliaris*; tum *sphincter oculorum & ciliaris*, tum *sphincter oris*: quia ei pluri-
mae insertiones subiacent: *eleuator labii superiores*, cum portionibus adcesforiis; *myrtiformis*; *nasalis*; *eleuator labii superioris αζογ*; *leuator labiorum communis: zygomaticus*; & alii; quos sola inspectio docet. Tandem *pterigoidaei*; *palatostaphilinus*; *recti*, *internus & lateralis*:
Mus-

Musculi oculorum & aurium per se patient.

Sic & in scapula difficultatis nihil.

Soli restant artus. De brachio prius.

Humerus uel anterior; uel posterior: ille dicitur, ubi brachium extensum, manu supina. Ibi omnium primus est *biceps internus*: sub hoc, pro parte, *coracobrachialis*: toti tandem bicipiti subiectus *brachialis internus*.

In postica cubiti est solus *triceps extensor cubiti*.

In cubiti parte postica primum stratum constituunt sequentes, principio numerandi sumto ab ulna: primo *angonæus*: tum *extensor cubiti ulnaris*: tandem *extensor digitorum communis*.

Anteriori uero cubito, a radio incipiundo sequentes incumbunt: *supinator longus*; *pronator teres*; *flexor carpi radialis*; *palmaris longus*; *flexor carpi ulnaris*.

In strato altero *extensor carpi radialis*: *flexor tertii internodii pollicis*: *perforans* & *perforatus*. Tum adparent quoque *pronator quadratus* & *supinator brevis*.

In palma manus iam primum omnium est expansio *palmaris longi*; *palmaris brevis*: &c. Sub expansione *palmaris* uisuntur *sublimis* tendines: sub his *profundi*: e quibus nascuntur *lumbricales*. Tum *flexor minimi digiti*: ut & *pollicis flexores*, & *interossei*. EVST: T. XXIX. XXXVIII.

In dorso uero manus sic se habent: sub ligamento annulari ad digitos procedunt *extensoris communis* tendines; & *minimi digiti* ad

pollicem uero, *extensores* eius: *αντιθεναι* T. XXVIII. Tum *extensores* indicis & *abductor* eius: *υποθεναι* & *interossei*. T. XXXIX. F. I.

Femori anteriori, si ab exteriori initium sumseris, ita adplicantur. *Membranosi* portio *uastus externus*: *rectus*; *uastus internus*: *sartorius*; *gracilis*: *semimembranosus*. In triangulo uero: cuius latera fingunt *ossa innominata*; *sartorius* & *gracilis*: si ab superioribus inceperis, uidentur; tendines *iliaci interni*: *ioas magni*: *pectinaeus*: & *adductor femoris primus*. *Recto* subiectus *cruraeus*. *Vastis* tandem remotis, adparent ceteri *adductores* femoris.

Notium primum stratum fit a *glutaeo maximo*: secundum, a *glutaeo medio*: *pyriformi*: *marfupio*, cum *marfupiali*: & *quadrato femoris*, T. XXIX. Tertium tandem explet minor *glutaeus*.

Femoris posteriores sunt sequentes: *Membranosi*: portio *externi uasti*: *biceps*: *semitendinosus*: *semimembranosus*: ut & *adductores femoris*.

Ad externum ergo *genu* latus est solus tendo *bicipitis*: ad internum uero sunt quatuor: quorum summus est *sartorii*; tum *gracilis*: post *semimembranosi*: tum *seminerui*: & denique *semimembranosi*: huius enim latior est *semitendinosi* tendine, cui quoque subiectus.

Tibiae anteriori, & *fibulae*, si ab interioribus ordiaris, ita incumbunt: *Tibialis anticus*: *extensores longi digitorum* & *pollicis*: & *fibulae*. la

In crure posteriori primum stratum faciunt *gastrocnaemii* ; tum tendo *plantaris* : secundum *solaeus* : in poplite uero est *popliteus*. Tertium uero tres sequentes, si ab *tibia* inceperis ; *perforans* : *tibialis posticus* : & *flexor pollicis longus*.

Sic ergo se excipiunt illorum tendines : *Achillis* : *plantaris* : *flexoris pollicis longi digitorum* : *tibialis postici* ; *antici* : *extensoris pollicis longi* : *digitorum* : *noni pedem mouentium* ; *peronaei brevis* : *longi* : tum denique *rursus chorda magna*.

In *planta tandem pedis*, post integumenta communia, primum stratum conficit *απνευγώς* tendinea : secundum, *perforatus* : *abductor pollicis* : eius *flexor brevis*, *abductor minimi digiti*. Tertium constituunt *flexores longi digitorum* & *pollicis* : *carnea massa* & *lumbricales*. Hisce ablatis, sequuntur *adductor pollicis* : *transuersalis* : *flexor primi interpedii minimi digiti* : tandem *interossei*.

F I N I S.
